

264

F

نام:

نام خانوادگی:

محل امضاء:

صبح جمعه
۹۳/۱۲/۱۵
دفترچه شماره ۱ از ۲



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود، مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی
دوره‌های دکتری (نیمه‌تمترکز) داخل
سال ۱۳۹۴

رشته مهندسی مکانیک – مکانیک جامدات – کدر شته ۲۳۲۲

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سوال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوال‌ها

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره	ضریب
۱	مجموعه دروس تخصصی (ریاضیات مهندسی، مکانیک محیط پیوسته، تئوری الاستیسیته)	۴۵	۱	۴۵	۴

این آزمون نمره منفی دارد.
استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

اسفندماه – سال ۱۳۹۳

حق جاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...)، پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

مجموعه دروس تخصصی (ریاضیات مهندسی، مکانیک محیط پیوسته، تئوری الاستیسیتیه):

- ۱ برای توابع ویژه و مقادیر ویژه مسئله روبرو، کدام گزینه صحیح است؟
- $$\begin{cases} y'' + \lambda y = 0 \\ y(0) = 0 \\ y(\pi) = y'(\pi) \end{cases}$$
- $n = 0, 1, 2, 3, \dots$, $\tan(\alpha_n \pi) = 2\alpha_n$ با شرط $y_n(x) = \sin(\alpha_n x)$ (۱)
- $n = 0, 1, 2, 3, \dots$, $\tan(\alpha_n \pi) = \alpha_n$ با شرط $y_n(x) = \sin(\alpha_n x)$ (۲)
- $n = 0, 1, 2, 3, \dots$, $\tan(\alpha_n) = \alpha_n$ با شرط $y_n(x) = \sin(\alpha_n x)$ (۳)
- $n = 0, 1, 2, 3, \dots$, $\cot(\alpha_n \pi) = \alpha_n$ با شرط $y_n(x) = \sin(\alpha_n x)$ (۴)

-۲ پاسخ کراندار $w(x, t)$ مسئله مقدار اولیه کرانه‌ای زیر، کدام است؟

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 w}{\partial t^2}, & x > 0, t > 0 \\ w(x, 0) = \frac{\partial w(x, 0)}{\partial t} = 0, & x \geq 0 \\ \frac{\partial w(0, t)}{\partial x} = \text{cost}, & t \geq 0 \end{cases}$$

۱، که در آن، u تابع پله واحد است.

۲، که در آن، u تابع پله واحد است.

۳، که در آن، u تابع پله واحد است.

۴ پاسخ کراندار ندارد.

-۳ یک راه حل مسئله مقدار اولیه کرانه‌ای (یا مرزی) به صورت زیر:

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), & 0 < x < L, t > 0 \\ u(x, 0) = g(x), u_t(x, 0) = h(x) \\ u(0, t) = 0 = u(L, t), t > 0 \end{cases}$$

u و g و h توابع تکه‌ای هموار داده شده‌اند) آن است که شرایط اولیه داده شده و توابع f (معلوم) و

(مجهول) را بر حسب یک پایه متعامد مناسب $\{\phi_k(x)\}_{k=1}^{\infty}$ ، به صورت زیر بسط دهیم:

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} u_k(t) \phi_k(x), \quad f(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(t) \phi_k(x), \quad g(x) = \sum_{k=1}^{\infty} g_k \phi_k(x), \quad h(x) = \sum_{k=1}^{\infty} h_k \phi_k(x)$$

و سپس با قرار دادن این کاندیداها در معادلات مسئله داده شده، مجهولات $u_k(t)$ را بیابیم. در این صورت

پایه متعامد $\{\phi_k(x)\}_{k=1}^{\infty}$ ، کدام است؟

$$\left\{ \cos \frac{k\pi x}{L} \right\}_{k=0}^{\infty} \quad (۵)$$

$$\left\{ \sin \frac{k\pi x}{L} \right\}_{k=1}^{\infty} \quad (۶)$$

$$\left\{ \cos \frac{(2k-1)\pi x}{2L} \right\}_{k=1}^{\infty} \quad (۷)$$

$$\left\{ \sin \frac{(2k-1)\pi x}{2L} \right\}_{k=1}^{\infty} \quad (۸)$$

-۴ سری فوریه سینوسی نیم‌دامنه تابع $f(x) = x \sin x$ ، $0 \leq x \leq \pi$ ، کدام است؟

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{-16m}{\pi(2m-1)^2(2m+1)^2} \sin(2mx) \quad (1)$$

$$\frac{\pi}{2} \sin x + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{-8m}{\pi(2m-1)^2(2m+1)^2} \sin(2mx) \quad (2)$$

$$\frac{\pi}{2} \sin x + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{-16m}{\pi(2m-1)^2(2m+1)^2} \sin(2mx) \quad (3)$$

$$\frac{\pi}{2} \sin x + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{-16m}{\pi(2m-1)^2(2m+1)^2} \sin((2m-1)x) \quad (4)$$

-۵ برای تابع $f(x) = x \cos x$ ، $0 < x < \pi$ ، سری فوریه کسینوسی نیم‌دامنه را در نظر می‌گیریم. سه جمله اول این سری، کدام است؟


$$-\frac{2}{\pi} + \pi \cos x - \frac{2}{9\pi} \cos 2x \quad (1)$$

$$-\frac{2}{\pi} + \cos x - \frac{2}{9\pi} \cos 2x \quad (2)$$

$$-\frac{2}{\pi} + \frac{\pi}{2} \cos x - \frac{1}{9\pi} \cos 2x \quad (3)$$

$$-\frac{2}{\pi} + \frac{\pi}{2} \cos x - \frac{2}{9\pi} \cos 2x \quad (4)$$

-۶ در مسئله مقدار مرزی معادله دیفرانسیل لاپلاس زیر، پایه متعامد بسط تابع $h(x)$ داده شده به سری فوریه، کدام است؟




$$\left\{ \cos \frac{k\pi x}{2a} \right\}_{k=1}^{\infty} \quad (1)$$

$$\left\{ \cos \frac{(2k-1)\pi x}{2a} \right\}_{k=1}^{\infty} \quad (2)$$

$$\left\{ \sin \frac{(2k-1)\pi x}{2a} \right\}_{k=1}^{\infty} \quad (3)$$

$$\left\{ \frac{1}{2}, \cos \frac{\pi x}{a}, \cos \frac{2\pi x}{a}, \dots, \cos \frac{k\pi x}{a}, \dots \right\} \quad (4)$$

-۷ برای مسئله مقدار مرزی زیر، در مورد معادله دیفرانسیل لابلاس در داخل یک نیم‌طوق، کاندید جواب به کدام صورت است؟



$$T(r, \theta) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k r^k \sin(k\theta) \quad (1)$$

$$T(r, \theta) = \sum_{k=1}^{\infty} (A_k r^k + B_k r^{-k}) \sin\left(\frac{2k-1}{2}\theta\right) \quad (2)$$

$$\alpha_k = \left(\frac{2k-1}{2}\right) \cdot T(r, \theta) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k r^{\alpha_k} \sin\left(\frac{2k-1}{2}\theta\right) \quad (3)$$

$$\alpha_k = \left(\frac{2k-1}{2}\right) \cdot T(r, \theta) = \sum_{k=1}^{\infty} (A_k r^{\alpha_k} + B_k r^{-\alpha_k}) \sin\left(\frac{2k-1}{2}\theta\right) \quad (4)$$

-۸ در معادله رویه مینیمال جواب‌هایی به صورت $\mathbf{u}(x, y) = F(x) + G(y)$ کدام هستند؟

$$u(x, y) = \frac{-1}{c} \ln \cos(cx + c_1) + c_2 + \frac{1}{c} \ln \cos(-cy + d_1) + d_2 \quad (1)$$

$$u(x, y) = \frac{1}{c} \ln \cos(cx + c_1) + c_2 + \frac{1}{c} \ln \cos(-cy + d_1) + d_2 \quad (2)$$

$$u(x, y) = \frac{-1}{c} \ln \cos(cx + c_1) + c_2 + \frac{1}{c} \ln \cos(cy + d_1) + d_2 \quad (3)$$

$$u(x, y) = \frac{1}{c} \ln \cos(cx + c_1) + c_2 + \frac{1}{c} \ln \cos(cy + d_1) + d_2 \quad (4)$$

-۹ با فرض اینکه، جواب مسئله مقدار اولیه $\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0 \\ u(x, 0) = \phi(x) \end{cases}$ و ϕ تابع معلوم، به صورت

$$u(x, t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(\zeta) e^{\frac{-(x-\zeta)^2}{4t}} d\zeta$$

$$\text{و } T_1 \text{ و } T_2 \text{ ثابت) باشد، آنگاه کدام مورد، صحیح است؟} \quad \phi(x) = \begin{cases} T_1, & x > 0 \\ T_2, & x < 0 \end{cases}$$

$$u(x, t) = \frac{T_1 + T_2}{2} + \frac{T_1 - T_2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\frac{x}{\sqrt{4t}}} e^{-\alpha^2} d\alpha \quad (1)$$

$$u(x, t) = \frac{T_1 - T_2}{2} + \frac{T_1 + T_2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\frac{x}{\sqrt{4t}}} e^{-\alpha^2} d\alpha \quad (2)$$

$$u(x, t) = (T_1 - T_2) \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\frac{x}{\sqrt{4t}}} e^{-\alpha^2} d\alpha \right) \quad (3)$$

$$u(x, t) = (T_1 + T_2) \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\frac{x}{\sqrt{4t}}} e^{-\alpha^2} d\alpha \right) \quad (4)$$

$$I = \int_{\frac{1}{e}}^{\infty} \frac{(\ln x)^r}{1+x^r} dx$$


$$\frac{\pi}{18} \text{ (1)}$$

$$\frac{\pi}{\lambda} \text{ (r)}$$

$$\frac{\pi}{\epsilon} \text{ (r)}$$

$$\frac{\pi}{\lambda} + \frac{\pi}{\epsilon} \quad (\text{F})$$

-11 سه مسئله مقدار مرزی زیر، برای معادله دیفرانسیل لاپلاس داده شده‌اند. جواب کراندار در نیمه نوار قائم و دو نگاشت مناسب از صفحه \bar{Y} به صفحه W و سپس از صفحه W به صفحه Z که جواب‌های کراندار دو مسئله مقدار مرزی، دیگر را بدھند، کدامند؟



$$z = e^w, w = \sin \zeta, T(\xi, \eta) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{\zeta} - \xi \right) \quad (1)$$

$$w = \operatorname{Log} z, \zeta = \sin w, T(\xi, \eta) = \frac{1}{\pi} \left(\xi - \frac{\pi}{\zeta} \right) \quad (2)$$

$$w = \text{Log}z, w = \sin \zeta, T(\xi, \eta) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{\zeta} - \xi \right) \quad (3)$$

$$z = \operatorname{Log} w, w = \sin \zeta, T(\xi, \eta) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{\zeta} - \xi \right) \quad (4)$$

-۱۲- با انتگرال‌گیری از تابع مختلط $f(z) = \frac{e^{az}}{1+e^z}$ ثابت (روى کرانه مستطيل $|x| < R$)

$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ax}}{1+e^x} dx$ ، در جهت مثلثاتی، و سپس میل دادن $R \rightarrow \infty$ ، مقدار $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ay}}{1+e^y} dy$ کدام است؟

$$\frac{\pi}{\sin(\pi a)} \quad (\text{Ans})$$

$$\frac{\pi}{\sin(\pi a)} \quad (\text{v})$$

$$\frac{\gamma\pi}{\sinh(\pi a)} \quad (\text{F})$$

$$\frac{\pi}{\sinh(\pi a)} \quad (\text{v})$$

- ۱۳- اگر $f(z)$ تابع تام، $|f(z)| \leq 1$ و $f(z) = \operatorname{ch} z$ آنگاه مقدار $f(\ln 2)$ کدام است؟

(۱) صفر

$\frac{3}{4}$ (۲)

۱ (۳)

$\frac{8}{5}$ (۴)

- ۱۴- در صورتی که به ازای هر نقطه $z = r_0 e^{i\theta}$ در داخل دایره $\zeta = r_0 e^{i\phi}$ ، $0 < \phi < 2\pi$ داشته باشیم

$$\text{که در آن } f \text{ در درون و روی دایره مذکور تحلیلی است، و } u \text{ قسمت حقيقی } f \text{ باشد، آنگاه } f(r_0 e^{i\theta}) = \frac{r_0^2 - r^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f(r_0 e^{i\phi})}{|\zeta - z|} d\phi$$

در این صورت، کدامیک از موارد زیر، صحیح نیست؟

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P(r_0, r, \phi - \theta) d\phi = 1 \quad (1)$$

$$P(r_0, r, \phi - \theta) = \frac{r_0^2 - r^2}{r_0^2 + 2\pi r_0 \cos(\phi - \theta) + r^2} \quad (2)$$

(۳) تابع $P(r_0, r, \phi - \theta)$ همیشه مثبت است.

(۴) $P(r_0, r, \phi - \theta)$ تابعی زوج و دوره‌ای (متناوب) از $(\phi - \theta)$ است.

- ۱۵- در مورد خودالحق (self Adjoint) بودن معادله دیفرانسیل زیر، کدام عبارت صحیح است؟

$$xy'' + (1-x)y' + ay = 0$$

(۱) با ضرب در x خودالحق می‌شود.

(۲) با ضرب در $\frac{1}{x}$ خودالحق می‌شود.

(۳) با ضرب در e^{-x} خودالحق می‌شود.

(۴) خودالحق است.

- ۱۶- حاصل $\int_S x_i n_j ds$ ، کدام است؟

∇V (۲)

(۱) صفر

$\delta_{ij} S$ (۴)

$\delta_{ij} V$ (۳)

- ۱۷- با توجه به بردارهای رویرو، حاصل $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$ کدام است؟

$$\varepsilon_{jkl} A_{li} A_{lj} A_{rk} \quad (2)$$

$$\varepsilon_{ijk} A_{li} A_{lj} A_{rk} \quad (1)$$

$$\varepsilon_{jik} A_{li} A_{lj} A_{rk} \quad (4)$$

$$\varepsilon_{kji} A_{li} A_{lj} A_{rk} \quad (3)$$

-۱۸ چنانچه معادله مشخصه برای اجسام الاستیک خطی، به صورت $\sigma_{ij} = C_{ijkl}\epsilon_{kp}$ باشد و داشته باشیم: $C_{ijkl} = \lambda\delta_{ij}\delta_{kp} + \mu\delta_{ik}\delta_{jp} + \mu'\delta_{ip}\delta_{jk}$

$$\lambda \quad (1)$$

$$2\lambda \quad (2)$$

$$\mu' \quad (3)$$

$$2\mu' \quad (4)$$

-۱۹ اگر $S_{ij} + 3S_{kk}\delta_{im}\delta_{jm} = T_{ij}$ باشد، مقدار S_{ij} برابر با کدام است؟

$$T_{ij} - \frac{3}{2\lambda} T_{kk} \delta_{ij} \quad (1)$$

$$T_{ij} - \frac{1}{3} T_{kk} \delta_{ij} \quad (2)$$

$$T_{ij} - \frac{1}{75} T_{kk} \delta_{ij} \quad (3)$$

$$T_{ij} - T_{kk} \delta_{ij} \quad (4)$$

-۲۰ با توجه به معادله ساختاری (تنش - کرنش) زیر، برای ماده همگن و ایزوتروپ در حالت کلی، مقدار σ_i^j کدام است؟

$$\sigma_j^i = \frac{E}{1+\nu} (\epsilon_j^i + \frac{\nu}{1-2\nu} \epsilon_m^m \delta_j^i) \quad \frac{E}{1-2\nu} \epsilon_m^m \quad (2)$$

$$\frac{E}{1+2\nu} \epsilon_m^m \quad (4)$$

$$\frac{E}{1-\nu} \epsilon_m^m \quad (1)$$

$$\frac{E}{1+\nu} \epsilon_m^m \quad (3)$$

-۲۱ کدام رابطه، از نظر تانسوری بی معنی است؟

$$C_{ij} = A_{ir}A_{js}B_{rs} \quad (2)$$

$$f_i = x_{i,j}B_j - x_{j,i}B_j \quad (4)$$

$$\sigma_{ij} = C_{ijkm}\epsilon_{kk} \quad (1)$$

$$f_i = \epsilon_{ijk}A_jB_k \quad (3)$$

-۲۲ تانسور تنش در یک نقطه از محیط پیوسته، به صورت زیر داده شده است. اگر بردار تنش در این نقطه برای

صفحه ۶ صفر باشد، پارامترهای A، B و C کدامند؟

$$(\sigma_{ij}) = \begin{pmatrix} \sigma & A\sigma & B\sigma \\ A\sigma & \sigma & C\sigma \\ B\sigma & C\sigma & \sigma \end{pmatrix}$$

$$A = B = C = -\frac{1}{2} \quad (1)$$

$$A = B = C = -1 \quad (2)$$

$$C = -1 \text{ و } A = B = -\frac{1}{2} \quad (3)$$

$$A = -1 \text{ و } B = C = -\frac{1}{2} \quad (4)$$

- ۲۳- توابع i_1, i_2, i_3 به صورت زیر داده شده‌اند. z_1, z_2 و z_3 مختصات کارتزین با بردارهای واحد i_1, i_2 و i_3 و ζ_1, ζ_2 و ζ_3 مختصات غیرمعتمد هستند. مؤلفه‌های بردارهای پایه contravariant یعنی g^1, g^2, g^3 کدامند؟

$$\begin{cases} \zeta_1 = \frac{1}{4}z_1 + \frac{1}{8}z_2 \\ \zeta_2 = -\frac{1}{4}z_1 + \frac{3}{8}z_2 \\ \zeta_3 = z_3 \end{cases}$$

$$g^3 = i_3, g^2 = \frac{1}{4}i_1 - \frac{3}{8}i_2, g^1 = \frac{1}{4}i_1 - \frac{3}{8}i_2 \quad (1)$$

$$g^3 = i_3, g^2 = -\frac{1}{4}i_1 - \frac{3}{8}i_2, g^1 = \frac{1}{4}i_1 - \frac{1}{8}i_2 \quad (2)$$

$$g^3 = i_3, g^2 = \frac{1}{4}i_1 + \frac{3}{8}i_2, g^1 = -\frac{1}{4}i_1 + \frac{1}{2}i_2 \quad (3)$$

$$g^3 = i_3, g^2 = -\frac{1}{4}i_1 + \frac{3}{8}i_2, g^1 = \frac{1}{4}i_1 + \frac{1}{8}i_2 \quad (4)$$

- ۲۴- حرکت یک جسم به صورت $x_3 = X_3 + ktX_1 + X_2$ و $x_2 = (1+kt)X_2$, $x_1 = X_1 + ktX_2$ در آن، k یک عدد ثابت است. اگر حرکت یک المان مادی در $t=0$ در راستای $e_1 + e_2$ باشد، در زمان $t=1$ در کدام راستا خواهد بود؟

$$e_1 + e_2 + e_3 \quad (2)$$

$$e_1 + (1+k)e_2 + (1+k)e_3 \quad (4)$$

$$e_1 + (1+k)e_2 \quad (1)$$

$$e_1 + (1+k)e_2 + e_3 \quad (3)$$

- ۲۵- توابع x_i به صورت زیر داده شده‌اند. i_1, i_2 و i_3 بردارهای یکه مختصات x_1, x_2 و x_3 و ζ_1, ζ_2 و ζ_3 مختصات غیرمعتمد هستند. مؤلفه‌های بردارهای پایه covariant یعنی g_i کدامند؟

$$\begin{cases} x_1 = 3\zeta_1 - \zeta_2 \\ x_2 = 2\zeta_1 + 2\zeta_2 \\ x_3 = \zeta_3 \end{cases}$$

$$g_3 = i_3, g_2 = i_1 + 3i_2, g_1 = 3i_1 + i_2 \quad (1)$$

$$g_3 = i_3, g_2 = -i_1 + 3i_2, g_1 = i_1 + 2i_2 \quad (2)$$

$$g_3 = i_3, g_2 = -2i_1 + i_2, g_1 = 2i_1 + 3i_2 \quad (3)$$

$$g_3 = i_3, g_2 = -i_1 + 2i_2, g_1 = 3i_1 + 2i_2 \quad (4)$$

- ۲۶- تمام مقادیر ویژه یک تانسور حقیقی متقارن، با یکدیگر برابرند. در خصوص این تانسور، کدام مورد صحیح است؟

(۱) سه بردار ویژه متعامد دارد.

(۲) بردار ویژه حقیقی وجود ندارد.

(۳) هر برداری یک بردار ویژه است.

(۴) سه بردار ویژه متفاوت دارد که لازم نیست متعامد باشند.

- ۲۷- تبدیل T ، هر بردار دلخواه a را به یک بردار ثابت n تبدیل می‌کند. در این صورت، T کدام است؟

(۱) یک اسکالر است.

(۲) یک کمیت دوشاخصه‌ای است، اما تانسور نیست.

(۳) یک تانسور مرتبه دو است.

(۴) یک تانسور مرتبه دو است.

- ۲۸- شرط تراکم‌ناپذیری یک جسم جامد، کدام است؟

(۱) معادلات سازگاری ارضا شوند.

(۲) دیورژانس بردار تغییر مکان صفر باشد.

(۳) حاصل جمع سه کرنش عمودی، مقدار ثابتی باشد.

(۴) دترمینان تانسور گرادیان تغییرشکل، مقدار ثابتی باشد.


- ۲۹- قانون بقای اندازه حرکت خطی به صورت $\rho \frac{Dv_i}{Dt} = \sigma_{ji,j} + b_i$ برای کدام مواد، معتبر است؟

- (۱) فقط برای مواد جامد الاستیک
- (۲) فقط برای مواد همسانگرد
- (۳) برای مواد جامد الاستیک و سیال نیوتونی
- (۴) برای همه مواد اعم از جامد، مایع و گاز

- ۳۰- کدام مورد، صحیح است؟

- (۱) تانسور تنش، همواره متقارن است و این تقارن، در تمام دستگاه‌های مختصات برقرار است.
- (۲) در غیاب ممان‌های حجمی (body moments)، تانسورهای تنش کوشی و پایولا کیرشف اول، همواره متقارن هستند.
- (۳) اگر p یک کمیت عددی باشد، حالت تنش هیدرواستاتیک در محیط پیوسته را می‌توان با رابطه $T = -pn$ نشان داد. (T بردار تنش و n یکه بردار است).
- (۴) معادلات حرکت بر اساس قانون اول نیوتون نوشته شده و توصیف‌کننده تغییرات زمانی و مکانی تنش در داخل محیط پیوسته هستند.

- ۳۱- ورق نازکی با ابعاد a و b و ضخامت h ، در شرایط تنش صفحه‌ای مطابق شکل زیر قرار می‌گیرد. تغییر زاویه قائمه \hat{A} ، برابر با کدام است؟



$$(۱) \text{ صفر}$$


$$(۲) \frac{1+v}{E} \tau_0$$

$$(۳) -\frac{2(1+v)}{E} \tau_0, (\text{زیاد می‌شود}).$$

$$(۴) +\frac{2(1+v)}{E} \tau_0, (\text{کم می‌شود}).$$

- ۳۲- بر لبه پایینی صفحه نشان داده شده زیر، بار گسترده σ وارد می‌شود. شرایط مرزی در این لبه در

مختصات قطبی برای $\sigma_{\theta\theta}(r, \frac{2\pi}{3})$ و $\sigma_{r\theta}(r, \frac{2\pi}{3})$ به ترتیب کدامند؟




$$(۱) \sigma^0 \text{ و } -\sigma^0$$

$$(۲) \sigma^0 \text{ و } \sigma^0$$

$$(۳) \frac{\sqrt{3}}{2} \sigma^0 \text{ و } -\frac{1}{2} \sigma^0$$

$$(۴) \frac{\sqrt{3}}{2} \sigma^0 \text{ و } \frac{1}{2} \sigma^0$$


- ۳۳- صفحه‌ای با ابعاد بسیار بزرگ مطابق شکل (الف)، دارای سوراخ گرد کوچکی می‌باشد و تحت کشش یکنواخت σ قرار گرفته است. در نقطه A تنש $\sigma_{xx} = 3\sigma$ و در نقطه B تنش $\sigma_{yy} = -\sigma$ است. اگر همین صفحه، مطابق شکل (ب)، تحت تنش برشی τ قرار گیرد، تنش σ_{xx} در نقطه C کدام است؟




(الف)

(ب)

- ۳۴- ورق نازکی با ابعاد a و b و ضخامت h در حالت تنش صفحه‌ای تحت بار قرار دارد. تغییر ضخامت ورق، کدام است؟




- ۳۵- یک لوله جدار نازک به شعاع متوسط a و ضخامت t در دو حالت (۱) بسته و (۲) باز که دارای شیار باریک سرتاسری می‌باشد، تحت کوپل پیچشی T_o قرار دارد. نسبت تنش برشی حالت (۱) به تنش برشی حالت (۲) کدام است؟



- ۳۶- اگر تانسور تنش در نقطه‌ای برابر $\text{MPa} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ باشد، بردار تنش روی صفحه‌ای که با محورهای x و y زاویه مساوی می‌سازد، کدام است؟

$\frac{1}{\sqrt{2}}(2\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k})$ (۱)	$\frac{1}{\sqrt{3}}(\vec{i} + \vec{j} + \vec{k})$ (۲)
$\frac{1}{\sqrt{3}}(3\vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k})$ (۳)	$\frac{1}{2}(4\vec{i} - 2\vec{j} + 4\vec{k})$ (۴)

- ۳۷ - جزء تنش زیر، تحت وضعیت صفحه‌ای نشان داده شده قرار دارد. تنش قائم روی لبه AC چقدر است؟



$$-\frac{\tau_0}{\sqrt{3}} \quad (1)$$

$$-\frac{\tau_0}{2} \quad (2)$$

$$-\frac{\tau_0\sqrt{3}}{2} \quad (3)$$

$$-\tau_0 \quad (4)$$

- ۳۸ - انتهای بردار تنش (Traction) در یک نقطه از جسم، با تغییر جهت صفحه عبوری از آن، روی کدام رویه حرکت می‌کند؟

(۲) بیضی‌گون

(۱) کره

(۴) هذلولی‌گون

(۳) سهمی‌گون

- ۳۹ - بردارها و مقادیر ویژه ماتریس واحد $I_{n \times n}$ کدامند؟

(۲) هر بردار - واحد

(۱) هر بردار - واحد

(۴) بردار یکه در راستای محور X - سه

(۳) برابر هر بردار یکه - n

- ۴۰ - مقاومت یک جسم الاستیک در برابر فشار هیدرواستاتیک چگونه است؟

(۱) بی‌نهایت کم

(۲) کم

(۳) زیاد

(۴) بی‌نهایت زیاد

- ۴۱ - ساده شده معادله تعادل در میدان تنش هیدرواستاتیک P با نیروی حجمی F، کدام است؟


$$P = F \quad (2)$$

$$P = -F \quad (1)$$

$$\sigma_{ij,j} = -F_i \quad (4)$$

$$\nabla P = F \quad (3)$$

- ۴۲ - دیسکی به قطر D، مطابق شکل زیر، تحت فشار قطربی قرار دارد. تنش قائم در مرکز دیسک و در راستای عمود بر محور بارگذاری چقدر است؟ (P نیروی گستردگی کنواخت وارد بر واحد طول در راستای عمود بر صفحه است).



$$\frac{P}{\pi D}, \text{ کششی} \quad (1)$$

$$\frac{P}{\pi D}, \text{ فشاری} \quad (2)$$

$$\frac{2P}{\pi D}, \text{ کششی} \quad (3)$$

$$\frac{2P}{\pi D}, \text{ فشاری} \quad (4)$$

- ۴۳ - با صرف نظر کردن از نیروهای حجمی، در کدام صورت، میدان تنش درجه دو زیر، پاسخ یک مسئله الاستیسیته صفحه‌ای است؟ (a, b و c ثابت هستند).

$$\begin{cases} \sigma_x = ay^2 \\ \sigma_y = bx^2 \\ \tau_{xy} = cxy \end{cases}$$


$$a = b = c \quad (1)$$

$$a = b = c = 0 \quad (2)$$

$$a + b = 2c \quad (3)$$

$$c = 0, a = -b \quad (4)$$

- ۴۴- یک ورق نازک مربع شکل به طول ضلع a و ضخامت h تحت تنש دو محوری قرار دارد. تغییر طول قطر AD چقدر است؟



$$\frac{a(1+v)}{E}(\sigma_x + \sigma_y) \quad (1)$$

$$\frac{a(1-v)}{E\sqrt{2}}(\sigma_x + \sigma_y) \quad (2)$$

$$\frac{a}{E}(\sigma_x + \sigma_y) \quad (3)$$

(۴) صفر

- ۴۵- رابطه راستاهای اصلی میدان تنش، با راستاهای اصلی قسمتی از آن که علت تغییر شکل است، چگونه است؟

(۱) هم راستا هستند.

(۲) راستاهای آنها بر هم عمودند.

(۳) هیچ رابطه‌ای با هم ندارند.

(۴) راستاهای آنها نسبت به هم، زاویه $\arccos(\frac{1}{\sqrt{3}})$ می‌سازند.