

۱۳۸



F

نام :

نام خانوادگی :

محل امضاء :

صبح جمعه

۹۲/۱۲/۱۶

دفترچه شماره (۱)



اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.

امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی
دورهای دکتری (نیمه مرکز) داخل
سال ۱۳۹۳

زیست‌شناسی
سلولی و ملکولی (۲۲۲۶ کد)

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۰۰


عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (بیوشیمی - بیوفیزیک - میکروبیولوژی - ژنتیک - سلولی و ملکولی - زیست‌شناسی سلولی پیشرفته - ساختار DNA ها و همانندسازی - رونویسی و ترجمه - تنظیم بیان زن)	۱۰۰	۱	۱۰۰

اسنادهای سال ۱۳۹۲

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

- ۱ در بیشتر گلیکوپروتئین‌ها، قند از طریق پیوند گلیکوزیدی به کدام بخش پروتئینی متصل می‌شود؟
- نیتروژن β -آمید یک Gln
 - نیتروژن γ -آمید یک Asn
 - گروه α -آمین انتهای N
 - کدام یک از لیپیدهای زیر دارای گروه کتون می‌باشد؟
- ۲ با توجه به اینکه طول هر نوکلئوتید در مارپیچ DNA $3/4$ انگستروم است و همچنین یک میلیون جفت باز (نوکلئوتید) وزنی معادل 10^{-15} گرم دارد. $1/0$ گرم از DNA چند متر طول خواهد داشت؟
- $3/4 \times 10^{10}$
 - $1/7 \times 10^{10}$
 - $6/8 \times 10^{10}$
 - $3/4 \times 10^{11}$
- ۳ علت ناهنجاری I-disease در انسان چیست؟
- نقص در فسفوترانسفراز
 - عدم بسته‌بندی گلیکوز آمینوگلیکان‌ها در سلول
 - حلقه پیریدین در کدام یک وجود ندارد؟
- ۴
- ۱) دسموزین
۲) ویتامین E
۳) تیامین
۴) NAD⁺
- ۵ آمینو اسید غیرمعمولی که دارای کد رُنیکی می‌باشد، کدام است؟
- سلنوسیستئین
 - کربوکسی گلوتامات
 - هیدروکسی پرولین
 - لیزین
- ۶ کدام رابطه نشان دهنده فشار اسمزی در یک محلول پروتئینی است اگر C غلظت محلول، R ثابت گازها و T دما باشد؟
- $$\pi = \frac{CT}{R} \quad (4)$$
- $$\pi = \frac{RC}{T} \quad (3)$$
- $$\pi = \frac{RT}{C} \quad (2)$$
- $$\pi = CRT \quad (1)$$
- ۷ هنگام تهشیینی ذرات به سمت ته ظرف، چنانچه موقعیت $r_2 > r_1$ باشد، سرعت تهشیینی ذرات:
- در موقعیت r_1 بیشتر از r_2 است.
 - در موقعیت r_2 بیشتر از r_1 است.
 - در موقعیت‌های مختلف برابر است.
- ۸ افزایش تعداد کدام اسید آمینه در پروتئین می‌تواند باعث کند شدن سرعت فولدینگ آن شود؟
- آرژنین
 - تریپتوفان
 - سیستئین
 - گلایسین
- ۹ افزایش تعداد کanal های پروتئینی در ساختار غشاء به ترتیب، باعث چه تغییری در کشش سطحی و ویسکوزیته غشاء می‌گردد؟
- کاهش - کاهش
 - افزایش - افزایش
 - افزایش - کاهش
 - افزایش - افزایش
- ۱۰
- 

- 11 ساختار ملکولی سلول‌ها با چه ابزاری شناسایی می‌گردد؟
 ۱) میکروسکوپ روبشی (Scanning Electron Microscope)
 ۲) میکروسکوپ فوکوس کننده چند لایه (Confocal Microscope)
 ۳) میکروسکوپ تونلی (Tunneling Microscope)
 ۴) میکروسکوپ نیروی اتمی (Atomic Force Microscope)
- 12 کدام یک از پرتوهای رادیواکتیو زیر در میانکنش با بافت پوست انسان، یونیزاسیون متراکم‌تری ایجاد می‌کند؟
 ۱) گاما
 ۲) آلفا
 ۳) بتا
 ۴) پوزیترون
- 13 عامل انتقال ژن در پدیده کونجوگیشن و ترانسفورمیشن و ترانسداکشن به ترتیب عبارتند از
 ۱) پیلی جنسی - ویروس - فاکتور F
 ۲) فاکتور F - فاقد عامل - ویروس
 ۳) فاکتور F - ویروس - فاقد عامل
 ۴) پیلی جنسی - ویروس - فاکتور F
- 14 در همه گروه‌های باکتریایی زیر آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز وجود دارد به جز:
 ۱) باکتری‌های بی‌هوایی اجباری
 ۲) باکتری‌های بی‌هوایی اجباری
 ۳) باکتری‌های بی‌هوایی اختیاری
 ۴) باکتری‌های بی‌هوایی مقاوم در برابر هوا
- 15 هنگامی که باکتری‌ها در معرض پرتو فرابنفش قرار داده می‌شوند و سپس تحت تأثیر نورمرئی با طول موج ۳۶۵ - ۵۱۰ نانومتر قرار می‌گیرند
 ۱) با غیر فعال شدن سیستم SOS باکتری‌های می‌میرند.
 ۲) فعال شدن سیستم SOS موجب ترمیم DNA باکتری می‌شود.
 ۳) با غیر فعال شدن آنزیم فوتولیاز، باکتری‌ها می‌میرند.
 ۴) با فعال شدن آنزیم فوتولیاز، DNA باکتری ترمیم می‌شود.
- 16 کدام گزینه ساختار اپرون را در سلول باکتری بیان می‌کند؟
 ۱) یک گروه ژن که عملکرد بیوشیمیایی مرتبط با هم دارند و با پروموترهای مختلف بیان می‌شوند.
 ۲) یک گروه ژن که از نظر تکاملی به هم نزدیک‌ترند و تحت کنترل یک پرومoter قرار دارند.
 ۳) یک گروه ژن که با پرومoterهای مختلف بیان شده و هدایت کننده چند مسیر بیوشیمیایی هستند.
 ۴) یک گروه ژن که تحت کنترل یک پرومoter قرار داشته و هدایت کننده یک مسیر بیوشیمیایی هستند.
- 17 در کدام چرخه بیوسنتز باکتری‌های اتوتروف در مرحله اول، دی اکسید کربن با ریبوکسون بیس فسفات ترکیب می‌شود؟
 ۱) Glyoxylate cycle
 ۲) Clavin cycle
 ۳) Oxaloacetate cycle
 ۴) Tricarboxilic acid cycle
- 18 کدام گزینه در مورد تترایپتید در ترکیب پپتیدو گلیکان باکتری‌ها صادق است؟
 ۱) L-Lysine دومین اسید آmine در گرم منفی هاست.
 ۲) حضور D-glutamic acid در موقعیت چهارمین اسید آmine در باکتری‌های گرم مثبت و برخی باکتری‌های گرم منفی
 ۳) حضور دی امینو پایمیلیک اسید (DAP) در موقعیت سومین اسید آmine در باکتری‌های گرم منفی و برخی باکتری‌های گرم مثبت
 ۴) اولین اسید آmine‌ای است که به N استیل مورامیک اسید وصل می‌شود.

- ۱۹ فراوان ترین نوع توالی‌ها در ژنوم انسان کدام است؟
 ۱) اینترون‌ها
 ۲) آگزون‌ها
 ۳) ترانس پوزون‌ها
 ۴) ژن‌های کدکننده noncoding long RNAs
- ۲۰ در اووسایت لقاح نیافته‌ی (دوزیستان) ژن‌های زیادی رونویسی شده، mRNA آن‌ها در سلول ذخیره شده و ترجمه نشده‌اند.
 پس از لقاح مقدار فراوانی پروتئین از این mRNA ذخیره تولید می‌شود. تنظیم در اینجا از چه نوع است؟
 ۱) کنترل بعد ترجمه‌ای
 ۲) کنترل از راه تعداد نسخه‌های یک ژن (مقدار ژنی)
 ۳) کنترل از سطح سنتز و گردهمایی ریبوزوم‌ها
 ۴) حضور دو دودمان سلوی از دو تخم مختلف در یک فرد چه نامیده می‌شود؟
- ۲۱ diploidy (۱) در کدام نوع DNA قندهای مجاور در یک رشته در جهت مخالف هم قرار دارند?
 chimaerism (۲) uniparental disomy (۴) G-tetrad (۳) B-DNA (۲) A-DNA (۱)
- ۲۲ در کدام یک از تغییرات کروموزمی زیر در شرایط هوموزیگوس اثرات وخیم‌تری دارد?
 Deletion (۱) Duplication (۲) Inversion (۳) Translocation (۴)
- ۲۳ کدام یک از روش‌های زیر در کشف ژن‌های جدید جزء روش‌های Position independent محسوب می‌شود?
 Sequence Homology (۱) الف - کشف براساس تشابه در توالی‌ها
 Functional Complementation (۲) ب - کشف براساس
 Linkage Analysis (۳) ج - کشف براساس
 Association Study (۴) د - کشف براساس
- ۲۴ (۱) ج و د (۲) ب و د (۳) الف و د (۴) الف و ب
- ۲۵ ترکیب لپیدی غشاء میکروارگانیسم‌هایی که در مناطقی با دمای پایین وجود دارند، باید دارای چه خصوصیاتی باشد؟
 ۱) زنجیر بلند و اشباع
 ۲) زنجیر کوتاه و اشباع
 ۳) زنجیر کوتاه و حاوی پیوندهای دوگانه
 ۴) زنجیر بلند و حاوی پیوندهای دوگانه
- ۲۶ نیمه عمر کدام مولکول RNA کوتاه‌تر است؟
 ۱) mRNA پروکاریوتی (۲) tRNA پروکاریوتی (۳) rRNA پروکاریوتی (۴) tRNA یوکاریوتی
- ۲۷ در RNA پلی‌مراز II یوکاریوتی، کدام مورد از نقش‌های فاکتور TFIIIF است؟
 ۱) ATPase (۲) ATP (۳) کینازی (۴) هلیکازی
- ۲۸ چرا برخی tRNA‌ها قادر به شناسایی چندین کدون می‌باشند؟
 ۱) به دلیل داشتن بازوی متغیر
 ۲) به علت متیله شدن در نوکلئوتید خاص
 ۳) به دلیل داشتن باز وبل (wobble)
- ۲۹ ترشح کدام دسته از ترکیبات پروتئینی زیر از شبکه اندوپلاسمی به صورت تنظیم شده نمی‌باشد؟
 ۱) ترپیسین (۲) کازین (۳) کلارن (۴) گلوكاگون
- ۳۰ کدام یک از ساختارهای زیر در فضای بین دو غشای میتوکندری جای می‌گیرد؟
 ۱) پورین (۲) سیتوکروم C (۳) سوپراکسید دسیمومتاز (۴) سیتوکروم C-اکسیداز

- ۳۱ غیرفعال شدن کدام cdk موجب شروع Cytokinesis می‌شود؟
 ۱) cdk1 (۲) cdk2 (۳) cdk4 (۴) cdk6
- ۳۲ در کدام کلاس پمپ یونی، انتقال همراه با فسفریلاسیون است؟
 ۱) V (۲) P (۳) F (۴) ABC
- ۳۳ کدام پروتئین در جوانه زدن وزیکول‌های پوشیده شده از COP II دخیل است؟
 ۱) ARF (۲) SNARE (۳) SAR I (۴) Clathrin
- ۳۴ تمامی پروتئین‌های زیر در هسته‌ی نوکلئوزوم هستند به جزء:
 ۱) H1 (۲) H3 (۳) H4 (۴) H2A
- ۳۵ سلول‌های غیراپتلیالی مانند فیبروبلاست‌ها از طریق چه نوع اتصالی به ماتربیکس خارج سلول متصل می‌شوند?
 ۱) پلکتین (۲) فشرده (Tight-junction)
 ۳) همی دسموزوم (۴) کانونی (Focal adhesion)
- ۳۶ در پستانداران ویژگی‌های پمپ کلسیم (Ca^{2+} – ATPase) کدام است؟
 ۱) به ازای مصرف یک مولکول ATP، یک یون Ca^{2+} به لومن شبکه سارکوپلاسمیک وارد می‌شود.
 ۲) به صورتی عمل می‌کند که در غشاء سارکوپلاسمیک یون کلسیم آزاد نموده و متأثر از پروتئین دیگری نمی‌باشد.
 ۳) پروتئینی است با چندین زنجیره پلی‌پیتیدی و با عمل خود موجب انقباض عضلانی می‌شود.
 ۴) در غشاء سلول‌های عضلانی و گلیویل قرمز وجود دارد و فعالیت آن متأثر از پروتئین کالمودیولین است.
- ۳۷ کدام یک از اجزاء سلولی زیر با اسکلت پروتئینی متشکل از لامین‌ها همراه است؟
 ۱) غشاء پایه (۲) کلروفلاست (۳) متیوکندری (۴) هسته
- ۳۸ کدام گزینه از ویژگی‌های تعیین کننده در کلازن است؟
 ۱) هر مولکول کلازن از سه پلی‌پیتید که به طور چپ‌گرد به هم پیچیده‌اند، ساخته شده است.
 ۲) دارای ترکیبات اسید آمینه‌ای غیرمعتارف مانند هیدروکسی لاکزین و هیدروسوکی پرولین می‌باشد.
 ۳) پایداری فیبرهای کلازنی به دلیل وجود پیوندهای دی‌سولفیدی بین مولکول‌های کلازن می‌باشد.
 ۴) پروکلازن‌ها در دستگاه گلتری توسط پیتیداز به مولکول‌های تروپوکلازن تبدیل می‌شوند.
- ۳۹ کدام یک از رشته‌های بینابینی در فیبروبلاست‌ها به حفظ شکل سلول کمک می‌کنند؟
 ۱) دزمین (۲) کراتین‌های اسیدی (۳) نستین (۴) ویمنتین
- ۴۰ کدام مورد در رابطه با غشاء پلاسمایی درست می‌باشد؟
 ۱) حذف کلسترول از غشاء پلاسمایی سلول‌های جانوری تأثیری در سیالیت آن‌ها ندارد.
 ۲) در رفت‌ها میزان کلسترول و فسفوتیدیل کولین بیشتر از سایر فسفولیپیدهای است.
 ۳) برخلاف فسفولیپیدهای کلسترول به یک میزان در دو لایه فسفولیپیدی پخش شده است.
 ۴) detergent‌ها بیشترین تأثیر را روی رفت‌های لیپیدی می‌گذارد و آن‌ها را بیشتر تخریب می‌کند.
- ۴۱ کدام اتفاق در آپیتوز صورت نمی‌گیرد؟
 ۱) با فعال شدن ۸ procaspase ساختار MOMP شکل می‌گیرد.
 ۲) همراه با سیتوکروم C در تشکیل Apoptosome نقش دارد.
 ۳) با مهار Bim مانع از آپیتوز می‌شود.
 ۴) با فعال کردن Box باعث آپیتوز می‌شود.
- ۴۲ کدام آنتی‌بیوتیک موجب غلط خوانی کد ژنتیکی می‌شود؟
 ۱) استرپتومایسین (۲) ارتیرومایسین (۳) تتراسیکلین (۴) پورومایسین

-۴۳ در آزمایش‌های گوناگون، کدام مورد بیشتر به عنوان ممانعت کننده تشکیل میکروتوبول‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

- (۱) لاترون کولین (۲) فالوئیدین (۳) نوکودازول (۴) تاکسول

-۴۴ در چرخه سلولی کدام مطلب در مورد MPF فعال (mitotic promoting factor) صدق می‌کند؟

- (۱) پروتئین سیکلین به cdk متصل نباشد.

(۲) دایمر هتروپروتئین کیناز جایگاه ۱۴ و ۱۵ دارای فسفات باشد.

(۳) در جایگاه ۱۶۱ ترئونین دارای فسفات باشد (فسفریله شود).

(۴) دایمر هتروپروتئین کیناز در جایگاه ۱۴ و ۱۵ فسفات خود را از دست بدهد.

-۴۵ در مسیر سیگنالی MAP kinase:

(۱) مولکول Raf به عنوان یک Phosphatase عمل می‌کند.

(۲) مولکول Ras به عنوان یک G-protein عمل می‌کند.

(۳) مولکول SOS به عنوان فعال کننده GAP (GTPase) عمل می‌کند.

(۴) گیرنده مستقیماً Ras را فعال می‌کند.

-۴۶ پروتئین‌های غشاء داخلی میتوکندری از چه مسیری از سیتوزول وارد این غشا می‌شوند؟

(۱) همه آن‌ها ابتدا وارد ماتریکس میتوکندری شده و سپس از ماتریکس وارد غشاء داخلی می‌شوند.

(۲) همه آن‌ها بدون ورود به ماتریکس مستقیماً وارد غشاء داخلی میتوکندری می‌شوند.

(۳) بعضی از آن‌ها بعد از ورود به ماتریکس وارد غشاء داخلی میتوکندری می‌شوند.

(۴) مکانیزم ورود آن‌ها هنوز شناخته شده نمی‌باشد.

-۴۷ موتاسیون در کدام گروه از پروتئین‌ها مانع از ورود پروتئین‌ها از سیتوزول به ماتریکس میتوکندری می‌شود؟

TOM 20 .TOM 40 .TIM 23 (۲)

TOM 70 .TOM 40 .TIM 22 (۱)

TOM 40 .TIM 22 .TIM 23 (۴)

TOM 20 .TOM 40 .TIM 22 (۳)

-۴۸ فعال شدن رو دوپسین توسط نور باعث فعال شدن کدام یک از G پروتئین‌های زیر می‌شود؟


Gαi (۴)

Gαq (۳)

Gαs (۲)

Gαt (۱)

-۴۹ در شکل زیر اگر زنجیره جانبی اسیدهای آمینه متصل به چاپرون از اسیدهای آب‌گریز مثل تریپتوفان و فنیل آلانین باشد، چاپرون متصل شده به پلی‌پپتید کدام است؟



Bip (۱)

PDI (۲)

Calnexin (۳)

Prolyl-peptidyl isomerase (۴)

-۵۰ در یاخته‌های جهش یافته Sec 61، پروتئین‌های ترشحی در چه محلی تجمع می‌یابند؟

(۱) دستگاه گلزی (۲) سیتوزول (۳) شبکه آندوپلاسمی (۴) وزیکول‌های ترشحی

(۳) شبکه آندوپلاسمی

(۲) سیتوزول

(۱) دستگاه گلزی

-۵۱ pH درون کدام یک از اورگانل‌های زیر نسبت به سیتوزول قلیایی‌تر است؟

(۳) میتوکندری

(۲) لیزوژوم

(۱) اندوزوم

(۴) واکوئول

- ۵۲ پروتئین حد فاصل اتصال بین کلاترین و گیرنده مانوز ۶-فسفات چه نام دارد؟
- COP II (۴) COP I (۳) Elastin (۲) Adaptin (۱)
- ۵۳ در مورد پروتئین‌های محلول موجود در لومن شبکه آندوپلاسمی، گزینه صحیح کدام است؟
- به علت وجود گیرنده‌های ویژه در غشاء شبکه آندوپلاسمی، نمی‌توانند از آن خارج شوند.
 - انتقال آن‌ها به داخل شبکه آندوپلاسمی از طریق تحرک در غشاء شبکه آندوپلاسمی صورت می‌گیرد.
 - دارای ترادفهای EKDL در انتهای کربوکسی خود می‌باشند.
 - تمکیل گلیکوزیلاسیون آن‌ها در سیس گلزی اتفاق می‌افتد.
- Ribosome چیست؟
- ۵۴
- ۵۵ ۱) پروتئین‌های ریبوزومی را تجزیه می‌کند.
۲) پروتئینی است که در ساختار ریبوزوم شرکت دارد.
۳) RNA است که خاصیت آنزیمی دارد.
۴) سیتوکنیز در سلول‌های جانوری توسط کدام یک انجام می‌گیرد؟
- ۵۶ ۱) انقباض فیلامنت‌های اکتین در اطراف محدوده سلولی
۲) آندوسيتوز غشاء پلاسمایی اطراف استوای سلول
۳) حرکت فیبرهای دوک میتوزی
۴) مهم‌ترین عامل در القاء حالت quiescence در مرحله GO چرخه سلولی کدام است؟
- Rb (۱) فسفوریلاسیون (۲) عدم فسفوریلاسیون (۳) فعالیت کمپلکس Cyclin/CDK (۴) مهار CKI
- ۵۷ ۱) افرادی که دارای گروه خونی B هستند، دارای کدام نوع آنزیم می‌باشند؟
۲) گلیکوزیل ترانسفراز اضافی
۳) استیل گلوبول آمین ترانسفراز اضافی
۴) N-استیل گلوبول آمین ترانسفراز اضافی
- ۵۸ ۱) در کدام مرحله از سیکل سلولی اوویست انسان بیشترین میزان رونویسی مشاهده می‌شود؟
۲) Faz S (۱) Faz G1 (۲) Faz G2 (۳) Faz M
- ۵۹ ۱) رشته‌های میکروتوبولی، رشته‌های اکتینی و رشته‌های میکروتوبولی
۲) رشته‌های اکتینی، رشته‌های اکتینی و رشته‌های اکتینی
۳) رشته‌های میکروتوبولی، رشته‌های میکروتوبولی و رشته‌های اکتینی
۴) رشته‌های اکتینی، رشته‌های میکروتوبولی و رشته‌های میکروتوبولی
- ۶۰ کدام مورد در ارتباط با نقش فاکتورهای رشد در تنظیم چرخه سلولی نمی‌باشد؟
- ۶۱ ۱) افزایش سنتز Cyclin D (۲) فعال کردن کمپلکس cdk2/cyclin E (۳) پیشرفت سلول از G1 به G1
- ۶۲ ۱) پس از تکمیل همانندسازی DNA
۲) پس از لقاح اسپرم با اووسمیت در انتهای میوز
۳) پس از لقاح اسپرم با اووسمیت در فاز G1
- (Spontaneous Mutation) کدام نوکلئوتید در DNA می‌تواند به عنوان کاندید Hot spot جهت جهش‌های خودبه‌خودی مطرح گردد؟
- G (۴) C (۳) A (۲) T (۱)

- ۶۳ در DNA *E. coli* پلیمراز III. یک Holoenzyme است و از ۱۰ زیر واحد تشکیل شده است. آن کدام است؟
- ۲) زیر واحدهای آلفا، بتا و گاما
 - ۴) زیر واحدهای اپسیلون، بتا و گاما
- ۶۴ در DNA به طول ۳۰۰ جفت باز، عدد اتصال (LK) برابر ۳۳ است. کدام گزینه در مورد DNA صحیح است؟ (طول هر مارپیچ ۱۰ bp فرض شود).
- ۱) $W_r = 30$
 - ۲) $T_w = 33$
 - ۳) سوپر کوبل منفی دارد.
 - ۴) سوپر کوبل مثبت دارد.
- ۶۵ به کدام دلیل، طی تکامل، تیمین در ساختار DNA قرار گرفته است؟
- ۱) افزایش پایداری DNA نسبت به RNA
 - ۲) کاهش جهش تیمین نسبت به یوراسیل
 - ۳) کاهش جهش تیمین به یوراسیل به وسیله ترمیم DNA
 - ۴) کاهش جهش سیتوزین به یوراسیل به وسیله سیستم ترمیم کدام جمله در مورد آنزیمهای توپوایزومراز نوع II. نادرست است؟
- ۶۶ -۶۷
- ۱) در هر واکنش عدد اتصال، ۲ واحد تغییر می‌کند.
 - ۲) آنزیم توپوایزومراز نوع II برای عملکرد خود به GTP نیاز ندارد.
 - ۳) آنزیم توپوایزومراز نوع II به انتهای ۵' DNA متصل می‌شود.
 - ۴) آنزیم توپوایزومراز نوع II برای عملکرد خود به یون Mg^{++} نیاز ندارد.
- ۶۸ به پروتئین‌های مشابه با SSBP در سلول‌های یوکاریوتی چه می‌گویند؟
- Replication Factor A (۴)
- Topoisomerase (۳)
- Dna B (۲)
- PCNA (۱)
- در همانندسازی DNA میتوکندریایی با روش D loop، کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟
- ۱) پس از کامل شدن همانندسازی یک رشته ژنوم دختری جدا می‌گردد.
 - ۲) شروع سنتز پرایمر در روی رشته L صورت می‌گیرد.
 - ۳) اندازه لوب در ژنوم پستانداران ۵۰۰ تا ۶۰۰ جفت باز می‌باشد.
 - ۴) همانندسازی رشته H و L در دو زمان متفاوت صورت می‌گیرد.
- ۶۹ باز شدن دو رشته DNA در دمای Tm را DNA breathing یا تنفس DNA می‌نامند.
- ۱) زیر - برگشت‌پذیر
 - ۲) بالای - برگشت‌پذیر
 - ۳) بالای - برگشت‌ناپذیر
 - ۴) زیر - برگشت‌ناپذیر
- ۷۰ در آنزیم DNA polymerase III کدام زیر واحد به عنوان Clamp loader عمل می‌کند؟
- ۱) آلفا
 - ۲) بتا
 - ۳) اپسیلون
 - ۴) گاما
- ۷۱ کدام فرم DNA در محیط‌هایی با رطوبت کم و حضور یون Li^+ تشکیل می‌شوند؟
- Z - DNA (۴)
- C - DNA (۳)
- B - DNA (۲)
- A - DNA (۱)
- در سلول‌های یوکاریوتی آنزیم DNA ligase برای فعال شدن از کدام ترکیب استفاده می‌کند؟
- FADH2 (۴)
- GTP (۳)
- NAD⁺ (۲)
- ATP (۱)
- ۷۲ دو پروتئینی که با اتصال به یکدیگر موجب هماهنگی بین فرآیند همانندسازی و بسته‌بندی نوکلئوزوم می‌شوند، کدامند؟
- TaZ₁ و HIRA (۴)
- CAF₁ و HIRA (۲)
- PCNA (۳)
- ۷۳
- ۷۴ در سلول‌های یوکاریوتی آنزیم Primase به همراه کدام عامل دیده می‌شود؟
- ۱) هلیکاز
- ۲) DNA پلیمراز I
- ۳) DNA پلیمراز α

- ۷۵ طی کنترل اپرون Lac
 ۱) cAMP هیچگونه نقش کنترلی ندارد.
 ۲) cAMP به مهارکننده Lac متصل می‌شود.
- ۷۶ یک فاکتور رونویسی (TF) اختصاصی معمولاً به کدام بخش از DNA قابل اتصال است؟
 ۱) Activator
 ۲) Insulator
 ۳) Enhancer
 ۴) TATA
- ۷۷ کدام مورد از ویژگی‌های ژن‌های نقش‌پذیر (Imprinting Genes) نیست?
 ۱) میزان بیان آلل‌های مادری و پدری با هم برابر نیست.
 ۲) ژن‌های نقش‌پذیر دارای توالی تکراری و اینtron‌های بزرگتر هستند.
 ۳) عمدۀ ژن‌های نقش‌پذیر در پست‌انداران به صورت Gene Cluster قرار دارد.
 ۴) متیلاسیون افتراقی در مناطق کنترلی نقش‌پذیر در بیان ژن‌های نقش‌پذیر نقش دارد.
- ۷۸ TFIIS به چه مکانیزمی نقش خود را به عنوان elongation factor در رونویسی ژن‌های یوکاریوتی ایفا می‌کند?
 ۱) با خاصیت هلیکازی خود ساختارهای دوم را از پیش روی RNA پلی‌مراز برمی‌دارد.
 ۲) با شرکت در جایگاه فعال آنزیم خاصیت پلی‌مرازی آن را به اگزو‌نوكلیازی تغییر می‌دهد.
 ۳) با اتصال RNA پلی‌مراز سرعت حرکت آن را در روی رشته الگو بالا می‌برد.
 ۴) با اتصال به RNA پلی‌مراز ماندگاری (processivity) آن را بر روی رشته الگو بالا می‌برد.
 در فاز لامبدا پروتئین N با چه مکانیزمی مانع از پایان رونویسی می‌شود؟
 ۱) با خنثی کردن عمل NusA به عنوان فاکتور پایان رونویسی عمل می‌کند.
 ۲) به عنوان هلیکاز باعث باز شدن سنجاق سر می‌شود.
 ۳) با اتصال همزمان با NusA به بخش بالادستی سنجاق سر مانع از تشکیل سنجاق سر می‌شود.
 ۴) با اتصال به منطقه غنی از u در روی رونوشت مانع از توقف RNA پلی‌مراز در این منطقه می‌شود.
- ۷۹ در شرایط کمبود سطوح نیتروژن و بیان ژن glnA
 ۱) NtrC توسط کیناز NtrB فسفریله می‌شود.
 ۲) CAP بیان ژن را فعال می‌کند.
 ۳) NtrC به صورت تک جزئی به جایگاه اتصالی اش متصل می‌شود.
 ۴) پلیمراز با اتصال به σ^{74} به راه‌انداز glnA متصل می‌شود.
- ۸۰ RNA Ribonucleic acid
 ۱) CAP بیان ژن را فعال می‌کند.
 ۲) NtrC توسط کیناز NtrB فسفریله می‌شود.
 ۳) NtrC به صورت تک جزئی به جایگاه اتصالی اش متصل می‌شود.
 ۴) پلیمراز با اتصال به σ^{74} به راه‌انداز glnA متصل می‌شود.
- ۸۱ RNA Ribonucleic acid
 ۱) شروع رونویسی
 ۲) ختم سنتز پروتئین
 ۳) شروع رونویسی
 در موتیف bHLH گزینه غلط کدام است?
 ۱) این موتیف به صورت دایمر می‌باشد.
 ۲) مارپیچ کوتاه‌تر با DNA اتصال می‌یابد.
 ۳) دو مارپیچ آلفا به وسیله یک loop به هم وصل شده‌اند.
 ۴) مارپیچ طویل‌تر ۱۵ آمینو اسید دارد که غنی از آمینواسیدهای بازی است.
- ۸۲ نقش CIII در تنظیم چرخه زندگی فاز لامبда کدام است?
 ۱) کمک به پایداری CII
 ۲) کمک به رونویسی از پرومотор P_L
 ۳) کمک به رونویسی از پرومotor RE
- ۸۳ سومویلاسیون (sumoylation) هیستون‌ها موجب کدام‌یک از موارد زیر می‌شود؟
 ۱) کاهش رونویسی
 ۲) افزایش رونویسی
 ۳) کاهش پروتئین‌سازی
 ۴) افزایش پروتئین‌سازی

- ۸۵ در اپرون **E. coli** are BAD در باکتری
 ۱) یک فعال کننده و یک مهار کننده مسئول تنظیم بیان ژن می باشند.
 ۲) فعال سازی راه انداز در غیاب آرabinoz و حضور گلوکز انجام می گیرد.
 ۳) AraC پس از اتصال به گلوکز به DNA متصل می شود.
 ۴) دو فعال کننده مسئول تنظیم بیان ژن می باشند.
- ۸۶ در مورد باکتری **B. subtilis** که توسط باکتریوفاژ $\phi 29$ آلوده می شود، تنظیم کننده P_4
 ۱) به CAP در α CTD متصل می شود.
 ۲) با اتصال به مجاورت P_{A2C} به عنوان فعال کننده عمل می کند.
 ۳) با اتصال به CAP در فعال سازی ژن عمل می کند.
 ۴) با اتصال به جایگاهی در مجاورت راه انداز P_{A3} به عنوان فعال کننده عمل می کند.
- ۸۷ در مورد تنظیم مشتب اپرون لاکتوز کدام مورد صحیح نمی باشد?
 ۱) در شرایط کمبود گلوکز آنزیم adenylyl cyclase فعال می گردد.
 ۲) پروتئین Cap با زیر واحد β آنزیم RNA Pol اندر کنش می دهد.
 ۳) cAMP به پروتئین Cap متصل می گردد و اتصال آن را به توالی تنظیمی اپران تحریک می کند.
 ۴) اتصال آنزیم RNA Pol به پرومотор باعث فعال شدن زیر واحد β و β' آن می گردد.
- ۸۸ در سیستم :RNAi
 ۱) siRNA در انتهای ۵' دارای دو نوکلئوتید اضافی است.
 ۲) باعث تجزیه mRNA هدف می شود.
 ۳) رشته آنتی سنس siRNA به mRNA هدف متصل می شود.
 ۴) رشته سنس mRNA به siRNA هدف متصل می شود.
- ۸۹ در طی آغاز ترجمه پروکاریوتی، برقراری ارتباط بین زیر واحد های 40S و 60S ریبوزوم مستلزم کدام است؟
 ۱) رهایی eIF1 و eIF5 ۲) رهایی eIF5B.GTP ۳) رهایی eIF3 و eIF5 ۴) رهایی eIF1 و eIF3
- ۹۰ تراویف های**shine-delgarno**
 ۱) بعد از کدون آغازین در mRNA پروکاریوتی قرار دارد.
 ۲) قبل از کدون آغازین در mRNA پروکاریوتی قرار دارد.
 ۳) با اتصال به قسمت ۵' RNA ریبوزومی 23S موجب اتصال mRNA به ریبوزوم می گردد.
 ۴) با اتصال به قسمت ۳' RNA ریبوزومی 16S موجب اتصال ریبوزوم به mRNA می گردد.
- ۹۱ ریبوزوم چگونه پیوند هیدروژنی نادرست بین کدون و آنتی کدون را تشخیص می دهد?
 ۱) وجود پیوند هیدروژنی بین 23srRNA و شiar اصلی تشکیل شده بین کدون و آنتی کدون
 ۲) وجود پیوند هیدروژنی بین 23srRNA و شiar فرعی تشکیل شده بین کدون و آنتی کدون
 ۳) وجود پیوند هیدروژنی بین 16srRNA و شiar فرعی تشکیل شده بین کدون و آنتی کدون
 ۴) وجود پیوند هیدروژنی بین 16srRNA و شiar اصلی تشکیل شده بین کدون و آنتی کدون
- ۹۲ کدام آنتی بیوتیک، EF-Tu را مهار می کند?
 Kirromycin (۴) Puromycin (۳) Fusidic acid (۲) Erythromycin (۱)
- ۹۳ فاکتور رونوشت برداری SL1 مربوط به کدام RNA می باشد?
 Poly A⁻mRNA (۴) snRNA (۳) rRNA (۲) tRNA (۱)
- ۹۴ قطعه ۵S RNA ریبوزومی توسط کدام RNA پلی مراز ساخته می شود?
 III و II (۴) III (۳) II (۲) I (۱)

- ۹۵ در کدام یک، در شناسایی آنزیم آمینواسیل tRNA سنتتاز نقش دارد؟
- (۱) بازوی D
 - (۲) TψC
 - (۳) بازوی متغیر (Variable arm)
 - (۴) بازوی پذیرنده (Acceptor arm)
- ۹۶ کدام مورد در رابطه با توالی پلی A در انتهای mRNA -^۳ که در هسته سنتز می‌شود، صحیح است؟
- (۱) توسط RNA پلی مراز II رونویسی می‌شود.
 - (۲) به عنوان یکی از خصوصیات rRNA و tRNA مطرح است.
 - (۳) بعد از برش انتهای ^۳ در Pre-mRNA به توالی اضافه می‌شود.
 - (۴) به توالی‌های رندوم واقع در ناحیه غیر ترجمه شونده متصل است.
- ۹۷ پوروماسین (puromycin) چگونه فرایند ترجمه را مختل می‌کند؟
- (۱) این آنتی‌بیوتیک شبیه یک aa در جایگاه A وارد شده و در تشکیل باند پیتیدی شرکت کرده و به دنبال آن از ریبوزوم جدا شده و باعث ختم ترجمه می‌شود.
 - (۲) این آنتی‌بیوتیک شبیه یک aa در جایگاه A وارد شده و با کاهش امکان جفت شدن کدون و آنتی‌کدون، ترجمه را مختل می‌کند.
 - (۳) این آنتی‌بیوتیک شبیه یک aa در جایگاه A وارد شده و از اتصال aa tRNA به جایگاه A جلوگیری می‌کند.
 - (۴) این آنتی‌بیوتیک به نزدیک جایگاه A ساپ یونیت 30S متصل شده و از ترانسلوکاسیون tRNA جلوگیری می‌کند.
- ۹۸ اگر در مخمر نان AAG رمز لیزین و اولین رمز ساختاری روی mRNA پاشد، لیزین همراه tRNA اختصاص خود پس از رسیدن به ریبوزوم در کدام جایگاه قرار می‌گیرد؟
- (۱) A
 - (۲) E
 - (۳) P
 - (۴) Anticodon
- ۹۹ در سنتز پروتئین و در مرحله فعال‌سازی اسیدهای آمینه، کدام فعالیت آمینواسیل tRNA باعث می‌شود که اسید آمینه اشتباهی از tRNA جدا شود؟
- (۱) تیواسترازی
 - (۲) هیدرولازی
 - (۳) آندونوکلئازی
 - (۴) فسفودیاسترازی
- ۱۰۰ در فرآیند پروتئین‌سازی جدا کردن پیوند tRNA از آمینواسید قبلی، بروای تشکیل پیوند پیتیدی بر عهده کدام آنزیم است؟
- (۱) آمینواسیل tRNA ترانسفراز
 - (۲) پیتیدیل ترانسفراز
 - (۳) فسفولیاز
 - (۴) دی‌پیتید ایزومراز