

۱۲۱F

نام :

نام خانوادگی :

محل امضاء :

صبح جمعه

۹۲/۱۲/۱۶

دفترچه شماره (۱)



اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.

امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

## آزمون ورودی دورهای دکتری (نیمه مرمرکز) داخل سال ۱۳۹۳

مجموعه شیمی  
فیتوشیمی (کد ۲۲۱۸)

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۶۰


عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (شیمی آلی پیشرفته + شیمی ترکیبات طبیعی + جداسازی و شناسایی ترکیبات طبیعی)	۶۰	۱	۶۰

اسندهای سال ۱۳۹۲


این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.



ترتیب افزایش ممان دوقطبی ترکیب‌های زیر کدام است؟


-۲



- A > B > C (۱)  
 B > C > A (۲)  
 C > A > B (۳)  
 C > B > A (۴)


کدام ترکیب در دو واکنش زیر سریع تر واکنش می‌دهد؟

-۳




- C > D . A > B (۱)  
 D > C . A > B (۴)

- D > C . B > A (۱)  
 C > D . B > A (۴)


با توجه به مقادیر  $\rho$ ، کدام عبارت برای دو واکنش زیر صحیح است؟

- ۱) واکنش A از مکانیسم  $SN_1$  و با  $\rho = -0.3$  و واکنش B از مکانیسم  $SN_2$  و با  $\rho = -5.1$  انجام می‌شود.
- ۲) واکنش A از مکانیسم  $SN_2$  و با  $\rho = -0.3$  و واکنش B از مکانیسم  $SN_1$  و با  $\rho = -5.1$  انجام می‌شود.
- ۳) واکنش A از مکانیسم  $SN_2$  و با  $\rho = -5.1$  و واکنش B از مکانیسم  $SN_1$  با  $\rho = -0.3$  انجام می‌شود.
- ۴) واکنش A از مکانیسم  $SN_1$  و با  $\rho = -5.1$  و واکنش B از مکانیسم  $SN_2$  با  $\rho = -0.3$  انجام می‌شود.


با توجه به مقادیر  $\rho$ ، کدام عبارت برای مکانیسم واکنش‌های A و B در مورد هیدرولیز مشتقات بنزوئیل کلروید صحیح است؟

- ۱) مکانیسم A با گروه‌های الکترون دهنده و  $\rho = -4/4$  و مکانیسم B با گروه‌های الکترون کشنده و  $\rho = 2/5$  انجام می‌شود.
- ۲) مکانیسم A با گروه‌های الکترون کشنده و  $\rho = -4/4$  و مکانیسم B با گروه‌های الکترون دهنده و  $\rho = 2/5$  انجام می‌شود.
- ۳) مکانیسم A با گروه‌های الکترون دهنده و  $\rho = 2/5$  و مکانیسم B با گروه‌های الکترون کشنده و  $\rho = -4/4$  انجام می‌شود.
- ۴) مکانیسم A با گروه‌های الکترون کشنده و  $\rho = 2/5$  و مکانیسم B با گروه‌های الکترون دهنده و  $\rho = -4/4$  انجام می‌شود.

ساختار محصول واکنش زیر کدام است؟



آرایش فضایی مطلق مراکز کایرال در ترکیب زیر کدام است؟





۲S و ۳S و ۴R (۱)

۲R و ۳S و ۴S (۲)


۲R و ۳S و ۴R (۳)

۲S و ۳R و ۴S (۴)

پایدارترین کنفورمر ترکیب زیر کدام است؟




(4)



(3)



(2)



(1)

کدام گزینه واکنش isodesmic مناسب برای محاسبه انرژی رزوئانس است؟



(1)



(2)




(3)





(4)

محصول اصلی واکنش زیر کدام است؟



در مورد دو واکنش زیر که از طریق حد واسط فنونیم پیش می‌روند، گزینه صحیح کدام است؟







(۱) به تریو (threo) که فعال نوری است تبدیل می‌شود.

(۲) به اریترو (erythro) که فعال نوری است تبدیل می‌شود.

(۳) به تریو (threo) که فعال نوری است تبدیل می‌شود.

(۴) به اریترو (erythro) که فعال نوری است تبدیل می‌شود.

واکنش هیدرولیز کدام یک از دو جفت ترکیب‌های زیر سریع‌تر انجام می‌شود؟



C > D , B > A (4)

D > C , A > B (3)

C > D , A > B (2)


D > C , B > A (1)

مکانیسم تبدیل زیر کدام است؟



(۱) الکتروسیکلی (cycloaddition) (۲) (electrocyclic)  
(ene reaction) (۴) واکنش «إن» (sigmatropic)

مرکز فعال دو ترکیب زیر برای دریافت  $\text{H}^{\oplus}$  کدام است:




(۱) در هر دو ترکیب کربن شماره ۱

(۲) در هر دو ترکیب کربن شماره ۲


(۳) در ترکیب A کربن شماره ۱ و در ترکیب B کربن شماره ۲

(۴) در ترکیب A کربن شماره ۱ و در ترکیب B کربن شماره ۳

در واکنش زیر کدام حد واسط تشکیل می‌شود؟



با توجه به دو واکنش زیر، گزینه صحیح کدام است؟



۱) محصول واکنش (a)، ترانس و سرعت واکنش (a) کمتر از واکنش (b) است.

۲) محصول واکنش (a)، ترانس و سرعت واکنش (a) بیشتر از واکنش (b) است.


۳) محصول واکنش (a)، سیس و سرعت واکنش (a) بیشتر از واکنش (b) است.

۴) محصول واکنش (a)، سیس و سرعت واکنش (a) کمتر از واکنش (b) است.

با توجه به واکنش زیر، کدام واکنشگرها گزینه صحیح است؟

i)  $\text{NH}_3$    ii)  $\text{NaOH} / \text{heat}$    (2)i)  $\text{N}_2\text{H}_4$    ii)  $\text{NaOH} / \text{heat}$    (1)i)  $\text{N}_2\text{H}_4$    ii)  $\text{NaNO}_2 / \text{HCl} / 5^\circ\text{C}$    (4)i)  $\text{NH}_3$    ii)  $\text{NaNO}_2 / \text{HCl} / 5^\circ\text{C}$    (3)

با توجه به دو واکنش زیر، گزینه صحیح کدام است؟



۱) واکنش (b) سریع‌تر از (a) انجام می‌شود.

۲) واکنش (a) سریع‌تر از (b) انجام می‌شود.

۳) هر دو واکنش با سرعت یکسان حلal کافت (solvolysis) می‌شوند.


۴) در واکنش (b) ترکیب حلal کافت نمی‌شود در حالی که ترکیب در واکنش (a) با سرعت زیاد حلal کافت می‌شود.

با توجه به محصول دو واکنش زیر، گزینه صحیح کدام است؟






- ۱) واکنش (a) سریع‌تر از (b) و محصول واکنش (a) exo است.
- ۲) واکنش (b) سریع‌تر از (a) و محصول واکنش (a) endo است.
- ۳) واکنش (a) سریع‌تر از (b) و محصول واکنش (a) endo است.
- ۴) واکنش (b) سریع‌تر از (a) و محصول واکنش (a) exo است.

ساختار محصول سری واکنش‌های زیر کدام است؟






مولکول زیر از چه بلوکه‌های ساختاری تشکیل شده است؟



-۲۲


محصول واکنش زیر کدام است؟



-۲۳ کدام جمله صحیح است؟

- ۱) افزایش طول زنجیر و افزایش درجه غیر اشباعی اسیدهای چرب طبیعی باعث افزایش نقطه ذوب آنها می‌گردد.
- ۲) در آب و هوای سردتر گیاه در صد بالاتری از اسیدهای چرب غیر اشباع را بیوستز می‌کند.
- ۳) در آب و هوای گرمتر گیاه در صد بالاتری از اسیدهای چرب اشباع را بیوستز می‌کند.
- ۴) هر سه مورد درست است.

-۲۴ مولکول زیر از چه بلوکه‌های ساختاری تشکیل شده است؟




$$C_6C_1 + C_1 + 5 \times C_2 \quad (1)$$

$$C_6C_3 + C_1 + 4 \times C_2 \quad (2)$$

$$C_6C_2 + 5 \times C_2 \quad (3)$$

$$9 \times C_2 \quad (4)$$

- ۲۵ - ترکیب زیر از کدام مجموعه از واحدهای زیر بیوسنتر می‌شود؟




۱) مسیر بیوسنتر، ربطی به این واحدهای سازنده ندارد.

۲) 8 malonyl-CoA + 5 methyl malonyl-CoA

۳) 5 malonyl-CoA + 7 methyl malonyl-CoA + 1 ethyl malonyl-CoA

۴) 4 malonyl-CoA + 8 methyl malonyl-CoA + 1 ethyl malonyl-CoA

- ۲۶ - ترکیب زیر جزء کدام دسته ترکیبات است و کدام مسیرهای بیوسنتری در بیوسنتر آن شرکت دارد؟




۱) آفلاتوكسین‌ها، استات با آنزیم‌های FAS، استات با آنزیم‌های PKS



۲) آفلاتوكسین‌ها، استات با آنزیم‌های FAS، مسیر شیکیمات

۳) آنتراکینون‌ها، استات با آنزیم‌های PKS، مسیر MVA


۴) کاتابینوئیدها، استات با آنزیم‌های FAS، استات با آنزیم‌های PKS

-۲۷- محصول نهایی واکنش های زیر کدام است؟





-۲۹ کدام جمله در مورد ترکیب زیر صحیح است؟





۱) یک سکو-ایریدوئید است که از دو واحد C<sub>5</sub> تشکیل شده است.

۲) یک ایریدوئید است که از دو واحد C<sub>5</sub> تشکیل شده است.

۳) یک مونوترپنوتئید است که از ژرانیول مشتق می شود.

۴) موارد ۲ و ۳



- ۳۰ - نام ترکیب (۱)، manoyl oxide است. ترکیب (۲) را چه می‌نامید؟

ent-13-epi-manoyl oxide (۱)

13-epi-manoyl oxide (۲)

ent-manoyl oxide (۳)

nor-manoyl oxide (۴)

- ۳۱ - اگر IPP نشاندار شده در موقعیت ۲ برای بیوسترز لیمونن بکار گرفته شود کدام موقعیت‌ها بر روی لیمونن نشان‌دار خواهد شد؟






(۱) ۲ و ۸

(۲) ۶ و ۴

(۳) ۲ و ۴

(۴) ۱ و ۹

- ۳۲ - ترکیبات زیر در گیاهان از کدامیک از مسیرهای بیوسترزی، منتج می‌شوند؟




(۱) ۱-پلی کتید، ۲-شیکیمیک اسید، ۳-متیل اریتریتول فسفات

(۲) ۱-پلی کتید، ۲-شیکیمیک اسید، ۳-مولونیک اسید

(۳) ۱-شیکیمیک اسید، ۲-پلی کتید، ۳-مولونیک اسید


(۴) ۱-شیکیمیک اسید، ۲-پلی کتید، ۳-ایزوپرپنوتید

- ۳۳ - در بیوسنتر ترکیب زیر، چنانچه از L-تیروزین نشاندار شده در موقعیت ۲ استفاده شود، کدام موقعیت (موقعیت‌ها) بر روی محصول نشاندار خواهد شد؟



- ۷ و ۵ (۱)  
۶a و ۵ (۲)  
۵ (۳)  
۶a (۴)

- ۳۴ - کدام واژه برای ترکیب زیر مناسب است؟






- pseudoalkaloid (۱)  
steroidal saponin (۲)  
C-nor-homosteroid (۳)  
هر سه مورد (۴)

- ۳۵ - واژه **meroterpenoid** در مورد کدام دسته ترکیبات زیر صادق است؟


- rotenoids (۱)  
furocoumarins (۲)  
ergot alkaloids (۳)  
هر سه مورد (۴)

- ۳۶ - در ساختار کدامیک از آلکالوئیدهای زیر یک بخش ایریدوئیدی بکار رفته است؟








- (۱) ۱ و ۲  
 (۲) ۲ و ۳  
 (۳) ۱ و ۳  
 (۴) هر سه

- ۳۷ - کدامیک از پیش ماده های ذکر شده، در بیوسنتز ترکیب زیر دخالت داشته اند؟




- (۱) استیک اسید، بنزوئیک اسید، DMAPP  
 (۲) آترانیلیک اسید، سینامیک اسید، موالونیک اسید  
 (۳) شیکیمیک اسید، استیک اسید، موالونیک اسید  
 (۴) شیکیمیک اسید، بنزوئیک اسید، موالونیک اسید

- ۳۸ - محصول واکنش زیر چیست؟



- ۳۹ - کدام جمله در مورد ترکیب زیر صحیح است؟




۱) یک دی ترپن کائورنی است.

۲) یک دی ترپن آبیتانی است.

۳) یک سسکویی ترپن کادینانی است

۴) یک سستر ترپن گلیکوزیدی است.

- ۴۰ - ساختار فضایی مولکول زیر به چه صورت است؟



chair-chair-boat-boat (۱)

boat-chair-chair-boat (۲)

chair-chair-chair-boat (۳)

chair-boat-chair-boat (۴)

- ۴۱ - با کدامیک از تکنیک‌های NMR دو بعدی می‌توان تشخیص داد که دو پروتون نسبت به هم vicinal هستند یا

?germinal



HMBC (۱)

HMQC (۲)

TOCSY (۳)

H-H COSY (۴)

- ۴۲ - پیک زیر مربوط به کدامیک از پروتون‌های مولکول منتول است؟





1 (۱)

2 (۲)


5 (۳)

7 (۴)

- ۴۳- در ساختار زیر، ثوابت کوپلاز بین پروتون‌های حلقه A نشان داده شده است. استروشیمی نسبی استخلاف‌ها چگونه خواهد بود؟



- ۴۴- در مولکول زیر گروه‌های کربوکسیلیک اسید چه نسبتی با هم دارند؟



(۱) اکی والان شیمیایی‌اند



(۲) دیاستروتوپیک‌اند

(۳) انانتیوتوبیک‌اند

(۴) هوموتوبیک‌اند

-۴۵

طیف زیر چه نوع طیفی است و مربوط به کدام مولکول است؟



-۴۶

کدام یک از تکنیک‌های زیر را در مطالعه پروتئین‌ها مفیدتر ارزیابی می‌کنید؟


TOCSY (۱)

HMBC (۲)

NOESY (۳)

HMQC (۴)

-۴۷ - قطعه زیر بخشی از یک مولکول است. در طیف HMBC این قطعه، یک پیک عرضی قوی بین H<sub>A</sub> و C<sub>3</sub> دیده می‌شود. پیک عرضی بین H<sub>C</sub> و C<sub>1</sub> چگونه خواهد بود؟





(۱) اصلاً پیکی دیده نمی‌شود.

(۲) به زوایای دی هدرال بستگی دارد.

(۳) یک پیک ضعیف

(۴) یک پیک متقارن قوی



- 149 ppm (۱)  
-231 ppm (۲)  
-224 ppm (۳)  
-267 ppm (۴)

-۴۹ کدامیک از هسته های زیر در NMR فعال نیست؟

- <sup>14</sup>N (۱)  
<sup>15</sup>N (۲)  
<sup>16</sup>O (۳)  
<sup>31</sup>P (۴)

-۵۰ در طیف <sup>13</sup>C NMR <sup>1</sup>H- broad band decoupled <sup>13</sup>C NMR ۱ پیک حلال  $\text{CDCl}_3$  به چه صورتی ظاهر می شود؟

- (۱) یک یکتایی در 77 ppm  
(۲) سه تایی با نسبت ۱:۱:۱ در 77 ppm  
(۳) سه تایی با نسبت ۱:۲:۱ در 77 ppm  
(۴) چون درصد اتمهای <sup>13</sup>C خیلی کم است، اصولاً نباید پیکی برای حلال دیده شود.

-۵۱ در صورتی که مقدار کارواکرول در نمونه های طبیعی مرزه در سطر اول جدول و اندازه گیری با همان روش و برای نمونه استاندارد در سطر دوم نشان داده شده باشد مقدار خطای نمونه برداری چقدر است؟

Sample	18	20	22
Standard	9	11	10

- ۳ (۱)  
۲ (۲)  
۱/۵ (۳)  
۱ (۴)

-۵۲

**SPE Breakthrough** به چه معنایی است؟

- ۱) تعیین مقدار نمونه برای داشتن بیشترین قدرت تفکیک
- ۲) تعیین مقدار جاذب برای داشتن بیشترین قدرت تفکیک
- ۳) حداقل مقدار مجاز نمونه تزریقی به جاذب
- ۴) حداکثر مقدار مجاز نمونه تزریقی به جاذب

-۵۳

**GC Discrimination** در سرنگ به چه علت رخ می دهد؟

- ۱) تفاوت نوع نمونه های یک مخلوط تزریق شده به دستگاه
- ۲) تفاوت دمای نیدل و محل تزریق گرم دستگاه
- ۳) سرد بودن محل تزریق در روش Cool Injection
- ۴) سرعت تزریق نمونه به دستگاه

-۵۴

**HILIC** برای چه نمونه هایی و با کدام شرایط HPLC استفاده می شود؟

- ۱) نمونه های کمی غیرقطبی و فاز ساکن قطبی و فاز متحرک غیرقطبی
- ۲) نمونه های نیمه قطبی و فاز ساکن قطبی و فاز متحرک غیرقطبی
- ۳) نمونه های قطبی و فاز ساکن قطبی و فاز متحرک غیرقطبی
- ۴) نمونه های قطبی و فاز ساکن غیرقطبی و فاز متحرک قطبی

-۵۵

تفاوت سیستم های **Low Pressure** و **High Pressure** دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا در چیست؟

- ۱) داشتن دو پمپ نسبت به یک پمپ
- ۲) داشتن حجم کمتر در سیستم آشکارساز
- ۳) حجم مرده کم در سیستم ستون های جدید
- ۴) استفاده از پمپ های نو با امکان ایجاد فشار بالا

**Freeze Dryer** بر چه مبنایی است؟

- ۱) اعمال سرمای خشک برای پایدار ساختن سه بعدی مواد طبیعی
- ۲) خشک کردن نمونه با استفاده از نیتروژن مایع
- ۳) تبخیر با استفاده از خصلت آزوتروبی
- ۴) تسعید در دمای پایین

-۵۶

## چرا در دستگاه کروماتوگرافی گازی- اسپکترومتری جرمی از حد واسط ESI استفاده نمی شود؟

- ۱) امکان اعمال ولتاژ بر روی نمونه وجود ندارد.
- ۲) امکان تخریب شدن در این شرایط رخ می دهد
- ۳) با توزیع گسترده انرژی سنتیک یون ها رویرو می شویم
- ۴) نمونه های گازی پایداری لازم برای دیدن جرم مولکولی را ندارند

-۵۷

**-۵۸- در دستگاه Preparative HPLC**

- ۱) به دنبال جداسازی مناسب با شکل های پیک های گوسین هستیم
- ۲) جداسازی در نصف ارتفاع پیک ها کافی است
- ۳) جداسازی بستگی به ترمودینامیک حاکم بر فرایند دارد.
- ۴) تنها به دنبال جداسازی با شکل های غیر متقاضی هستیم

**-۵۹- سیستم MS/MS چه تکنیکی است؟**

- ۱) برای فراشکستن یون ها
- ۲) استفاده از یک مغنت قبل از کودرپل
- ۳) برای تشخیص دقیق تر متابولیت ها از پروتئین ها
- ۴) استفاده از دو سیستم اسپکترومتری جرمی برای یکسان کردن انرژی سنتیک یون ها

**-۶۰- استخراج با سیستم استییر بار نسبت به SPME:**

- ۱) بهتر است زیرا پایداری دمایی بالاتری را سبب می شود.
- ۲) دارای رنج کمتری از ترکیبات به عنوان فاز ساکن است.
- ۳) بهتر است چون ظرفیت استخراج بیشتری دارد.
- ۴) مشکل تر است زیرا پایداری کمتری دارد.