

۱۷۱

A

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:

دفترچه شماره (۱)

صبح جمعه
۱۳۹۴/۱۲/۱۴



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)»

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تموگز) – سال ۱۳۹۵

دادپژوهی (کد ۲۷۰۱)

مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۰۰

عنوان دروس اختصاصی، تعداد و شماره سؤال‌ها

ردیف	دروس اختصاصی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	بیوشیمی ۱و۲، فیزیولوژی ۱و۲، آسیب‌شناسی عمومی	۱۰۰	۱	۱۰۰

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تعاملی اشخاص جلیلی و حلوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز نمایند و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

پیشیمی او:

- ۱ بار خالص کدام اسید آمینه در pH فیزیولوژیک صفر می‌باشد؟
 ۱) آرژنین ۲) ایزو لوسین ۳) لیزین ۴) گلوتامات
- ۲ در واکنش اکسیداسیون قندها اگر تنها عامل الکلی نوع اول اکسید شود ترکیب حاصل را چه می‌نامند؟
 ۱) اسید آلدونیک ۲) اسید آردنیک ۳) اسید ارونیک ۴) اسید ساکاریک
- ۳ کدام یک به اسم قند معکوس است?
 ۱) ساکارز ۲) لاکتوز ۳) گلوکز ۴) مانوز
- ۴ کمبود کبات در بدن، کدام یک از مسیرهای متابولیسمی زیر را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟
 ۱) اکسیداسیون اسیدهای چرب فرد کربن ۲) تجزیه پورینها
 ۳) سیکل کربس ۴) سنتز پالمتیات
- ۵ در شرایط نیاز به انرژی، گلیکوژن کدام یک از بافت‌های زیر می‌تواند تأمین کننده نیاز سایر سلول‌های بدن باشد؟
 ۱) کبد ۲) عضله ۳) کلیه ۴) موارد ۱ و ۳
- ۶ همه موارد زیر درباره متابولیسم اسیدهای آمینه صحیح هستند، به غیر از:
 ۱) آلانین، فرم اصلی انتقال آمونیاک از ماهیچه‌ها به کبد است.
 ۲) پیرووات، α -کتو اسید معادل آلانین می‌باشد.
- ۷ غلظت بالای آمونیاک باعث کاهش α -ستو گلوتارتات در سیکل کربس مغز شده که منجر به کاهش توانایی آن در تولید ATP می‌گردد.
 ۱) کربوامیل فسفات درون سیتوسل با L-ornithine ترکیب شده و وارد چرخه اوره می‌شود.
 همه گزینه‌های زیر درباره کمپلکس ATP synthase صحیح هستند، به غیر از:
 ۱) انتقال پروتون (H^+) از خلال این کمپلکس در جهت شیب غلظت است.
 ۲) در غشاء داخلی میتوکندری قرار دارد.
 ۳) زیر واحدهای α و β در سمت بین غشایی قرار دارد.
 ۴) می‌تواند فعالیت ATPase نیز داشته باشد.
- ۸ کدام گزینه در مورد گلیکوپروتئین‌ها صحیح است?
 ۱) بخش کربوهیدراتی آن‌ها فقط از طریق پیوند N- گلیکوزیدی اتصال دارد.
 ۲) بخش کربوهیدراتی آن‌ها به طور کوالان به پروتئین متصل است.
 ۳) بخش کربوهیدراتی آن‌ها در غشای پلاسمایی در سمت سیتوزولیک می‌باشد.
 ۴) در سلول‌ها و نه در پلاسمما یافت می‌شوند.
- ۹ کدام یک قادر کربن نامتنقارن است?
 ۱) اسید لاکتیک ۲) سرین ۳) ریبوژ ۴) دی‌هیدروکسی استن
- ۱۰ کدام یک از ترکیبات زیر در اثر اکسیداسیون کامل، مقدار ATP بیشتری تولید می‌کند؟
 ۱) پالمیتیک اسید ۲) فروکتوز ۳) گلوکز ۴) میریستیک اسید
- ۱۱ کدام مولکول نشانه سیری سلول و فعال کننده بیوسنتز اسید چرب می‌باشد?
 ۱) استیل CoA ۲) اگزالوستیک اسید ۳) سیترات ۴) گلوکز

- ۱۲ تمامی موارد زیر درباره تشکیل پیوند دی‌سولفیدی صحیح می‌باشد، بهغیراز:
- (۱) تشکیل پیوند دی‌سولفیدی خودبه‌خودی است و نیاز به آنزیم ندارد.
 - (۲) تشکیل پیوند دی‌سولفیدی یک واکنش احیا شدن می‌باشد.
 - (۳) در پروتئین‌های ترشحی و خارج سلولی رخ می‌دهد.
 - (۴) بدلیل محیط احیایی سیتوزولی در پروتئین‌های سیتوزولی امکان‌بذیر نیست.
- ۱۳ کدام ترکیب تأمین‌کننده اتم‌های نیتروژن برای سنتز پورین‌ها و پیرامیدین‌ها هستند؟
- (۱) آسپارتیک اسید
 - (۲) ترا‌هیدروفولات
 - (۳) کرباموئیل فسفات
 - (۴) گلوتامین
- ۱۴ همه اسید‌آمینه‌های زیر توسط آنزیم‌های ترانس‌آمیناز، دآمینه می‌شوند، بهغیراز:
- (۱) آسپارتات
 - (۲) ترئونین
 - (۳) لوسمین
 - (۴) گلیسین
- ۱۵ کدام‌یک از آنزیم‌های گلیکولیزی، یک واکنش یک‌طرفه را کاتالیز می‌کند؟
- (۱) انولاز
 - (۲) پیرووات کیناز
 - (۳) فسفوگلوکو ایزومراز
 - (۴) گلیسر آلدیدفسفات دهیدروژناز
- ۱۶ کدام گزینه توالی انتقال الکترون در زنجیره انتقال الکترون میتوکندریایی را به درستی نشان می‌دهد؟ (ممکن است بعضی حلقه‌ها ذکر شود)
- FADH₂ → Q → complexIII → ATPsynthase → O₂
 - FADH₂ → FMN → cyt b → cyt c → cyt a → O₂
 - NADH → Q → cyt c → cyt b → complexIII → O₂
 - NADH → FMN → cyt b → cyt c → cyt a → O₂
- ۱۷ اثرهای مونوکسیدکربن بر زنجیره تنفسی میتوکندریایی، چگونه اعمال می‌شود؟
- (۱) با مهار سیتوکروم اکسیداز
 - (۲) با مهار انتقال الکترون از سیتوکروم b به سیتوکروم C₁
 - (۳) با مهار انتقال از مراکز آهن - گوگرد به یووی کیتون
 - (۴) با برهم زدن شبیب پروتون در دو طرف غشاء داخلی میتوکندری نقص ژنتیکی در کدام‌یک از آنزیم‌های زیر باعث بروز بیماری آکاپتونوری می‌شود؟
- (۱) تیروزین آمینو ترانسفراز
 - (۲) فنیل آلانین هیدروکسیلاز
 - (۳) هموژنیترات اکسیداز
- ۱۸ در همه موارد زیر، اکسیداسیون اسیدهای چرب، اتفاق می‌افتد، بهغیراز:
- (۱) سلول‌های روده‌ای
 - (۲) سلول‌های عضلاتی
 - (۳) گلبول‌های قرمز
 - (۴) سلول‌های مغزی
- ۱۹ با اکسیداسیون کربن شماره ۱ گلوکز، کدام ترکیب حاصل می‌شود؟
- (۱) گلونیک اسید
 - (۲) گلورونیک اسید
 - (۳) گلوکورونیک اسید
 - (۴) گلوکونیک اسید
- ۲۰ در مهار آنزیم کیموترپسین با دی‌ایزو پروپیل فلورو فسفات (DIFP)، این مهارکننده جز کدام دسته است؟
- (۱) مهارکننده‌های برگشت‌ناپذیر
 - (۲) مهارکننده‌های برگشت‌پذیر
 - (۳) مهارکننده‌های متکی به مکانیسم

- ۲۲- انtron چیست؟
- (۱) یک نوع tRNA است.
 - (۲) خودش یک نوع پروتئین است.
 - (۳) نواحی از DNA است که برای پروتئین‌ها کد می‌شوند.
 - (۴) نواحی از DNA است که برای پروتئین‌ها کد نمی‌شوند.
- ۲۳- تبدیل نور اپی نفرین به اپی نفرین همراه با کدام یک از واکنش‌های زیر است؟
- (۱) ترانس آمیناسیون
 - (۲) کربوکسیلاسیون
 - (۳) متیلاسیون
 - (۴) هیدروکسیلاسیون
- ۲۴- بیماری فاویسم مربوط به نقص در سطح کدام آنزیم است؟
- (۱) Phosphofructo kinase1
 - (۲) Glucose6 – phosphate dehydrogenase
 - (۳) Phosphofructo kinase2
 - (۴) Glucose6 – phosphatase
- ۲۵- تنظیم طولانی مدت فعالیت آنزیمی، برخلاف تغییرات سریع و لحظه‌ای، توسط کدام مکانیسم صورت می‌گیرد؟
- (۱) اصلاح شیمیایی (Chemical modification) آنزیم
 - (۲) تنظیم آلوستراتیک آنزیم
 - (۳) سنتز یا تجزیه آنزیم
 - (۴) مهار آنزیم
- ۲۶- به ترتیب، بیماری‌های آلکاپتونوریا، آپینیسم و MSUD (ادرار شربت افرا) ناشی از نقص در متابولیسم کدام اسیدهای آمینه است؟
- (۱) آلانین، تیروزین، اسیدهای آمینه شاخه‌دار
 - (۲) فنیل آلانین، تیروزین، اسیدهای آمینه شاخه‌دار
 - (۳) فنیل آلانین، آلانین، تیروزین، گلوتامات
 - (۴) فنیل آلانین، تیروزین، گلوتامات
- ۲۷- همه عبارات زیر در مورد اسیدآمینه صحیح هستند، به غیر از:
- (۱) یک اسیدآمینه در pH خنثی به صورت یک مولکول دوقطبی عمل می‌کند.
 - (۲) تریپتوفان، فنیل آلانین و تیروزین جز اسیدآمینه‌های حلقوی هستند.
 - (۳) گلایسین کوچک‌ترین اسیدآمینه است که گروه جانبی آن فقط از یک H تشکیل شده است.
 - (۴) میتوئین، سستئین و هیستیدین جز اسیدآمینه‌های گوگرددار هستند.
- ۲۸- سیکل اوره پستانداران در کدام ناحیه از سلول‌های کبدی صورت می‌گیرد؟
- (۱) سیتوپلاسم
 - (۲) میتوکندری
 - (۳) هسته
 - (۴) موارد ۱ و ۲
- ۲۹- کدام یک از قندهای زیر غیر احیاکننده است؟
- (۱) ترهالوز
 - (۲) لاکتوز
 - (۳) مالتوز
 - (۴) گلوکز
- ۳۰- نام دیگر پروتئین DnaB چیست؟
- (۱) پریماز
 - (۲) جیراز
 - (۳) DNA لیگاز
 - (۴) DNA هلیکاز
- ۳۱- در مسیر بیوسنتز اسیدهای چرب، عامل تک کربنه موردنیاز برای تبدیل استیل کوا به مالونیل کوا از کدام مورد تأمین می‌شود؟
- (۱) بیوتین
 - (۲) تراهیدروفولات
 - (۳) کوبالامین
 - (۴) گلایسین

- ۳۲ - همه گزینه‌ها در مورد آنزیم‌ها صحیح هستند، به غیر از:

- (۱) ابرزی فعال‌سازی واکنش را کاهش می‌دهند. (۲) تغییری در ثابت تعادل واکنش ایجاد نمی‌کنند.
 (۳) سرعت واکنش را در یک جهت افزایش می‌دهند. (۴) ΔG واکنش را تغییر نمی‌دهند.

- ۳۳ - اسیدوز متابولیکی چه تأثیری روی خواص هموگلوبین بر جا می‌گذارد؟

- (۱) تمایل هموگلوبین برای جذب اکسیژن افزایش می‌باید.
 (۲) تمایل هموگلوبین برای جذب اکسیژن کاهش می‌باید.
 (۳) مقدار جذب اکسیژن توسط سلول از هموگلوبین کاهش می‌باید.
 (۴) تأثیری ندارد.

فیزیولوژی اول:

- ۳۴ - بیشترین مقاومت در برابر جریان هوا در کدام قسمت ریه ایجاد می‌شود؟

- (۱) برونش (۲) برونشیول‌ها (۳) مجاری آلوئولی (۴) نای
 کار سلول‌های مزانشیال گلومرولی در کلیه‌ها چیست؟

- ۳۵ - (۱) باز جذب مواد (۲) ترشح رنین (۳) تغییر GFR (۴) ترشح آنتی‌بادی

- ۳۶ - کدام یک در میان تمامی گونه‌های حیوانی تنها جزء ثابت پلاسمای منی است؟

- (۱) اسید لاکتیک (۲) اسید اسکوربیک (۳) فروکتوز (۴) گلوكز

- ۳۷ - کدام یک از هورمون‌های زیر موجب تحریک ترشح انسولین می‌شود؟

- (۱) پلی پپتید مهاری معده (GIP) (۲) گاسترین (۳) موتیلین (۴) کوله سیستوکینین

- ۳۸ - منشأ اصلی گلوكز خون نشخوار کننده چیست؟

- (۱) استات (۲) بوتیرات (۳) پروپیونات (۴) لاكتات

- ۳۹ - ترشح اسید معده توسط کدام یک تحریک می‌گردد؟

- (۱) استیل کولین، کوله سیستوکینین (۲) سکرتین، گاسترین (۳) سکرتین، هیستامین (۴) استیل کولین، گاسترین

- ۴۰ - همه موارد زیر تخلیه معده را کاهش می‌دهند، به غیر از:

- (۱) حضور نشاسته در دوازده
 (۲) حضور مایع هیپرتونیک در دوازده
 (۳) حضور مایع با pH کمتر از ۳/۵ در دوازده (۴) حضور اسید چرب یا مونوگلیسیرید در دوازده

- ۴۱ - مهم‌ترین عامل تحریک آسینی‌های پانکراس کدام است؟

- (۱) VIP (۲) استیل کولین (۳) سکرتین (۴) کوله سیستوکینین

- ۴۲ - مهار گیرنده‌های کدام نوروترانسمیتر باعث مهار مرکز استفراغ می‌شود؟

- (۱) استیل کولین (۲) دوپامین (۳) سروتونین (۴) نوراپی‌نفرین

- ۴۳ - در کدام یک از مراحل تغذیه‌ای غلظت هورمون کوله سیستوکینین (CCK) در پلاسمای افزایش می‌باید؟

- (۱) مرحله سفالیک (۲) مرحله دهانی (۳) مرحله روده‌ای (۴) مرحله گاستریک

- ۴۴- در صورت قطع اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک در قلبی که به طور طبیعی کار می‌کند، چه پدیده‌ای رخ خواهد داد؟
- (۱) کاهش ضربان قلب
 - (۲) افزایش ضربان قلب
 - (۳) عدم تغییر در تعداد و قدرت ضربان قلب
 - (۴) افزایش قابل توجه قدرت انقباضی قلب
- ۴۵- فشار خون سیستولی و دیاستولی در گردش خون ریوی چند میلی متر جیوه است؟
- (۱) ۱۵ و ۲۵
 - (۲) ۲۵ و ۸
 - (۳) ۱۰۰ و ۱۵
 - (۴) ۱۲۰ و ۸۰
- ۴۶- اطلاعات حسی که باید با سرعت و کیفیت دقیق تری هدایت شوند از طریق کدام مسیر ارسال می‌گردند؟
- (۱) ستون خلفی - نوار میانی
 - (۲) نخاعی - تalamوسی قدامی
 - (۳) نخاعی - تalamوسی جانبی
 - (۴) نخاعی - مخچه‌ای قدامی
- ۴۷- چرا فشار اکسیژن در سرخرگ آنورت کمتر از حد انتظار است؟
- (۱) بهدلیل ورود خون تهویه نشده به سیاهرگ ریوی
 - (۲) بهدلیل ورود خون تهویه نشده به سرخرگ ریوی
 - (۳) وجود shunt در آنورت
 - (۴) وجود shunt در عروق کبدی
- ۴۸- در طول کدام مرحله از پتانسیل عمل طبیعی بطن، بیشتر احتمال دارد کانال‌های سریع سدیمی غیرفعال، کانال‌های کلسیمی آهسته باز و بیشتر کانال‌های پتانسیمی بسته باشند؟
- (۱) مرحله صفر (دیپولاژیزاسیون سریع)
 - (۲) مرحله یک (ریولاژیزاسیون جزئی)
 - (۳) مرحله سه (ریولاژیزاسیون کامل)
 - (۴) مرحله دو (کفه)
- ۴۹- همه موارد زیر موجب افزایش فشار نبض می‌شوند، به غیر از افزایش:
- (۱) حجم ضربه‌ای
 - (۲) ضربان قلب
 - (۳) مقاومت کل محیطی
 - (۴) کومپلیانس شریانی
- ۵۰- در مورد اثر Bohr (بور) کدام یک صحیح است؟
- (۱) کاهش میل ترکیبی هموگلوبین با اکسیژن در هنگام افزایش pH خون
 - (۲) کاهش میل ترکیبی هموگلوبین با اکسیژن در هنگام کاهش pH خون
 - (۳) افزایش میل ترکیبی هموگلوبین با اکسیژن در هنگام افزایش pH خون
 - (۴) افزایش میل ترکیبی هموگلوبین با اکسیژن در هنگام افزایش pH خون
- ۵۱- کدام یک از ضایعات مغزی و نخاعی موجب اختلال در عمل تنفس می‌گردد؟
- (۱) ضایعه تalamوس
 - (۲) قطع نخاع کمری
 - (۳) قطع نخاع گردی
 - (۴) ضایعه قشر مغز
- ۵۲- همه عبارت‌های زیر در مورد دوپامین صحیح می‌باشند، به غیر از:
- (۱) یکی از اعمال اصلی دوپامین در مغز تحریک ترشح پرولاکتین می‌باشد.
 - (۲) یکی از عوارض کمبود دوپامین در مغز بیماری پارکینسون می‌باشد.
 - (۳) محل تجمع جسم سلولی نورون‌های دوپامینرژیک در مغز جسم سیاه می‌باشد.
 - (۴) کاتابولیسم دوپامین توسط آنزیم‌های MAO و COMT انجام می‌شود.
- ۵۳- در فرآیند انتقال پیام سلولی، پروتئین Gq کدام آنزیم را فعال می‌کند؟
- (۱) آدنیل سیکلаз
 - (۲) فسفولیپاز C
 - (۳) فسفولیپاز D
 - (۴) گوانیل سیکلاز
- ۵۴- آنزیم‌های اصلی دخیل در فرآیند آپوپتوز کدام‌اند؟
- (۱) اندونوکلتازها
 - (۲) اکزوноکلتازها
 - (۳) کاسپیزها
 - (۴) لیپوپروتئین لیپازها

- ۵۵- کلسیم در همه فرایندهای زیر ضروری است، بهغیراز:
- (۱) انعقاد خون
 - (۲) ایجاد پاسخ سلولی هورمون‌های پروتئینی
 - (۳) ایجاد پاسخ سلولی هورمون‌های استروئیدی
 - (۴) شروع (trigger) انقباض عضله قلبی
- ۵۶- در طی یک پتانسیل پس سیناپسی تحریکی (EPSP) در غشاء نورون، کدام مورد مهم‌ترین جریان یونی است؟
- (۱) یون‌های پتانسیم بهوسیله پمپ سدیم - پتانسیم به داخل پمپ می‌شود.
 - (۲) یون‌های پتانسیم به خارج از نورون انتشار می‌یابد.
 - (۳) یون‌های سدیم به خارج از نورون انتشار می‌یابد.
 - (۴) یون‌های سدیم به داخل نورون انتشار می‌یابد.
- ۵۷- تأثیر غالب سیستم عصبی سمپاتیک بر روی عضله صاف عروق خونی عضلات اسکلتی از طریق کدام گیرنده میانجیگری می‌شود؟
- (۱) α_1
 - (۲) β_2
 - (۳) α_2
 - (۴) β_1
- ۵۸- عمل استیبل کولین روی غشای پس سیناپسی در محل اتصال عصب - عضله، باز کردن کانال‌های دریچه‌دار می‌باشد.
- (۱) سدیمی وابسته به لیگاند
 - (۲) سدیمی وابسته به ولتاژ
 - (۳) پتانسیمی وابسته به ولتاژ
 - (۴) کلری وابسته به لیگاند
- ۵۹- کدام یک از گیرندهای مربوط به سیستم نورآدرنرژیک به صورت پیش سیناپسی است؟
- (۱) آلفا دو
 - (۲) آلفا یک
 - (۳) بتا دو
 - (۴) بتا یک
- ۶۰- همه هورمون‌های زیر به پروتئین‌های پلاسمایاند می‌شوند، بهغیراز:
- (۱) تیروکسین
 - (۲) پروژسترون
 - (۳) کورتیزول
 - (۴) وازوپرسین
- ۶۱- در مورد اثرات انسولین کدام عبارت صحیح است؟
- (۱) لیپولیز را تشدید می‌کند.
 - (۲) لیپوزن را مهار می‌کند.
 - (۳) گلیکوژنولیز را تشدید می‌کند.
 - (۴) گلیکوزن را تشدید می‌کند.
- ۶۲- تجویز آندروژن خارجی به بدن سبب کدام می‌شود؟
- (۱) افزایش تولید اسپرم
 - (۲) افزایش LH خون
 - (۳) کاهش آندروژن خون
 - (۴) کاهش آندروژن در لوله‌های اسپرم‌ساز
- ۶۳- عامل اصلی که در زمان گرسنگی مستقیماً سبب تحریک ترشح گلوکاغن می‌شود کدام است؟
- (۱) تحریک اعصاب کلی نرژیک
 - (۲) سطح پایین انسولین
 - (۳) سطح پایین گلوکز خون
 - (۴) سطح پایین اسیدهای چرب آزاد
- ۶۴- در مدل استروئیدوژن دو سلول تخدمان، سلول‌های تکا ابتدا کدام را تولید می‌کنند؟
- (۱) آندروستنديون
 - (۲) استرادیول
 - (۳) پروژسترون
 - (۴) تستوسترون
- ۶۵- دلیل افزایش تعداد تنفس در بیماری انسدادی مزمن ریوی چیست؟
- (۱) افزایش فضای مرده آناتومیکی
 - (۲) کاهش فضای مرده آناتومیکی
 - (۳) کاهش مقاومت مجاري ریوی
 - (۴) افزایش مقاومت مجاري ریوی
- ۶۶- تنظیم فیلتراسیون گلومرولی توسط همه موارد زیر انجام می‌شود، بهغیراز:
- (۱) نوراپی نفرین
 - (۲) فیدبک توبولی گلومرولی
 - (۳) استیبل کولین
 - (۴) ANP

آسیب‌شناسی عمومی:

- ۶۷- نفوذ جسم فلزی تیز و بلند در دیواره نگاری نشخوار کنندگان، در مراحل اولیه چه نوع آماسی را ایجاد می‌نماید؟
- Fibrinous Reticulitis (۲) Fibrinous Pericarditis (۱)
 Fibrinous Typhlitis (۴) Fibrinous Rumenitis (۳)
- ۶۸- در کدام یک، ممکن است نکروز آبکی ایجاد شود؟
- (۱) آماس چركی (۲) آماس فیبرینوئید (۳) آماس سروزی (۴) آماس فیبرینی
- ۶۹- کدام ضایعه باقی غیرقابل برگشت محسوب می‌شود و دیگر قابل درمان نیست؟
- (۱) ادم ربوی (۲) خونریزی کانونی ربوی (۳) فیبروز ربوی (۴) پنومونی فیبرینی چركی
- ۷۰- در بیماری‌های اکتینومیکوز، اکتینوباسیلوز، کدام نوع آماس ایجاد می‌شود؟
- (۱) پیوگرانولوماتوز (۲) فیبرینی (۳) فیبرینوئید (۴) سروزی چركی
- ۷۱- همه اصطلاحات ذیل در خصوص سازش بدیری سلولی صحیح است، به غیر از:
- (۱) هیپرپلازی سلول‌های گلیال مغز (۲) هیپرتروفی سلول‌های پورکر مخچه (۳) هیپرپلازی سلول‌های عضلانی صاف روده (۴) هیپرپلازی سلول‌های عضلانی مخطط قلب
- ۷۲- در کالبدگشایی یک پرنده بیمار، مواد آچی‌شکل و سفیدرنگ روی اپیکارد قلب، سطوح مزانتر، کبد و داخل کلیه‌ها مشاهده شد، محتمل ترین عامل این یافته‌ها کدام است؟
- (۱) آهکی‌شدن (۲) لیپیدوزیس (۳) گانگرون سطحی (۴) نفرس
- ۷۳- سلول‌های نارسایی قلبی (Heart failure cells)، به علت تجمع کدام ماده در سیتوپلاسم و در کدام سلول ایجاد می‌شوند؟
- (۱) لیپوفوشین - سلول‌های عضلانی قلب (۲) هموسیدرین - سلول‌های عضلانی قلب (۳) هموسیدرین - ماکروفازهای الونولی ریه (۴) لیپوفوشین - ماکروفازهای الونولی ریه
- ۷۴- به متراکم شدن کروماتین هسته در سلول نکروزه چه می‌گویند؟
- Karyolysis (۴) Karyorrhexis (۳) Pyknosis (۲) Chromatolysis (۱)
- ۷۵- کدام مورد در ایجاد تپ دخالت دارد؟
- Bradykinin (۴) IL - ۶ (۳) LTB (۲) IL - ۸ (۱)
- ۷۶- کدام یک از موارد زیر در آسیب ایسکمیک سلول، بیانگر تغییر غیرقابل برگشت می‌باشد؟
- (۱) افزایش گلیکولیز (۲) تغییرات اسکلت سلولی (۳) تورم شبکه اندوپلاسمیک (۴) کاهش سنتز پروتئین
- ۷۷- مهم‌ترین عامل فراخوانی نوتروفیل‌ها به محل وقوع آماس حاد بافتی، کدام است؟
- LTB (۴) PDGF (۳) PGI۲ (۲) TNF (۱)
- ۷۸- کدام مورد جزو کاسپازهای آغازگر (Initiator caspases) می‌باشد؟
- Caspase 9 (۴) Caspase 6 (۳) Caspase 4 (۲) Caspase 3 (۱)
- ۷۹- کمبود ویتامین A باعث کدام یک از تغییرات پاتولوژیک در سلول‌های پوششی دستگاه گوارش پرندگان می‌شود؟
- (۱) آتروفی (۲) متاپلازی (۳) هیپرپلازی (۴) هیپرتروفی
- ۸۰- اجسام راسل Russell bodies نشان‌دهنده تجمع کدام یک در سلول است؟
- (۱) چربی (۲) کریستالوئید (۳) گلیکوژن (۴) هیالن

- ۸۱ کدام یک اثر پیش انعقادی **Procoagulant** دارد؟
- Tissue plasminogen activator (۲) plasminogen activator inhibitor (۱)
 (۴) هپاران سولفات (۳) نیتریک اکساید (NO)
- ۸۲ سوختگی‌ها و آسیت، معمولاً باعث ایجاد کدام نوع شوک می‌گردد؟
- (۴) هیپوولمیک (۲) کاردیوژنیک (۳) نوروزنیک
- ۸۳ ساختمان بافت جوانه گوشته در اولین مراحل تشکیل، چگونه است؟
- (۱) بافتی پرعروق، کم رشته و پرسلول (۲) بافتی پرعروق، پررشته و پرسلول
 (۳) بافتی کم عروق، پررشته و کم سلول (۴) بافتی کم عروق، کم رشته و کم سلول
- ۸۴ نارسایی قلب راست معمولاً با کدام مکانیسم باعث ایجاد ادم می‌شود؟
- (۱) انسداد عروق لنفاوی و احتباس سدیم (۲) انسداد عروق لغایی جدار عروق
 (۳) افزایش فشار هیدروستاتیک (۴) کاهش فشار اسمتیک - کلوتئیدی
- ۸۵ کدام سلول در روند ایجاد ترمیم و التیام زخم نقش کمتری دارد؟
- (۱) آنزیوبلاست (۲) فیبروبلاست (۳) ماکروفاز (۴) نوتروفیل
- ۸۶ بافتی که آسیب دیده و پس از آن روند فیبروز را طی می‌کند، معمولاً ممکن است به چه سرنوشتی دچار گردد؟
- (۱) آتروفی (۲) دیسپلazی (۳) هیپرتروفی (۴) نتوپلازی
- ۸۷ اشعه ماوراء بنفش، با کدام مکانیسم در ایجاد تومور نقش دارد؟
- (۱) ایجاد دیمرهای پیریمیدین (۲) جابه‌جایی کروموزومی (۳) شکست کروموزومی
- ۸۸ تومور بدخیم لایه عضلانی رحم سگ را چه می‌نامند؟
- (۱) فیبروسارکوم (۲) رابدومیوسارکوم (۳) لیومیوسارکوم (۴) کندروسارکوم
- ۸۹ در برداشت رادیکال آزاد سمتی اکسیرن، تمام موارد زیر نقش دارند، به غیراز:
- (۱) آنزیم P450 اکسیداز (۲) کاتالاز (۳) سوبر اکسید دیسموتاز (SOD)
 (۴) گلوتاتیون پراکسیداز
- ۹۰ نوع پروتئین آمیلوئیدی که به دنبال بیماری سل گاوی ممکن است در عروق کبد و کلیه و سایر بافت‌های بدن رسبوب نماید از چه نوعی است؟
- (۱) AL (۲) AA (۳) TTR
 (۴) بتا دو میکرو گلوبولین β_2m
- ۹۱ تمام موارد زیر از مختصات میکروسکوپیک یک تومور بدخیم محسوب می‌گردند، به غیراز:
- (۱) آنابلازی زیاد (۲) پلثومورفیسم زیاد (۳) تفکیک و تمایز زیاد (۴) دگرگونی زیاد
- ۹۲ کدام واسطه شیمیایی باعث تجمع اتوژنیوفیل‌ها در موضع آماسی می‌گردد؟
- (۱) EGF (۲) ECF (۳) HGF (۴) FGF
- ۹۳ نحوه یا الگوی رشد سلول‌های سرطانی در زیر میکروسکوپ در کدام یک از تومورها به صورت صفحه سلولی می‌باشد؟
- (۱) پاپیلوم (۲) لنفوم (۴) تومور سلول‌های سرتولی بیضه (۳) فیبروسارکوم

- ۹۴- بنیان‌گذار پاتولوژی نوین و توجه به واحد سلولی به عنوان علت به وجود آمدن تغییرات کارکردی و ساختمانی در طی بیماری، کیست؟
- Rudolf Virchow (۲) Jozsef Marek (۱)
Friedrich Zenker (۴) Augustus Waller (۳)
- ۹۵- خامات مقاطع بافتی که به طور معمول پس از رنگ‌آمیزی به روش H&E و با میکروسکوپ نوری در آزمایشگاه پاتولوژی مورد مطالعه قرار می‌گیرد، چند میکرون (میکرومتر) است؟
- ۱۵ (۴) ۱۰ (۳) ۵ (۲) ۱ (۱)
- ۹۶- به دنبال افزایش میزان گلوكورونیک‌ایدهای در بدن کدام حیوان، ممکن است عارضه Calcinosis cutis به وجود آید؟
- (۱) اسب (۲) سگ (۳) طیور (۴) گوسفند
- ۹۷- عفونت با کدام یک از عوامل ویروسی باعث ایجاد عارضه هیپوپلازی مینا در دندان‌های دائمی خواهد شد؟
- (۱) ویروس بیماری طاعون گاوی (۲) ویروس بیماری مرزی در گوسفند (۳) ویروس بیماری پان لکوپنی در گربه
- ۹۸- عاقب ناشی از ادم، در تمامی موارد ذکر شده در ذیل، مخاطره‌آمیز بوده و می‌تواند باعث مرگ گردد، به‌غیراز:
- | | |
|----------------------|------------------------|
| Hydropericardium (۲) | Cerebral edema (۱) |
| Pulmonary edema (۴) | Subcutaneous edema (۳) |
- ۹۹- تمامی موارد زیر باعث ایجاد Cast (سیلندر) می‌گردد، به‌غیراز:
- | | | | |
|-----------------|------------|----------|-------------|
| Hemosiderin (۴) | Fibrin (۳) | Bile (۲) | Albumin (۱) |
|-----------------|------------|----------|-------------|
- ۱۰۰- حالت ایجاد شده در سلول‌های عصبی را چه می‌نامند؟
- | | |
|-----------------------|---------------------|
| Hydrostatic Edema (۲) | Cytotoxic Edema (۱) |
| Vasogenic Edema (۴) | Osmotic Edema (۳) |



