



229F

229

F

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:

صبح جمعه
۱۳۹۵/۱۲/۶
دفترچه شماره (۱)



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)»

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمتر کز) داخل - سال ۱۳۹۶

رشته امتحانی بیهودی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی (کد ۲۷۲۶)

مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۹۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (فارماکولوژی - فیزیولوژی - اصول جراحی و بیهودی دامپزشکی - جراحی عمومی دام‌های بزرگ و دام‌های کوچک)	۹۰	۹۰	۱

این آزمون نمره منفی دارد.
استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

اسفندماه - سال ۱۳۹۵

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اندکاری حلبی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان عجائز می‌باشد و با متخلفین برای عقوبات رفتار می‌شود.

فارماکولوژی:

- ۱ داروهای شلکنده عضلاتی (Neuromuscular blocking agents) از طریق بلوک کدام گیرنده‌ها اثر خود را اعمال می‌کنند؟
- (۱) گیرنده‌های نیکوتینی
 - (۳) گیرنده‌های موسکارینی
 - (۴) گیرنده‌های آلفا آدرنرژیک
- ۲ همه موارد زیر، از عوارض داروهای مخدر (Opioids) در سگ محسوب می‌شوند، به جزء:
- (۱) اختلال در انعقاد خون
 - (۲) تهوع و استفراغ
 - (۴) برادی کاردی
 - (۳) تضعیف تنفسی
- ۳ مهم‌ترین دلیلی که در بیمار مبتلا به شوک نمی‌توان از داروی آسپرومازین استفاده نمود کدام است؟
- (۱) افزایش ضربان قلب
 - (۲) انساع عروق
 - (۴) کاهش ضربان قلب
 - (۳) کاهش قدرت انقباضی قلب
- ۴ به دنبال تجویز اپی‌نفرین همه موارد زیر رخ می‌دهند، به جزء:
- (۲) کاهش حرکات دستگاه گوارش
 - (۱) افزایش تعداد ضربان قلب
 - (۴) افزایش قدرت انقباضی قلب
 - (۳) انقباض برونش‌ها
- ۵ کدام یک در خصوص داروی نیتروس اکساید صادق است؟
- (۱) فرمول شیمیایی آن NO_2 است.
 - (۲) معمولاً در غلظت $50-70$ درصد بیهوشی استفاده می‌شود.
 - (۳) در سیلندر تحت فشار به صورت گاز نگهداری می‌شود.
 - (۴) از MAC بسیار پایینی برخوردار است.
- ۶ اثر بی‌دردی کدام دارو از طریق سه مکانیسم مختلف انجام می‌شود؟
- (۱) فنتانیل
 - (۲) ترامadol
 - (۴) مدتومیدین
 - (۳) ملوکسیکام
- ۷ کدام دارو برای پیشگیری از Motion sickness مناسب است؟
- (۱) کتامین
 - (۲) بروپوفل
 - (۴) مدتومیدین
 - (۳) آسپرومازین
- ۸ برای آرامبخشی یک بزرگاله 20 کیلوگرمی با زایلazin با دوز 0.5 mg/kg وریدی، چند میلی‌لیتر زایلazin 2 درصد نیاز است؟
- (۱) 0.1
 - (۲) 0.5
 - (۴) 0.4
 - (۳) 0.2
- ۹ در مقایسه لیدوکایین و بوپیوکائین کدام مورد صحیح است؟
- (۱) بوپیوکائین شروع اثر سریع دارد.
 - (۲) قدرت (Potency) لیدوکایین و بوپیوکائین یکسان است.
 - (۳) خطر مسمومیت با بوپیوکائین بیشتر از لیدوکایین است.
 - (۴) از هر دو دارو برای درمان آریتمی بطنی استفاده می‌شود.

- ۱۰ مهم ترین دلیل مرگ در سگ های دچار مسمومیت با شکلات کدام است؟
- (۱) آریتمی قلبی و نارسایی حاد کلیوی
 - (۲) مت هموگلوبینمی و نارسایی حاد کلیوی
 - (۳) آریتمی قلبی و اختلال در عملکرد دستگاه عصبی مرکزی
 - (۴) مت هموگلوبینمی و اختلال در عملکرد دستگاه عصبی مرکزی
- ترتیب شل شدن ماهیچه های اسکلتی به دنبال تجویز داروهای شل کننده عضلاتی در کدام مورد درست بیان شده است؟
- ۱۱
- (۱) ماهیچه دیافراگم قبل از ماهیچه های اندام های حرکتی
 - (۲) ماهیچه های سر، گردن و دم قبل از بقیه و تقریباً همزمان با هم
 - (۳) عضلات حلق قبل از دیگر عضلات
 - (۴) ماهیچه های اندام های حرکتی بعد از دیگر ماهیچه ها
- کدام گزینه در مورد داروی دتومیدین (Detomidine) درست است؟
- ۱۲
- (۱) یک β_1 بلوکر انتخابی است که باعث کاهش تعداد ضربان می شود.
 - (۲) یک آنتاگونیست انتخابی α_2 آدرنرژیک است که دارای اثر ضد دردی می باشد.
 - (۳) یک آگونیست انتخابی α_2 آدرنرژیک است که موجب گشاد شدن مجاری هوایی می شود.
 - (۴) یک آگونیست انتخابی α_2 آدرنرژیک است که می تواند موجب کاهش فشار خون شود.
- استفاده از ذغال فعل در مسمومیت ها چه کمکی به رفع مسمومیت می کند؟
- ۱۳
- (۱) دفع کلیوی سم را افزایش می دهد
 - (۲) جذب گوارشی سم را کاهش می دهد
 - (۳) متابولیسم سم را تشدید می کند
 - (۴) اثرات سم را ختنی می کند
- کدام یک از خصوصیات زیر را دارد؟ Partial agonist
- ۱۴
- (۱) به طور ناقص با گیرنده باند می شود
 - (۲) دارد اما Affinity دارد اما Efficacy ندارد
 - (۳) دارد اما Affinity دارد اما Efficacy آن از Full agonist کمتر است.
 - (۴) اثر آنتاگونیستی اپی نفرین در کاهش اثرات هیستامین جزء کدام مورد است؟
- ۱۵
- (۱) آنتاگونیست فیزیولوژیک
 - (۲) آنتاگونیست فارماکولوژیک
 - (۳) آنتاگونیست غیر رقبایی
 - (۴) آنتاگونیست شیمیایی
- علت عدم همخوانی بین نیمه عمر بنزودیازپین ها با مدت اثر آن ها کدام است؟
- ۱۶
- (۱) قرار گرفتن در سیکل کبدی - روده ای
 - (۲) عدم وجود اثر عبور اولیه
 - (۳) تجمع در بافت های چربی
 - (۴) تولید متابولیت های فعل
- کدام داروی ضد التهاب غیر استروئیدی، متابولیت فعل دارد؟
- ۱۷
- (۱) ایندومتاسین
 - (۲) فنیل بوتازون
 - (۳) فیروکوکسیب
 - (۴) دیکلوفناک
- کدام دارو دارای اثر ضد درد و ضد تب ولی فاقد اثر ضد التهاب است؟
- ۱۸
- (۱) آسپرین
 - (۲) فنیل بوتازون
 - (۳) سله کوکسیب
 - (۴) استامینوفن
- مفهوم First Pass Effect کدام است؟
- ۱۹
- (۱) انهدام و تخریب دارو در کبد پس از تجویز خوراکی آن
 - (۲) اثر دارویی که جذب خون می گردد.
 - (۳) انهدام و تجزیه دارو در معده پس از تجویز خوراکی آن
 - (۴) اثر ناشی از غلظت اولیه دارو در پلاسما

- ۲۰- مکانیسم اثر ضد درد، ضد تب و ضد التهابی داروهای غیراستروئیدی (NSAIDS) مربوط است به:
- (۱) مهار عمل آنزیم فسفولیپاز A_۲
 - (۲) جلوگیری از عمل آنزیم لیپوکسی زنان
 - (۳) جلوگیری از عمل آنزیم سیکلوكسی زنان
 - (۴) رقابت با ماده P در مسیر درد

فیزیولوژی:

- ۲۱- در کدامیک از حالات زیر کار تنفس حداقل است؟
- (۱) در حجم کم ریه
 - (۲) در حجم زیاد ریه
 - (۳) در ظرفیت کل ریهها
 - (۴) در ظرفیت باقی‌مانده عملی
- ۲۲- ریتم پایه تنفس توسط نورون‌های واقع در بصل النخاع تولید می‌شود. کدامیک از موارد زیر دوره دم را محدود کرده و تعداد تنفس را بالا می‌برد؟
- (۱) مرکز آینوسنیک
 - (۲) مرکز پنوموتاکسیک
 - (۳) گروه تنفسی شکمی
 - (۴) گروه تنفسی پشتی
- ۲۳- کدام یون و با کدام جهت حرکت باعث ایجاد دپولاریزاسیون در غشاء عصب می‌شود؟
- (۱) کلر و حرکت از مایع داخل سلولی به طرف مایع بین سلولی
 - (۲) پتانسیم و حرکت از مایع داخل سلولی به طرف مایع بین سلولی
 - (۳) سدیم و حرکت از مایع بین سلولی به طرف مایع داخل سلولی
 - (۴) کلسیم و حرکت از مایع بین سلولی به طرف مایع داخل سلولی
- ۲۴- عامل اصلی تعیین کننده میزان اکسیژن‌ناسیون بافتی کدام است؟
- (۱) ۲ و ۳ - دی‌فسفوگلیسرات
 - (۲) سرعت جریان خون بافت
 - (۳) میزان تولید CO₂ در بافت
 - (۴) کاهش یون‌های هیدروژن بافت
- ۲۵- کفه در پتانسیل عمل عضله قلبی ناشی از ورود کدام یون است؟
- (۱) کلر
 - (۲) کلسیم
 - (۳) سدیم
 - (۴) پتانسیم
- ۲۶- کدام قسمت سیستم عروقی می‌تواند به عنوان انبیار ذخیره خون عمل نماید؟
- (۱) وریدها
 - (۲) مویرگها
 - (۳) عروق لنفی
 - (۴) شریان‌ها
- ۲۷- همه گزینه‌های زیر موجب افزایش حجم ضربه‌ای می‌شوند، به غیر از:
- (۱) اپی‌نفرین
 - (۲) دیگوکسین
 - (۳) پیش‌بار
 - (۴) پس‌بار
- ۲۸- کدامیک از عبارات زیر در مورد حس‌های پیکری صحیح است؟
- (۱) حس‌های درد و وضعی توسط مسیر نخاعی - تالاموسی منتقل می‌شوند.
 - (۲) حس‌های فشار و وضعی توسط سیستم ستون خلفی منتقل می‌شوند.
 - (۳) حس‌های ارتعاش و تماس غیر دقیق توسط سیستم ستون خلفی منتقل می‌شوند.
 - (۴) حس‌های تعادل و تماس دقیق توسط سیستم قدمی - جانبی منتقل می‌شوند.
- ۲۹- کدام عبارت در مورد سیستم عصبی سمپاتیک صحیح است؟
- (۱) استیل کولین از انتهای همه نورون‌های پیش عقده‌ای سمپاتیک آزاد می‌شود.
 - (۲) همه اعصاب پس عقده‌ای سمپاتیک از انتهای خود نورابی نفرین آزاد می‌کنند.
 - (۳) سیستم عصبی سمپاتیک قطر مردمک چشم را بشل کردن عضله تنگ کننده مردمک تنظیم می‌کند.
 - (۴) اجسام سلولی نورون‌های پیش عقده‌ای سمپاتیک در ستون طرفی سینه‌ای و خاجی قرار دارد.

- ۳۰- صدای قلبی به چه دلیل تولید می‌شوند؟
- (۱) انقباض میوکارد
 - (۲) پمپ کردن خون توسط قلب
 - (۳) بسته شدن دریچه‌های قلبی
 - (۴) فعالیت الکتریکی میوکارد
- ۳۱- دریچه‌ای که بین دهلیز چپ و بطن چپ قرار دارد، کدام است؟
- (۱) Mitral valve (۲) Pulmonary valve
 - (۲) Tricuspid valve (۳) Semi-lunar valve
- ۳۲- در صورت بروز هیپوکسی، تولید کدام هورمون توسط کلیه افزایش خواهد یافت؟
- (۱) اریتروپوئتین (Thrombopoietin) (۲) ترومبوپوئتین (Erythropoietin)
 - (۳) رنین (Renin) (۴) آلدوسترون (Aldosterone)
- ۳۳- میزان تهویه ریوی در دقیقه (minute ventilation) برابر است با:
- (۱) حاصل ضرب حجم جاری تنفسی (TV) در تعداد تنفس
 - (۲) حاصل ضرب کل ظرفیت ریه (Total lung capacity) در تعداد تنفس
 - (۳) حاصل جمع ظرفیت دمی (Inspiratory capacity) و حجم ذخیره تنفسی (Expiratory reserve volume)
 - (۴) حاصل جمع ظرفیت دمی (Inspiratory capacity) و حجم ذخیره بازدمی (Expiratory reserve volume)
- ۳۴- همه موارد زیر در خصوص تنفس طبیعی صحیح‌اند، به جز:
- (۱) در زمان بازدم، عضله دیافراگم منقبض می‌شوند.
 - (۲) در زمان دم فشار داخل فضای جنب نسبت به فشار اتمسفر مشبت است.
 - (۳) در زمان بازدم فشار داخل فضای جنب (intrapleural pressure) بالاتر از فشار اتمسفر است.
 - (۴) در زمان دم، عضلات بین دندنه‌ای خارجی (External intercostals muscles) منقبض می‌شوند.
- ۳۵- همه موارد در خصوص ترکیب هوای دمی و بازدمی صحیح‌اند، به جز:
- (۱) میزان تیتروژن هوای دمی ۷۹ درصد است.
 - (۲) میزان بخار آب در هوای دمی کمتر از هوای بازدمی است.
 - (۳) در هوای بازدمی حدود ۴/۵ درصد دی‌اکسیدکربن وجود دارد.
 - (۴) غلظت اکسیژن هوای بازدمی کمتر از ۱۰ درصد است.
- ۳۶- تعداد طبیعی تنفس در سگ و گربه چند بار در دقیقه می‌باشد؟
- (۱) سگ ۱۰-۵، گربه ۲۰-۵۰
 - (۲) سگ ۲۰-۴۰، گربه ۱۰-۲۰
 - (۳) سگ ۱۰-۳۰، گربه ۱۰-۱۵
 - (۴) سگ ۱۰-۳۰، گربه ۲۰-۳۰
- ۳۷- اتساع برونش‌ها (Bronchodilation)، تحت تأثیر کدام اعصاب انجام می‌شود؟
- (۱) Autonomic nervous system (۲) Somatic nervous (۱)
 - (۳) Sympathetic nervous system (۴) Parasympathetic nervous system (۳)
- ۳۸- در یک حیوان سالم، بیشترین تعداد گلbul سفید از کدام نوع است؟
- (۱) نوتروفیل (Neutrophils) (۲) اوزینوفیل (Eosionphils)
 - (۳) بازویل (Basophils) (۴) لمفوцит (Lymphocytes)

- ۳۹- همه موارد در مورد گلوبول‌های قرمز صحیح‌اند، به‌جز:

- (۱) گلوبول‌های قرمز در استخوان‌های اسفنجی Cancellous bone ساخته می‌شوند.
- (۲) گلوبول‌های قرمز در انتقال دی‌اکسید کربن دخالت دارند.
- (۳) گلوبول‌های قرمز در انتقال اکسیژن دخالت دارند.
- (۴) گلوبول‌های قرمز در طحال (Spleen) ساخته می‌شود.

- ۴۰- در الکتروکاردیوگرام (ECG)، کمپلکس QRS، ناشی از کدام مورد است؟

- (۱) ریپولاریزاسیون بطن‌ها
- (۲) دیپولاریزاسیون بطن‌ها
- (۳) ریپولاریزاسیون دهلیزها
- (۴) دیپولاریزاسیون دهلیزها

أصول جراحی و بیهوشی دامپیزشکی:

- ۴۱- در بیهوشی عمومی کدام رفلکس دیرتر از بین می‌رود؟

- (۱) رفلکس قرنیه
- (۲) رفلکس پلکی
- (۳) رفلکس پدال
- (۴) رفلکس بلع

- ۴۲- کدام دارو برای تسکین درد احساسی ناشی از کولیک در اسب مناسب‌تر است؟

- (۱) کتامین
- (۲) دیازپام
- (۳) آسپرورومازین
- (۴) زیالزین

- ۴۳- همه موارد از عوارض داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAIDs) می‌باشد، به‌جز:

- (۱) زخم‌های گوارشی
- (۲) تضعیف تنفسی
- (۳) تداخل در عملکرد پلاکت‌ها
- (۴) کاهش خون‌رسانی به کلیدهای

- ۴۴- کدام مورد میزان اکسیژن دریافتی بیمار را در طی بیهوشی استنشاقی تعیین می‌کند؟

- (۱) درجه فلومتر (Flowmeter)
- (۲) درجه تبیخیرکننده (Vaporizer)
- (۳) حجم کیسه ذخیره تنفسی (Reservoir bag)
- (۴) فشار داخل سیلندر اکسیژن

- ۴۵- تفاوت پروپوفل با تیوپنیتال سدیم در کدام ویژگی است؟

- (۱) متابولیسم آن کندر است.
- (۲) در بدن تجمع پیدا نمی‌کند.
- (۳) سیستم قلبی عروقی را تضعیف می‌کند.
- (۴) تزریق خارج رنگی آن تحریک بافتی شدیدتری ایجاد می‌کند.

- ۴۶- میزان مصرف داروی بیهوشی استنشاقی به همه موارد زیر بستگی دارد، به‌جز:

- (۱) درجه فلومتر
- (۲) درجه تبیخیرکننده
- (۳) MAC داروی بیهوشی
- (۴) تعداد تنفس بیمار در دقیقه

- ۴۷- از کدام دارو می‌توان برای کنترل تشنیج استفاده کرد؟

- (۱) آتروپین
- (۲) آسپرورومازین
- (۳) دیازپام
- (۴) کتامین

- ۴۸- کدام یک از داروهای آلفا-۲ آگونیست زیر در سگ قوی‌تر است؟
- (۱) زیلازین (Xylazine)
 (۲) رامیفیدین (Romifidine)
 (۳) مدتومیدین (Medetomidine)
 (۴) دتومیدین (Detomidine)
- ۴۹- در صورتی که ۱۲/۵ سیسی داروی پروپوفل ۱٪ (یک درصد) به یک سگ ۲۵ کیلوئی تزریق شود چه مقدار دارو بر حسب $\frac{\text{mg}}{\text{kg}}$ تجویز شده است؟
- (۱) ۵
 (۲) ۸
 (۳) ۱۰
 (۴) ۱۵
- ۵۰- در خصوص اصطلاح حداقل غلظت آلتوالی (MAC) داروهای بیهوشی کدام جمله صحیح است؟
- (۱) دارویی که MAC بالاتری داشته باشد قوی‌تر است.
 (۲) MAC داروهای بیهوشی در اسب ۲ برابر سگ و گربه است.
 (۳) میزان مصرف داروی بیهوشی استنشاقی در طی بیهوشی به MAC دارو بستگی دارد.
 (۴) براساس MAC دارو می‌توان سرعت القاء و بازگشت از بیهوشی را تعیین کرد.
- ۵۱- همه موارد زیر در خصوص داروهای فنوتیازین صحیح‌اند، به‌جز:
- (۱) احتمال تشدید تشنج و صرع (seizures)
 (۲) مقلد سیستم سمباتیک (sympathomimetic)
 (۳) ایجاد افت فشار خون (hypotensive)
 (۴) دارای اثر ضد استفراغی (antiemetic)
- ۵۲- از کدام یک از روش‌های بی‌حسی زیر می‌توان برای انجام جراحی Episiotomy در گاو استفاده کرد؟
- (۱) بی‌حسی اپیدورال قندامی (Cranial)
 (۲) بی‌حسی پاراورتیرال به روش پروکسیمال (Proximal)
 (۳) بی‌حسی پاراورتیرال به روش دیستال (Distal)
 (۴) بی‌حسی اپیدورال خلفی (Caudal)
- ۵۳- کدام محلول، علاوه بر اثر گندزدایی، خاصیت استریل‌کنندگی نیز دارد؟
- (۱) الکل
 (۲) بتادین
 (۳) کلرهگزیدین
 (۴) گلوتار آلدھید
- ۵۴- در کدام گونه بروز جوانه گوشتی بیش از حد، شایع‌تر است؟
- (۱) اسب
 (۲) سگ
 (۳) گاو
 (۴) گوسفند
- ۵۵- بخیه پارکرکر (Parker-ker) از کدام الگوهای بخیه تشکیل شده است؟
- (۱) ساده سرتاسری و قفلی (Simple Continuous + Lock stitch)
 (۲) کوشینگ و لمبرت (Cushing + Lambert)
 (۳) لمبرت و تشكی (Lambert + Mattress)
 (۴) لمبرت و هالستد (Lambert + Halsted)
- ۵۶- در استریلیزاسیون به روش پلاسمای (Plasma sterilization)، از کدام ماده استفاده می‌شود؟
- (۱) اتیلن اکساید
 (۲) اشعه ماوراء بنفش
 (۳) کبالت ۶۰
 (۴) هیدروژن پراکساید
- ۵۷- نخ‌های بخیه قابل جذب صناعی (سننتیک) در بافت به کدام یک تبدیل می‌شوند؟
- (۱) آب و اکسید نیتروژن
 (۲) آب و دی‌اکسید کربن
 (۳) آب و لرف
 (۴) آب و اسیدهای آمینه

- ۵۸- کدام آنتی‌بیوتیک موضعی در بافت‌های نکروزه نفوذ نموده و اپی‌تیلیزاسیون را تسريع می‌نماید؟
- (۱) باسیتراسین
 - (۲) جنتامایسین
 - (۳) سیلور سولفادیازین
 - (۴) نیتروفورازون
- ۵۹- اولین واکنش بدن در هنگام وقوع خونریزی کدام است؟
- (۱) انقباض عروقی (Vasoconstriction)
 - (۲) انعقاد یا تشکیل لختهٔ فیبرینی (Coagulation)
 - (۳) تجمع پلاکت‌ها (Platelet Aggregation)
 - (۴) فیبرینولیزیس (Fibrinolysis)
- ۶۰- در کدام گونه، برای انجام لوله‌گذاری نای باید بیهوشی عمیق‌تر باشد؟
- (۱) اسب
 - (۲) سگ
 - (۳) گربه
 - (۴) گوسفند
- ۶۱- در صورت کاهش تعداد تنفس و کاهش تهویه ریوی کدام اختلال اسید و باز روی می‌دهد؟
- (۱) آسیدوز تنفسی
 - (۲) آکالالوز تنفسی
 - (۳) آکالالوز متابولیک
 - (۴) اسیدوز متabolیک
- ۶۲- برای مایع درمانی در یک سگ ۲۰ کیلوگرمی با سرعت تزریق ۱۵ میلی‌لیتر به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن در هر ساعت، تعداد تقریبی قطره‌ها در دقیقه کدام است؟ (هر میلی‌لیتر معادل ۲۰ قطره در نظر گرفته شود)
- (۱) ۴۵
 - (۲) ۵۵
 - (۳) ۶۵
 - (۴) ۷۵
- ۶۳- بی‌حسی اپیدورال در ناحیه کمری - خاجی (Lumbosacral) در کدام حیوان توصیه می‌شود؟
- (۱) اسب
 - (۲) گوسفند
 - (۳) گاو
 - (۴) گامیش
- ۶۴- علت عدم کارایی داروی بی‌حسی لیدوکائین در بافت‌های ملتهب و عفونی، افزایش شکل دارو به دلیل بودن محیط می‌باشد.
- (۱) یونیزه - اسیدی
 - (۲) یونیزه - قلیایی
 - (۳) غیریونیزه - اسیدی
 - (۴) غیریونیزه - قلیایی
- ۶۵- در یک بز نر مبتلا به انسداد مجرای پیشابرای، کدام داروی بی‌حسی منع مصرف دارد؟
- (۱) آسپرومازین
 - (۲) پروپوفل
 - (۳) زایلازین
 - (۴) میدازولام
- ۶۶- در مورد خونبندی با استفاده از الکتروکوثر کدام یک از موارد زیر صحیح است؟
- (۱) بهترین وسیله خونبندی در خونریزی‌های دیواره روده‌هاست.
 - (۲) استفاده از کوثر باعث کاهش طول مدت جراحی می‌شود.
 - (۳) استفاده از کوثر احتمال بروز عفونت در بافت را کاهش می‌دهد.
 - (۴) استفاده از کوثر می‌تواند باعث تسريع روند التیام شود.
- ۶۷- کدام داروی آنتاگونیست، با بقیه متفاوت است؟
- (۱) آتیپامازول (Atipamezole)
 - (۲) تولازولین (Tolazoline)
 - (۳) فلومازنیل (Flumazenil)
 - (۴) یوهمبین (Yohimbine)

- ۶۸- **وقوع اسکولیوزیس (Scoliosis)** از معایب کدام تکنیک بی‌حسی است؟

- (۱) اپیدورال (Epidural)
- (۲) انتشاری (Infiltration)

(۳) پاراورتبرال دیستال (Distal Para vertebral)

(۴) پاراورتبرال پروگزیمال (Proximal Para vertebral)

- ۶۹- اساسی‌ترین دارو در درمان شوک آنافیلاکتیک کدام است؟

- (۱) آتروپین (Atropine)
- (۲) آنتی‌هیستامین (Antihistamine)
- (۳) کورتیکواسترونید (Corticosteroid)

- ۷۰- زخم عفونی، زخمی است که حداقل بیش از باکتری در هر گرم از بافت زخم داشته باشد.

- | | | | |
|-----------------|-----|-----------------|-----|
| ۱۰ ^۴ | (۲) | ۱۰ ^۳ | (۱) |
| ۱۰ ^۶ | (۴) | ۱۰ ^۵ | (۳) |

جراحی عمومی دام‌های بزرگ و دام‌های کوچک:

- ۷۱- در صورتی که احتمال چسبندگی دیواره شیردان در جابجایی شیردان به سمت چپ وجود داشته باشد، رهیافت انتخابی کدام است؟

- (۱) تهیگاه راست (Right retractor)
- (۲) تهیگاه چپ (Left retractor)
- (۳) پارامدین راست (Right paramedian)
- (۴) پارامدین چپ (Left paramedian)

- ۷۲- کدام آنتی‌بیوتیک‌ها در دام‌های مزروعه منع مصرف دارند؟

- (۱) اریتروماسین - تتراسایکلین (Tetracycline)
- (۲) بنی‌سیلین - انروفلوكسازین (Fluorochinolone)
- (۳) جنتامایسین - انروفلوكسازین (Fluorochinolone)
- (۴) کلرامفینیکل - مترونیدازول (Metronidazole)

- ۷۳- در عفونت ناف گوساله بیش آگهی کدام مورد بدتر است؟

- (۱) آیسه نافی (Umbilical abscess)
- (۲) عفونت اوراکوس (Urachal infection)
- (۳) عفونت شریان نافی (Omphalophlebitis)
- (۴) عفونت ورید نافی (Omphaloarteritis)

- ۷۴- در قوچ، معمول ترین محل انسداد در اثر سنگ ادراری کدام قسمت میزراه می‌باشد؟

- (۱) ابتدای میزراه در ناحیه گردان مثانه (Sigmoid flexure)
- (۲) خم سیگموئید (Sigmoid flexure)
- (۳) زانده کرمینه (Urethral process)
- (۴) قوس ایسکیوم (Ischial arch)

- ۷۵- در اختنه اسب به روش باز همه لایه‌های زیر برش داده می‌شوند. به جز:

- (۱) اسکروتوم (Scrotum)
- (۲) تونیکا آبوجینا (Tunica Albuginea)
- (۳) تونیکا واژینالیس (Tunica Vaginalis)
- (۴) دارتوس (Dartus)

- ۷۶- بخیه رحم در سزارین گاو با چه نخی توصیه شده است؟

- (۱) پلی گلакتین ۹۱۰
- (۲) پلی دیاکسانون
- (۳) نایلون

- ۷۷- به توابع مویی روده چه اطلاق می‌شود؟
- | | |
|-----------------------|-----------------|
| Trichobezoar (۲) | Fecalith (۱) |
| Phytotrichobezoar (۴) | Phytobezoar (۳) |
- ۷۸- معمول ترین محل تجمع سنگ‌های ادراری در اسب، کدام بخش دستگاه ادراری می‌باشد؟
- | | |
|------------|------------|
| (۲) میزنای | (۱) کلیه |
| (۴) مثانه | (۳) میزراه |
- ۷۹- برای جلوگیری از باز شدن پوستی که تحت فشار بخیه می‌شود، کدام الگوی بخیه توصیه می‌شود؟
- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| (۲) تک ساده (Simple interrupted) | (۱) تشكی افقی (Horizontal mattress) |
| (۴) لمبرت (Lembert) | (۳) کوشینگ (Cushing) |
- ۸۰- در جراحی کولیک اسب معمولاً برش در کدام ناحیه انجام می‌شود؟
- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| (۲) خط میانی شکمی (Ventral midline) | (۱) تهیگاهی (Flank) |
| (۴) مجاور دنده‌ای (Paracostal) | (۳) مجاور خط میانی (Paramedian) |
- ۸۱- کدام گزینه تعریف درست تکنیک جراحی **Billroth II** است؟
- | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| (۱) برداشتن پیلور به روش جراحی و آناستوموز معده به دئودنوم |
| (۲) برش تمام ضخامت در چیلور و دوختن مجدد آن به روشی که باعث افزایش قطر خروجی معده شود. |
| (۳) برداشتن قسمتی از معده از جمله پیلور به روش جراحی و آناستوموز معده به ژنتوم |
| (۴) برش بر روی لایه سروزی و عضلانی پیلور |
- ۸۲- کدام مورد در خصوص انجام درمان جراحی پیومتر در سگ صحیح می‌باشد؟
- | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (۱) ایجاد برش لاپاراتومی برای خارج نمودن رحم مبتلا به پیومتر در حدفاصل زایفونید تا ناف می‌باشد. |
| (۲) اگر شاخهای رحم دچار چرخش شده باشند، باید قبل از خارج نمودن رحم از محوطه بطئی، چرخش‌ها اصلاح شوند. |
| (۳) انجام سیستوستز (Cystocentesis) و جمع آوری نمونه ادرار بعد از برش دیواره شکم به هیچ وجه توصیه نمی‌شود. |
| (۴) برای بیرون کشیدن رحم از محوطه بطئی نباید از قلاب عمل عقیمسازی (spay hock) استفاده نمود. |
- ۸۳- کدام گزینه می‌تواند متعاقب استفراغ‌های مداوم در اثر استنوز پیلور ایجاد شود؟
- | |
|---------------------------|
| (۱) هیپو کالمی و آلکالوز |
| (۲) هایپر کالمی و آلکالوز |
| (۳) هیپو کالمی و اسیدوز |
- ۸۴- اگر در زمان انجام عمل **Perineal urethrostomy** در گربه تصمیم به انجام عمل اخته گرفته شود، استفاده از چه روشی توصیه می‌شود؟
- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| Overhand technique (۲) | Scrotal ablation (۱) |
| Scrotal open technique (۴) | Prescrotal technique (۳) |
- ۸۵- تجویز قبل از عمل کدام دسته از آنتی‌بیوتیک‌ها برای بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی بلامانع است؟
- | | |
|----------------------|-------------------|
| (۱) آمینو گلیکوزیدها | (۲) تراسایکلین‌ها |
| (۳) سفالوسپورین‌ها | (۴) سولفانامیدها |
- ۸۶- شایع‌ترین تومور در سگ‌های ماده کدام است؟
- | | |
|-----------------|------------------|
| (۱) تومور پستان | (۲) تومور رحم |
| (۳) تومور مثانه | (۴) تومور میزراه |
- ۸۷- کدام رهیافت لاپاراتومی در دام‌های کوچک با لیگامان فالسی فورم (**Falciform lig.**) مواجه می‌شود؟
- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| (۱) تهیگاهی (Ventral midline) | (۲) تهیگاهی (Paralumbar fossa) |
| (۳) مجاور دنده‌ای (Paracostal) | (۴) مجاور خط میانی (Paramedian) |

- ۸۸ - برای انجام عمل جراحی بر روی دوازدهه و پانکراس، بهترین رهیافت در سگ و گربه کدام است؟
- (۱) خط میانی شکم (Ventral midline)
(۲) فلانک راست (Right flank)
(۳) فلانک چپ (Left flank)
(۴) موازی دندنهای در چپ (Left paracostal)
- ۸۹ - همه موارد زیر از دلایل التیام سریع برش روی دیواره معده است، به جز:
- (۱) خونرسانی زیاد
(۲) بار میکروبی کم (اسید معده)
(۳) وجود لایه عضلانی ضخیم در دیواره
(۴) مکانیسم‌های دفاعی چادرینه
- ۹۰ - در مورد فتق دیافراگمی کدام مورد صحیح است؟
- (۱) ارگان‌های شکمی در داخل کیسه فتقی قرار دارد.
(۲) ریه‌ها به سمت محوطه شکمی جابه‌جا می‌شوند.
(۳) حالت پنوموتوراکس (Pneumothorax) بروز می‌کند.
(۴) حالت کولاپس ریه‌ها روی می‌دهد.

