

تبادلات گازی



نفس کشیدن، یکی از ویژگی‌های آشکار در بسیاری از جانوران است. اما آیا در همه جانوران به یک شکل انجام می‌شود؟ هدف از آن چیست؟

در ذهن بسیاری از ما، نفس کشیدن به معنای زنده بودن است. برای تشخیص اینکه آیا فردی زنده است یا نه، غالباً نگاه می‌کنیم که آیا نفس می‌کشد یا خیر. به نظر می‌رسد این فرایند، کاری حیاتی را برای ما انجام می‌دهد. اما این کار حیاتی چیست؟

آیا زمانی که در هوای آلوده تنفس می‌کنیم به این کار حیاتی آسیب نمی‌رسانیم؟ افرادی که به دخانیات روی می‌آورند، چگونه به بدن خود آسیب می‌رسانند؟ اینها فقط بخشی از پرسش‌هایی است که پاسخ آنها را با مطالعه این فصل به دست خواهیم آورد.

چرا نفس می کشیم؟

ارسطو: برای خنک شدن قلب - یکسان دانستن ترکیب هوای دمی و بازدمی- عدم اطلاع از انواع گازهای هوا

اهمیتی بالاتر از خنک کردن برای تنفس وجود دارد



اکسیژن هوای دمی بیش از بازدمی
کربن دی اکسید هوای بازدمی بیش از دمی

درک اهمیت دستگاه تنفس



با درک ارتباط دستگاه تنفس و گردش خون



- ۱- آوردن خون تیره (با اکسیژن کم و کربن دی اکسید زیاد) اندامهای بدن توسط دستگاه گردش خون به شش
- ۲- گرفتن اکسیژن و پس دادن کربن دی اکسید به شش ها و تبدیل به خون روشن
- ۳- فرستادن خون روشن توسط دستگاه گردش خون به اندامها و سلولها



چه ضرورتی برای رسیدن اکسیژن به بافتها وجود دارد؟ جهت انجام فرآیند تنفس سلولی

تامین انرژی فرآیندهای سلولی از ATP



چه ضرورتی برای دفع کربن دی اکسید از بافتها وجود دارد؟ برای جلوگیری از تغییر pH و اختلال در کار پروتئینها



کاهش pH ← تغییر در ساختار و عملکرد پروتئینها ← اختلال گسترده در کار یاخته ها و بافتها

افزایش CO₂ خطرناکتر از کاهش اکسیژن است

آیا هوای دمی یا هوای بازدمی متفاوت است؟

پژوهش‌های دانشمندان در ابتدا، وجود سه گاز نیتروژن، اکسیژن و کربن‌دی‌اکسید را در هوا نشان

داد. در این آزمایش، هوای دمی و بازدمی را از نظر مقدار نسبی کربن‌دی‌اکسید بررسی می‌کنیم. اما چگونه می‌توان مقدار کربن‌دی‌اکسید را در هوا تشخیص داد؟

برای انجام این آزمایش می‌توان از محلول آب آهک (بی‌رنگ) یا برم تیمول بلو رقیق (آبی رنگ) که معزف کربن‌دی‌اکسید هستند استفاده کرد. با دمیدن کربن‌دی‌اکسید به درون این محلول‌ها، آب آهک شیری‌رنگ و برم تیمول بلو، زرد رنگ می‌شود.

۱- دستگاه را مطابق شکل سوار کنید. انتهای لوله بلند را درون محلول و انتهای لوله کوتاه را در بالای محلول قرار دهید.

۲- به آرامی از طریق لوله مرکزی، عمل دم و بازدم را انجام دهید. در هنگام دم، در کدام ظرف، حباب هوا مشاهده می‌شود؟ هنگام بازدم چطور؟

۳- دم و بازدم را ادامه دهید تا رنگ معزف در یکی از ظرف‌ها تغییر کند. آن را یادداشت کنید.


۴- چند دقیقه دیگر نیز به دم و بازدم ادامه دهید و تغییرات بعدی رنگ را در هر دو ظرف مشاهده، و یادداشت کنید.

۵- اکنون به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

الف) چرا هوای دمی، به یک ظرف و هوای بازدمی، به ظرف دیگر وارد می‌شود؟

ب) نخست در کدام ظرف تغییر رنگ مشاهده کردید؟

پ) آیا معزف در هر دو ظرف سرانجام تغییر رنگ داد؟ این موضوع چه چیزی را برای ما روشن می‌کند؟



پاسخ به پرسش‌ها :

الف) انتهای لوله بلند متصل به لوله‌ی مرکزی داخل مایع ظرف B قرار دارد بنابراین هنگام دم مایع بر اثر مکش ایجاد شده وارد این لوله می‌شود و هوا از لوله‌ی کوتاه متصل به لوله‌ی مرکزی وارد می‌شود. البته این هوا از خارج از طریق لوله بلند ظرف A وارد این ظرف می‌شود. هنگام بازدم هوای ظرف A راهی برای خروج ندارد پس هوای زیادی وارد این ظرف نمی‌شود. در حالیکه هوا از طریق لوله‌ی بلند وارد مایع ظرف B شده و در نهایت به وسیله‌ی لوله‌ی کوتاه ظرف B خارج می‌شود

ب) در ظرف مربوط به لوله‌ی هوای بازدمی (ظرف B) که حباب‌های هوا از آن خارج می‌شوند.

ج) بله هوای بازدمی به ظرف A نیز وارد می‌شود البته به مقدار کم این هوا مستقیماً وارد مایع نمی‌شود و تنها با سطح آن تماس می‌یابد در نتیجه تغییر رنگ کندتر و به صورت تدریجی انجام می‌شود.

بخشهای عملکردی دستگاه تنفس، شامل دو بخش: هادی و عملکردی

بخش هادی: متشکل از مجاری تنفسی (بینی تا نایژک انتهایی) – هدایت هوا به بیرون و درون دستگاه تنفسی- پاکسازی هوا از ناخالصیها و میکربها و گردو غبار- گرم و مرطوب نمودن هوا جهت مبادله گازها با خون

بینی و نقش آن: ابتدای مسیر عبور هوا- دارای پوست نازک در ابتدا و مخاط مژکدار پس از آن و در سراسر مجاری هادی بعدی- جلوگیری از ورود ناخالصیها توسط موها- دارای سلولهای مژکدار فراوان و ترشحات ضد میکربی در مخاط مژکدار – گرم کردن هوا توسط شبکه وسیع رگهای نازک دیواره

نقش ترشحات ضد میکربی یا مخاطی مجاری هادی:

۱- به دام انداختن ناخالصیها ← راندن ترشحات مخاطی+ناخالصیها به سوی حلق توسط مژکها ←

نابودی توسط شیره معده یا هدایت به خارج بدن(از طریق دهان یا بینی)


۲- مرطوب کردن هوا جهت تبادل گازها (مبادله گازها بین شش و خون تنها به صورت محلول در آب)

نزدیکی رگهای بینی به سطح درونی آن(پوست نازک بینی در داخل) ← آسیب پذیری بیشتر و خونریزی

مسیر عبور هوا: از بینی یا دهان یا هردو ← گلو ← حنجره ← نای ← نایژه ← نایژک

بیشتر بدانید

عوامل مختلفی بر عملکرد یاخته‌های مژک‌دار اثر می‌گذارند. هوای خیلی سرد، حرکت مژک‌های مخاطه را کند می‌کند. دود سیگار و قلیان و بعضی از آلاینده‌های شیمیایی موجود در هوا، باعث مرگ یاخته‌های مژک‌دار می‌شوند.



شکل ۲- مخاط مژک‌دار. این مخاط در بینی شروع می‌شود و سراسر مجاری هادی را می‌پوشاند. این شکل، مخاط نای را نشان می‌دهد.

گلو: گذرگاه ماهیچه ای جهت عبور هوا و غذا - وجود دو راهی در انتهای گلو: حنجره در جلو و مری در پشت


حنجره: ابتدای نای- بازنگه داشتن مجاری عبور هوا با داشتن دیواره غضروفی - داشتن در پوش اپی گلوت

دیواره نای: دارای حلقه های غضروفی نعل اسبی (C شکل) که دهانه غضروف به سمت مری است (جهت آسان شدن حرکت لقمه های بزرگ و سیر امواج کرمی شکل)

تقسیم نای در انتها به دو نایژه

ساختار بافتی نای از داخل به خارج:

مخاط با بافت پوششی استوانه ای مزکدار
زیر مخاط دارای رگ خونی و اعصاب
غضروفی ماهیچه ای جهت استحکام و انعطاف پذیری
لایه پیوندی



نایژه:

ورود هر نایژه به یک شش و تقسیم به نایژه های باریکتر

کاسته شدن مقدار غضروف از سمت نایژه اصلی به سمت نایژه های باریکتر

نایژک: انشعابی از نایژه که دیگر غضروفی ندارد ← توانایی تنگ و گشاد شدن و کنترل هوای ورودی و خروجی

نایژک انتهایی: آخرین انشعاب نایژک در بخش هادی



شکل ۶- انشعابات نای

بخش مبادله ای: با حضور حبابکها (کیسه های هوایی)

نایژک مبادله ای: نایژکی که روی آن حبابک داریم

کیسه حبابکی: هر یک از اجتماعات حبابکی (شبيه خوشه انگور) در انتهای نایژک مبادله ای

با پایان یافتن مخاط مژکدار در نایژک مبادله ای ← مقابله کیسه های حبابکی با ناخالصی هوا توسط ماکروفازها

کیسه های حبابکی **آخرین** خط دفاع دستگاه تنفسی

موهای بینی و بعد مخاط مژکدارش **اولین** خط دفاع دستگاه تنفسی




ماکروفازها (درشت خوارها): دسته ای از سلولهای دستگاه ایمنی

نابود کردن ناخالصی ها و میکربهایی که از مخاط مژکدار گریختند

دارای حرکت و عمل بیگانه خواری

حضور در سایر نقاط بدن با نامهای مختلف:

کوپفر در کبد، استئوکلاست در استخوان، میکروگلیا در مغز، آلوئولار در ریه



عامل سطح فعال (سورفاکتانت)

پوشیده شدن سطوح داخلی کیسه های حبابکی با **سورفاکتانت** (در جهت باز شدن کیسه ها)



مقابله با نیروی کشش سطحی آب سطوح داخلی (که در جهت بستن کیسه هاست)




آسان شدن انبساط و باز شدن کیسه ها ← امکان تبادل گازها با خون

ترشح **سورفاکتانت** از برخی سلولهای حبابک در اواخر دوران جنینی



سختی تنفس در برخی نوزادان زودرس



احاطه شدن اطراف حبابکها با مویرگهای خونی ← تبادل O_2 و CO_2 بین هوا و خون

وجود بافت پوششی سنگفرشی (یک لایه نازک) در هر دو دیواره حبابکی و رگ خونی



برش حبابک و رگهای خونی اطراف آن


وجود ۲ نوع سلول در دیواره حبابک:

- ۱- پوششی سنگفرشی با تعداد فراوان
- ۲- ترشح کننده سورفاکتانت با تعداد کم و ظاهر متفاوت

غشاء پایه مشترک بین بافت پوششی حبابک و مویرگ (در برخی نقاط)



به حداقل رسیدن مسافت انتشار گازها



کامل شدن کار دستگاه تنفس با همکاری دستگاه گردش خون:



رساندن O2 به بافتها و گرفتن CO2 از بافتها و انتقال آن به ششها توسط خون

ساختار هموگلوبین در گلبول قرمز: ۴ رشته پلی پپتیدی + ۴ گروه غیر پروتئینی هم هر گروه هم دارای یک اتم آهن با قدرت اتصال برگشت پذیر به اکسیژن

اکسیژن بالا در ششها ← اتصال اکسیژن به هموگلوبین ← غلظت اکسیژن تعیین کننده اتصال یا گسستن به هموگلوبین
اکسیژن پایین در بافتها ← جدا شدن اکسیژن از هموگلوبین و انتقال به سلولها

غلظت CO2 تعیین کننده اتصال یا گسستن به هموگلوبین

اتصال CO2 به هموگلوبین در بافتها

جدا شدن CO2 از هموگلوبین در ششها

بیشتر بدانید

گاز کربن مونوکسید، بدون رنگ، بو یا طعم است و بنابراین وجود آن در محیط، قابل تشخیص نیست؛ به همین علت آن را قاتل خاموش می‌نامند. این گاز در دود حاصل از سوختن ناقص سوخت‌های فسیلی مثل نفت و گاز پدید می‌آید. به همین علت اطمینان از خروج دود وسایلی که از سوخت فسیلی استفاده می‌کنند مثل بخاری، هیمنه‌سوز یا آب‌گرمکن کاملاً ضرورت دارد.


اتصال محکمتر CO (مونواکسید کربن) با هموگلوبین:

محل اتصال یکسان O2 با CO

اتصال CO به هموگلوبین مانع اتصال O2

کاهش انتقال اکسیژن در خون

گاز گرفتگی (مسمومیت) و مرگ خاموش




راههای انتقال O₂ و CO₂ توسط خون:


- ۱- محلول در پلاسما (خوناب): ۳ درصد
- ۲- توسط هموگلوبین: ۹۷ درصد

راههای انتقال CO₂ توسط خون:


- ۱- محلول در پلاسما: ۷ درصد
- ۲- توسط هموگلوبین: ۲۳ درصد
- ۳- توسط یون بیکربنات در پلاسما: ۷۰ درصد



انیدراز کربنیک در گلبول قرمز




اتصال H⁺ حاصله به هموگلوبین و جلوگیری از اسیدی شدن خون و کاهش pH خروج یون بیکربنات از گلبول قرمز و ورود به پلاسما با رسیدن خون به شش ها: آزاد شدن CO₂ از بیکربنات و انتشار آن به هوا



موقعیت: درون قفسه سینه، روی پرده ماهیچه ای دیافراگم - کوچکتر بودن شش چپ به علت مجاورت با قلب

دارای ساختار اسفنج گونه به علت وجود کیسه های هوایی (حبابکی) فراوان
وجود مویرگهای خونی فراوان اطراف کیسه های هوایی همچون تار عنکبوت

شش ها مجموعه ای از لوله های منشعب، کیسه های هوایی و رگها که با بافت پیوندی احاطه شده اند



عامل اتصال شش به قفسه سینه


وجود پرده دو لایه جنب اطراف هر شش جداگانه
(یک لایه چسبیده به شش و دیگری چسبیده به قفسه سینه)

درون پرده جنب ← فضای جنب پر شده با مایع جنب

۲ ویژگی مهم ششها: ۱- پیروی از حرکات قفسه سینه ۲- کشسانی

انبساط قفسه سینه ← انقباض شش ها ← افزایش حجم و کاهش فشار هوای شش ← ورود هوا از بیرون به شش (دم)

مقاومت شش ها در برابر انقباض به علت خاصیت کشسانی ← تمایل به برگشت به وضعیت قبل ← کاهش حجم و افزایش فشار هوای شش ← خروج هوا از شش به بیرون (بازدم)



دم فرآیند فعال، همراه با افزایش حجم قفسه سینه:
 ۱- انقباض دیافراگم ← مسطح شدن آن
 ۲- انقباض ماهیچه های بین دنده ای خارجی ← ۱- جابه جا کردن دنده ها به بالا و جلو ۲- راندن جناغ به جلو
 تنفس آرام و طبیعی ← نقش اصلی بر عهده دیافراگم
 ویژگی کشسانی ششها ← استراحت ماهیچه دیافراگم و بین دنده ای خارجی ← کاهش حجم قفسه سینه و ششها
 راندن هوا به بیرون شش

کاهش حجم قفسه سینه با انقباض ماهیچه های بین دنده ای داخلی و شکم در بازدم عمیق

۱- ویژگی ظاهری: شش به علت دارا بودن کیسه‌های هوایی فراوان، حالتی اسفنج گونه دارد. شش

راست از شش چپ بزرگ‌تر است. شش راست از سه قسمت یا لپ (لوب) و شش چپ از دو قسمت تشکیل شده است.

۲- تشخیص شش راست و چپ: اگر در نمونه‌ای که تهیه کرده‌اید مری نیز وجود دارد، به محل قرارگیری آن توجه کنید. نای در جلو و مری در پشت قرار گرفته است و به این ترتیب می‌توانید سطح جلویی و پشتی نای و شش‌ها (و در نتیجه راست و چپ آنها) را نیز مشخص کنید.

مری را جدا کنید. برای تشخیص سطح جلویی و پشتی نای در حالتی که مری از آن جدا شده است، کافی است به یاد داشته باشید که غضروف‌های نای C شکل اند. این وضعیت



باعث می‌شود که در نای، قسمت دهانه حرف C از سایر قسمت‌ها نرم‌تر باشد، با لمس کردن، این قسمت را پیدا کنید. این قسمت، محل اتصال نای به مری و بنابراین سطح پشتی نای است.

۳- بررسی انبساط پذیری شش‌ها: با یک تلمبه از نای به درون شش‌ها بدمید و خاصیت انبساط‌پذیری و قابلیت کشسانی شش‌ها را مشاهده کنید.

۴- بررسی ساختارهای درونی: نای را از قسمت نرم آن (دهانه حرف C) در طول، برش دهید تا به نزدیکی شش‌ها برسید. در نای گوسفند، قبل از دو نایژه اصلی، یک انشعاب سوم هم مشاهده می‌شود که به شش راست می‌رود. مدخل این انشعاب و بعد نایژه‌های اصلی را مشاهده کنید.

برش طولی نای را از مدخل نایژه اصلی ادامه دهید. دقت کنید که بریدن نایژه اصلی به سادگی نای نیست و این به علت ساختار غضروف‌های نایژه است که در ابتدا به صورت حلقه کامل و بعد به صورت قطعه قطعه است. در طول نای، مدخل‌های نایژه‌های بعدی قابل مشاهده است.

اگر تکه‌ای از شش را بپزید، در مقطع آن سوراخ‌هایی را مشاهده می‌کنید که به سه گروه قابل تقسیم‌اند. نایژه‌ها، سرخرگ‌ها و سیاهرگ‌ها. لبه نایژه‌ها به علت دارا بودن غضروف، زبر است و به این ترتیب از دو رگ دیگر قابل تشخیص است. سرخرگ‌ها دیواره محکم‌تری نسبت به سیاهرگ‌ها دارند و به همین علت، برخلاف سیاهرگ‌ها دهانه آنها حتی در نبود خون هم باز است اما دهانه سیاهرگ‌ها در نبود خون بسته است.

اگر تکه‌ای از شش را بپزید و در ظرفی پر از آب بیندازید خواهید دید که روی سطح آب شناور می‌ماند. چرا؟

به علت وجود هوا در مجاری و حبابکها (کیسه های هوایی) بافت شش سبک بوده و در سطح آب شناور می گردد.

حجم های تنفسی: مقدار هوای وارد یا خارج شده از ششها وابسته به چگونگی دم و بازدم

اندازه گیری حجم های تنفسی با دستگاه **اسپیرومتر** (دم سنج)
 نمودار رسم شده از دم و بازدم توسط اسپرومتر ← **اسپیروگرام** (دم نگاره)
 تحلیل اسپروگرام ← تشخیص بیماریهای شش

حجم جاری: مقدار هوای وارد شده در یک دم عادی یا خارج شده در یک بازدم عادی **500 ml**

حجم تنفسی در دقیقه: حاصلضرب حجم جاری در تعداد تنفس در دقیقه (بزرگسالان ۱۲-۱۶ دفعه و کودکان ۲۰-۳۰ دفعه)

حجم ذخیره دمی: مقدار هوایی که پس از یک دم معمولی با یک دم عمیق می توان به ششها وارد کرد **3000 ml**


حجم ذخیره بازدمی: مقدار هوایی که پس از یک بازدم معمولی با یک بازدم عمیق می توان از ششها خارج کرد **>1000 ml**

حجم باقیمانده: مقدار هوای باقیمانده در ششها که نمی توان آن را خارج کرد حتی بعد از بازدم عمیق **>1000 ml**
دارای اهمیت: ۱- در باز ماندن حبابکها ۲- امکان تبادل گازها در فاصله بین دو تنفس

هوای مرده: بخشی از هوای دمی که در بخش هادی دستگاه تنفس می ماند و وارد مبادله نمی شود. **150 ml**

ظرفیت حیاتی: مقدار هوایی است که پس از یک دم عمیق، با یک بازدم عمیق می توان از ششها خارج کرد
حجم جاری + ذخیره دمی + ذخیره بازدمی
<5000 ml

ظرفیت تام: حداکثر مقدار هوایی که ششها می توانند در خود جای دهند
ظرفیت حیاتی + حجم باقیمانده
6000 ml



شکل ۱۵- دم سنج و دم نگاره. مقدار حجمها در فرد سالم، به سن و جنسیت او بستگی دارد.


ظرفیت شش های افراد مختلف مساوی نیست. با ساختن دستگاهی مانند شکل زیر، می توانید گنجایش شش های خود و هم کلاسی هایتان را اندازه بگیرید. گنجایش ظرف وارونه، حداقل باید پنج لیتر باشد. در

ابتدا، ظرف را تا گردن از آب پر و سپس در تشت وارونه کنید.

ابتدا نفس بسیار عمیقی بکشید و بعد تا جایی که می توانید در لوله فوت کنید. هنگام فوت کردن بینی خود را بگیرید.

۱- آیا عددی که در اینجا نشان داده می شود، ظرفیت واقعی شش های شماست؟ دلیل بیاورید.

۲- چگونه می توانید به کمک این دستگاه، مقدار هوای دم و بازدم خود را نیز اندازه بگیرید؟



۱- عدد حاصل ظرفیت واقعی را نشان نمی دهد زیرا همیشه بین نیم تا یک لیتر هوا در شش ها باقی می ماند.

۲- کافی است با اندکی تمرین از طریق لوله عمل دم (به تنهایی) انجام داده شود . بدیهی است که عمل بازدم نیز معادل دم خواهد بود.

حنجره: محل قرارگیری پرده های صوتی که حاصل چین خوردگی مخاط به سمت داخل اند.



انجام تکلم



ارتعاش پرده های صوتی با هوای بازدمی
واژه سازی به وسیله لبها و دهان (زبان و دندانها)
و کنترل مراکز عصبی تکلم

واکنش عطسه و سرفه






ورود ذرات خارجی یا گازهای نامطلوب به مجاری تنفسی

خروج هوا با فشار همراه با مواد خارجی از راه دهان (سرفه) و بینی و دهان (عطسه)



مصرف دخانیات
از بین رفتن سلولهای مژکدار مخاط تنفسی- سرفه های مکرر برای بیرون راندن مواد خارجی (راه موثرتر)








رسیدن دستور انقباض (از مرکز تنفس در بصل النخاع) توسط سلولهای عصبی حرکتی به ماهیچه دیافراگم و بین دنده ای خارجی  انقباض ماهیچه های دیافراگم و بین دنده ای خارجی  آغاز دم


با اتمام دم و بازگشت ماهیچه ها به استراحت و کشسانی ششها  انجام بازدم (غیرفعال و بدون پیام عصبی)

عوامل موثر در تنظیم تنفس (مدت زمان و توقف دم):

۱- مرکز دیگر تنفس در پل مغز  اثر بر مرکز تنفس در بصل النخاع  تنظیم مدت زمان دم و خاتمه دم

۲- پر شدن بیش از حد ششها  کشیده شدن ماهیچه های صاف دیواره نایژه ها و نایژکها (خطرناک بودن با کشیدگی بیش از حد)  ارسال پیام از این ماهیچه ها به مرکز تنفس در بصل النخاع  توقف دم

۳- افزایش CO2  اثر بر مرکز تنفس در بصل النخاع  افزایش آهنگ تنفس

۴- حساس بودن گیرنده های موجود در سرخرگ آئورت و سرخرگهای ناحیه گردن (خونرسانی به سر و مغز) به کاهش اکسیژن  ارسال پیام به بصل النخاع


محرك مهم برای نفس کشیدن **دفع CO2** است نه نیاز سلولها به اکسیژن

در صورت **افت شدید و خطرناک اکسیژن**  جذب اکسیژن محرك مهمتر تنفس می باشد.




مراکز
تنفسی

بصل مغزی
بصل النخاع




پیام عصبی مربوط به انقباض ماهیچه ها



پیام عصبی مربوط به افزایش کربن دی اکسید

پیام عصبی مربوط به کاهش اکسیژن



گیرنده های اکسیژن

نیوز

سامانه اخبار و اطلاع رسانی


تبادل مستقیم گازها بین سلولها و محیط : در ۱- تک سلولیهها ۲- جانورانی که همه سلولهایشان در تماس با محیط است مثل کرمهای پهن یا هیدر آب شیرین

۱- تنفس نایدیسی در بی مهرگان خشکی زی مانند حشرات و صدپایان

شامل لوله های منشعب و مرتبط به نام نایدیس که با کیتین مفروش شده اند. ارتباط با خارج از طریق منافذ تنفسی سطحی بدن که در ابتدای نایدیس قرار دارد. انشعابات پایانی: بن بست- فاقد کیتین و دارای مایع تبادلات گازی فاصله میکرونی نایدیسهای انتهایی تا یاخته ها ← انتشار گازها بدون شرکت دستگاه گردش مواد در انتقال گازها



شکل ۲۰- تنفس از طریق انتشار در تک یاخته ای ها و هیدر



شکل ۲۱- تنفس نایدیسی

۲- تنفس پوستی


در بی مهرگان مثل کرم خاکی:
زندگی در محیط مرطوب
شبکه مویرگی فراوان در زیر پوست

کمک به تبادلات گازی در خاک

در مهره داران شش دار:
لاک پشت آبی، سمندر های شش دار و مار های آبی
نقش کمکی در تبادلات گازی

در دوزیستان:

بیشتر تنفس از طریق پوست (ساده ترین ساختار تنفسی در مهره داران)
داشتن شبکه مویرگی یکنواخت و وسیع در زیر پوست
وجود ماده مخاطی لغزنده برای رطوبت پوست




شکل ۲۲- تنفس پوستی



۳- تنفس آبششی

ساده ترین آبشش در ستاره دریایی به صورت برجستگی های کوچک و پراکنده پوستی



در سایر بی مهرگان قرارگیری آبشش ها در نواحی خاص بدن (مانند آبشش خرچنگها که در اتاقک های خاص قرار دارد یا در آبشش پایان مثل میگو، آرتمیا و دافنی)



آبشش خارجی: که بیرون زده است - در لارو تمام دوزیستان و برخی ماهیها

آبشش داخلی: کارآمدتر- تبارل گازها از طریق سطوح آبششی اجزای آبشش:





سرخرگ ورودی و خروجی
کمان آبششی
خار آبششی

رشته آبششی (از اجتماع تیغه های حاوی مویرگها جهت تبادل گازها)

جهت حرکت خون در مویرگ برخلاف جهت حرکت آب جهت تبادل بهتر گازها






۴- تنفس ششی

در بی مهرگان خشکی زی مثل حلزون و لیسه (نرم تن شکم پا)

وجود ساز و کار تهویه ای در اکثر جانداران: برقرار شدن جریان پیوسته ای از هوای تازه در مجاورت سطوح تنفسی (سطح مبادله گازها)

تنفس ششی با پمپ فشار مثبت: در دوزیستان و برخی خزندگان

در قورباغه: راندن هوا با فشار به ششها با کمک عضلات دهان و حلق (شبیه قورت دادن)



تنفس ششی با مکش حاصل از فشار منفی: در پرندگان، پستانداران و بیشتر خزندگان
ایجاد فشار هوایی کمتر از فشار هوای جو در ششها

در پرندگان: نیاز به اکسیژن بیشتر برای تامین انرژی پرواز
کارایی بالای تنفسی با داشتن کیسه های هوادار

فایده کیسه های هوادار (۹ عدد): سبک کردن، خنک کردن به جای عرق و در اختیار بودن هوای تازه برای سطوح تنفسی

فرآیند تنفس در پرندگان

شامل دو مرحله است: بدین معنا که هوای ورودی در چرخه اول (قرمز تیره) با گذراندن دوچرخه از دم و بازدم از دستگاه تنفسی پرنده عبور و در نهایت خارج می شود.

هر چرخه شامل یک دم و بازدم است:

دم: ورود ۷۵٪ هوای تازه از نای به کیسه های عقبی و ۲۵٪ به ششها- ورود هوای تهویه شده قبلی از ششها به کیسه های جلویی ← کیسه ها پر از هوا هستند


بازدم: خروج هوا از کیسه های عقبی به سمت ششها جهت تهویه - خروج هوا از کیسه های جلویی به سمت نای ← کیسه ها خالی از هوا هستند

نتیجه: ششها طی دم و بازدم همواره دارای هوای تازه برای تهویه و تبادل با خون هستند.

نکته: با توجه به شکل ششهای پرنده فاقد حبابک (کیسه هوایی) بوده و دارای لوله هایی موازی است.

چرخه اول


چرخه دوم




بازدم



دم



بازدم





جزوه های بیشتر (کلیک کنید) :

گام به گام رایگان دهم | | نمونه سوال دهم | | جزوه آموزشی دهم

جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.



ابتدایی

اول ✓ دوم ✓ سوم ✓ چهارم ✓ پنجم ✓ ششم ✓

متوسطه اول

هفتم ✓ هشتم ✓ نهم ✓

متوسطه دوم

دهم ✓ یازدهم ✓ دوازدهم ✓