


کد کنترل



622A

622

A

صبح جمعه

۹۷/۱۲/۳

دفترچه شماره (۱)



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود»
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمتر کز) – سال ۱۳۹۸

رشته اینمنی‌شناسی – کد (۲۷۱۸)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سوال: ۹۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: اینمنی‌شناسی و سرم‌شناسی – باکتری‌شناسی اختصاصی و بیماری‌ها – ویروس‌شناسی و بیماری‌ها – قارچ‌شناسی و بیماری‌ها	۹۰	۱	۹۰

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

حق جا به تکریر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) بس از برگزاری آزمون، برای تمام افراد مجاز نباشد و با متخلفین برای مقررات و قرار می‌شود.

۱۳۹۸

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

..... با شماره داوطلبی در جلسه این آزمون شرکت می‌نمایم.

امضا:

--

- ۱ کدام گزینه در مورد ماکروفاژهای M2 صحیح است؟
- تحت تأثیر انترفرون گاما نیتریک اکساید تولید می‌کنند.
 - در آماں دخالت دارند، و به ترمیم بافت کمک نمی‌کنند.
 - در آماں دخالت ندارند، اما به ترمیم بافت کمک می‌کنند.
 - تحت تأثیر انترفرون بتا نیتریک اکساید تولید می‌کنند.
- ۲ کدامیک از پروتئین‌های زیر C₃ - Convertase مسیر کلاسیک کمپلمان است؟
- | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| C ₄ b ₃ b (۴) | C ₄ bBb (۳) | C ₄ b ₂ b (۲) | C ₃ bBb (۱) |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|
- ۳ کدامیک از عوامل زیر در تنظیم کمپلمان نقش ایفا می‌کند؟
- | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (۱) فاکتور H | (۲) فاکتور P | (۳) فاکتور B | (۴) فاکتور D |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
- ۴ کدام سایتوکاین در دفاع در برابر باکتری «مايكوباكتریوم بوس» نقش مهم‌تری دارد؟
- | | | | |
|------------------|----------|------------------|----------|
| INF γ (۴) | IL-5 (۳) | TNF α (۲) | IL-4 (۱) |
|------------------|----------|------------------|----------|
- ۵ لیستریا مونوسایتوز ن با چه مکانیسمی از تخریب خود در داخل سلول‌های بیگانه خوار ممانعت می‌کند؟
- مقاومت نسبت به عوامل ضد میکروبی
 - ممانعت از آزاد شدن محتويات فاگولیزوزوم
 - فرار از فاگولیزوم - لیزوزوم
- ۶ کدام کموکاین‌ها توسط سلول‌های دندریتیک مستقر در عقده لنفاوی باعث مهاجرت و ورود لنفوسيت‌های B و T از بافت‌های اولیه لنفاوی به عقده لنفاوی می‌گردند؟
- | | |
|-----------------|-----------------|
| CC21&CC22 (۲) | CCL21 (۱) |
| CCL18&CCL19 (۴) | CCL8&CXCL13 (۳) |
- ۷ مهم‌ترین منبع ترشح کننده انترفرون گاما (IFN- γ) در عفونت‌های تک یاخته‌ای در سیستم ایمنی ذاتی کدام سلول‌ها هستند؟
- | | | | |
|---------|--------|-----------------|---------------|
| CTL (۴) | NK (۳) | Macrophages (۲) | Dendritic (۱) |
|---------|--------|-----------------|---------------|
- ۸ همه ژن‌های MHC از ویژگی‌های زیر برخوردارند، به‌جز:
- | | |
|------------------------------|--------------------|
| (Monogeny) (۲) | (Codominant) (۱) |
| (Heterozygote advantage) (۴) | (Polymorphism) (۳) |
- ۹ کدامیک از گیرندهای Fe آنتی‌بادی بر روی لنفوسيت B بیان می‌شود؟
- | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Fc ϵ RII (۴) | Fc ϵ RI (۳) | Fc γ RIII (۲) | Fc γ RI (۱) |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
- ۱۰ کدامیک از فاکتورهای رونوشت‌برداری زیر نقش اصلی در تکامل سلول‌های Regulatory T cells دارند؟
- | | | | |
|-----------|------------|-----------|-----------|
| T-bet (۴) | GATA-3 (۳) | Foxp3 (۲) | STAT6 (۱) |
|-----------|------------|-----------|-----------|

- ۱۱ در بیماری‌های انگلی از نوع تک یاخته‌ای درون سلولی، کدام زیر رده لنفوسيت‌های T به همراه کدام سایتوکاين نقش اصلی را بر عهده دارند؟
- (۱) سلول‌های CTL و سایتوکالین α -TNF
 - (۲) سلول‌های Th2 و سایتوکالین IL-4
 - (۳) سلول‌های Th1 و سایتوکالین γ -IFN
 - (۴) سلول‌های Treg و سایتوکالین β -TGF
- ۱۲ در بیماری‌های انگلی کرمی، کدام زیر رده لنفوسيت‌های T به همراه کدام سایتوکالین نقش اصلی را بر عهده دارند؟
- (۱) سلول‌های Treg و سایتوکاين‌های β -TGF
 - (۲) سلول‌های CTL و سایتوکاين‌های γ -IFN
 - (۳) سلول‌های Th1 و سایتوکاين‌های γ -IL-2
 - (۴) سلول‌های Th2 و سایتوکاين‌های β -IL4, γ -IL-5
- ۱۳ شناسایی ساختارهای پادگنی پلی ساکاریدی پاتوژن‌ها در اینمنی ذاتی توسط کدام ملکول (ها) صورت می‌پذیرد؟
- (۱) TLR4
 - (۲) TLR2
 - (۳) هترودايمير TLR2:TLR4
 - (۴) MD-2 به همراه مولکول‌های CD14 و CD2
- ۱۴ مکانیسم مولکولی اثر هیدروکسید آلومینیم (Alum) که به عنوان ادجوانت در اکثربت واکسن‌ها به کار می‌رود چیست؟
- (۱) تحریک گیرنده‌های TLR
 - (۲) تحریک آنتی بادی‌ها
 - (۳) تحریک سایتوکانی‌ها
 - (۴) تحریک گیرنده‌های اینفلاماژوم اینمنی ذاتی
- ۱۵ سندروم پلی آندوکرین خود اینمن حاصل نقص در کدام زن است؟
- (۱) AIRF
 - (۲) TRIF
 - (۳) AP-1
 - (۴) NFkB
- ۱۶ پدیده ADCC در کدام از دیاد حساسیت رخ می‌دهد؟
- (۱) از دیاد حساسیت نوع IV
 - (۲) از دیاد حساسیت نوع III
 - (۳) از دیاد حساسیت نوع II
 - (۴) از دیاد حساسیت نوع I
- ۱۷ در گاو کدام یک از ارگان‌های زیر در ابتدای تولد محل تکامل لنفوسيت‌های B می‌باشد؟
- (۱) لنفاوی
 - (۲) مغز استخوان
 - (۳) پلاک‌های پایرایلئومی
 - (۴) پلاک‌های پایرژوزنومی
- ۱۸ از سایتوکاين‌های زیر کدام در تبدیل Th به Th1 می‌تواند نقش داشته باشد؟
- (۱) IL₁₂
 - (۲) IL₁₀
 - (۳) IL₆
 - (۴) TLR₁₂
- ۱۹ کدام گزینه صحیح است؟
- (۱) پیتیدهای پلی مرف ویروس برای تهیه واکسن مناسبند.
 - (۲) پیتیدهای حراست شده ویروس برای تهیه واکسن مناسبند.
 - (۳) اجرام کشته اینمنی سلولی را بهتر تحریک می‌کنند.
 - (۴) پیتیدهای کونژوگه (متصل به کربوهیدرات) اینمنی سلولی را بهتر تحریک می‌کنند.
- ۲۰ یاخته‌های اپتیلیال تحت استرس و یا آلوده به عفونت توسط کدام یاخته‌ها از بین می‌روند؟
- (۱) T α/β
 - (۲) Tdth
 - (۳) Ts
 - (۴) T γ/δ
- ۲۱ برای تحریک اختصاصی یاخته TCD8 پادگن باید توسط کدام کلاس MHC عرضه شود؟
- (۱) ۱ و ۳
 - (۲) ۲
 - (۳) ۱
 - (۴) ۴
- ۲۲ TLR1 در کجا قرار دارد و لیگاند آن در کجا است؟
- (۱) غشاء سلول - لیپوپروتئین باکتری
 - (۲) آندوزوم - LPS
 - (۳) آندوزوم - CpG DNA
 - (۴) غشاء سلول - CpG DNA

- ۲۳- کدام مولکول باعث اتصال لنفوسيت‌های T به آندوتلیوم عروق می‌شود؟
- CD207 (۴) CD133 (۳) CD107 α (۲) CD134 (۱)
- ۲۴- مسیر MBL عامل مکمل با فعال شدن کدام جزء آغاز می‌شود؟
- MAC (۴) Clqrs (۳) C2 (۲) C3 (۱)
- ۲۵- کدام مولکول در اتصال لمفوسيت T به یاخته عرضه کننده پادگن نقش دارد؟
- CD28 (۴) CD21 (۳) CD4 (۲) CD3 (۱)
- ۲۶- کدام زیرجمعیت سلولی در تیموس تحت تأثیر فرایند گزینش منفی قرار می‌گیرد؟
- CD $_{\gamma}^{+}$ CD $_{\delta}^{+}$ (۴) CD $_{\epsilon}^{+}$ CD $_{\lambda}^{-}$ (۳) CD $_{\epsilon}^{-}$ CD $_{\lambda}^{+}$ (۲) CD $_{\epsilon}^{-}$ CD $_{\delta}^{-}$ (۱)
- ۲۷- در مورد جهت‌گیری پاسخ لنفوسيت‌های T به سمت TH $_1$ یا TH $_2$ کدام گزینه صحیح است؟
- (۱) عدم حضور IL-12 موجب بروز پاسخ TH1 می‌شود.
 (۲) حضور IL-12 موجب بروز پاسخ TH2 می‌شود.
 (۳) حضور IL-12 تأثیری در جهت‌گیری TH1/TH2 ندارد.
 (۴) حضور IL-12 موجب بروز پاسخ TH1 می‌شود.
- ۲۸- کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد مسیر Fas پاسخ ایمنی سلولی صحیح نیست؟
- (۱) توسط سلول‌های Tc و Nk اعمال می‌شود.
 (۲) باعث القای آپاپتوز در سلول هدف می‌شود.
 (۳) نقش اصلی در کنترل سلول‌های T خود واکنشگر دارد.
 (۴) مهم‌ترین مسیر ایمنی سلولی در دفاع در برابر ویروس‌ها است.
- ۲۹- کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد مولکول‌های MHC-I صحیح است؟
- (۱) آنتی‌ژن‌های ویروسی را به سلول‌های Tc عرضه می‌کند.
 (۲) آنتی‌ژن‌های باکتریایی را به سلول‌های Tc عرضه می‌کند.
 (۳) آنتی‌ژن‌های ویروسی را به سلول‌های Th عرضه می‌کند.
 (۴) آنتی‌ژن‌های باکتریایی را به سلول‌های Th عرضه می‌کند.
- ۳۰- کدامیک از گیرنده‌های TLR زیر مسئول شناسایی ssRNA ویروسی است؟
- TLR9 (۴) TLR3 (۳) TLR7 (۲) TLR1 (۱)
- ۳۱- در یک گاو درگیر به Hay fever احتمال افزایش کدامیک از مولکول‌های زیر در بدن کمتر است؟
- (۱) IL-4 در خون
 (۲) IgE در خون
 (۳) Fc ϵ R در سطح پلاسمما سل‌ها
- ۳۲- کدامیک از TLR زیر Endosomal هستند؟
- TLR4 (۴) TLR7 (۳) TLR6 (۲) TLR5 (۱)
- ۳۳- کدام گروه از سلول‌های دندرتیک (DC) قادر به تولید انتروفرون‌های تیپ یک و سایتوکین‌های پیش آماسی می‌باشد؟
- Conventional DC (۲)
 Plasmacytoid DC (۴)
- ۳۴- کمپلکس حمله به غشا (MAC) در سیستم کمپلان توسط کدامیک از عوامل زیر مهار می‌شود؟
- H (۴) CD35 (۳) C4BP (۲) CD59 (۱)

- ۳۵- سیگنال مهاری فعالیت لنفوسيت‌های T از اجتماع کدام مولکول‌ها بوجود می‌آید؟
 (۱) CD28-B7
 (۲) CTLA4-(Ag)-MHC
 (۳) CTLA4-B7
 (۴) C5aCD28-(Ag)-B7
- ۳۶- کدام‌یک از زیر گروه‌های لنفوسيت T در افزایش پاسخ نوتروفیل‌ها و کشتن باکتری‌های خارج سلولی نقش بیشتری دارد؟
 (۱) TH1
 (۲) TH17
 (۳) TH3
 (۴) TH2
- ۳۷- ارزیابی پروتئین‌های فاز حاد با کدام‌یک از روش‌های زیر ممکن نیست؟
 (۱) الیزا
 (۲) مانسینی
 (۳) آگلوتیناسیون غیرفعال
 (۴) آگلوتیناسیون مستقیم
- ۳۸- کدام‌یک از شرایط زیر سبب تشکیل شبکه کاذب آنتی‌ژن و آنتی‌بادی می‌شود؟
 (۱) pH قلیایی
 (۲) فروزنی میل ترکیبی آنتی‌بادی
 (۳) فروزنی میزان کمپلمان سرم
 (۴) فروزنی میزان آنتی‌بادی
- ۳۹- کدام‌یک از داروهای سرکوب‌گر اینمنی از ارسال پیام IL2 جلوگیری می‌کند؟
 (۱) آزادوپرین
 (۲) راپامایسین
 (۳) سیکلوسپورین
 (۴) کورتیکواستروئید
- ۴۰- کدام‌یک از زیر گروه‌های لنفوسيت B در پاسخ ضد آنتی‌ژن‌های بلی ساکاریدی حفره صفاقی دارای نقش است؟
 (۱) B1
 (۲) B2
 (۳) Follicular B
 (۴) Marginal zone B
- ۴۱- پاکسازی نامناسب مجتمع‌های اینمن از جریان خون با نقص در کدام ژن رخ می‌دهد؟
 (۱) FasL
 (۲) C4
 (۳) NOD-2
 (۴) AIRE
- ۴۲- سندروم لنفوسيت برهنه حاصل کدام‌یک از موارد زیر است؟
 (۱) عدم بیان MHC I
 (۲) جهش در MHC II
 (۳) عدم بیان MHC II
 (۴) جهش در MHC I
- ۴۳- در شرایط برخورد لنفوسيت B بالغ با آنتی‌ژن‌های خودی کدام مورد رخ می‌دهد؟
 (۱) آپوپتوز
 (۲) آنزی
 (۳) گزینش منفی
 (۴) ویرایش گیرنده
- ۴۴- ناحیه سیتوپلاسمی کدام‌یک از گیرنده‌های Fc آنتی‌بادی دارای ITIM است؟
 (۱) FcγRI
 (۲) FcγRIIa
 (۳) FcγRIIb
 (۴) FcγRIII
- ۴۵- مجتمع فعال‌سازی لنفوسيت B در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟
 (۱) CR1, CD21, D81, Igβ, Igα
 (۲) CR2, CD19, D81, CD3
 (۳) CR2, CD19, D81, Igβ, Igα
 (۴) CR1, CD21, D81, CD3
- ۴۶- کدام‌یک از بیماری‌های زیر حاصل از دیاباد حساسیت نوع سه نمی‌باشد؟
 (۱) بیماری سرمی
 (۲) تب روماتیسمی
 (۳) واکنش آرتوس
 (۴) لوپوس اریتروماتوز سیستمیک
- ۴۷- علت اصلی رد پیوند فوق حاد کدام است؟
 (۱) فعال شدن لنفوسيت‌های B
 (۲) حضور آنتی‌بادی‌های پیش ساخته در گیرنده
 (۳) فعال شدن سلول‌های NK
- ۴۸- پاکسازی مجتمع آنتی‌ژن و آنتی‌بادی از جریان خون با واسطه کدام ملکول انجام می‌شود؟
 (۱) C4BP
 (۲) MBL
 (۳) CR2
 (۴) CR1

- ۴۹- کاهش بیان مولکول‌های Fas و CD28 به ترتیب سبب کدام دسته از بیماری‌ها می‌گردد؟
 ۱) خود ایمن - نقص ایمن
 ۲) نقص ایمن - نقص ایمن
 ۳) خود ایمن - خود ایمن
 ۴) نقص ایمن - خود ایمن
- ۵۰- عدم پاسخ ایمنی در عفونت دوران ابتدایی جنینی و عفونت مزمن انگلی در بزرگسالان به ترتیب چگونه است؟
 ۱) اختصاصی - اختصاصی
 ۲) غیر اختصاصی - غیر اختصاصی
 ۳) غیر اختصاصی - غیر اختصاصی
 ۴) اختصاصی - غیر اختصاصی
- ۵۱- علائم دانه‌دار شدن غیرطبیعی نوتروفیل، پوشش کمرنگ بدن، خونریزی غیرمعمول متعاقب زخم، کاهش تعداد پلاکت در کدام بیماری رخ می‌دهد؟
 ۱) سندروم چدیاک هیگاشی
 ۲) اتاکسی تلانژکتازی
 ۳) کمپود تیروزین کیتاز بروتون
 ۴) سندروم دی جرج
- ۵۲- غلظت کدام یک از سیتوکاین‌ها در بافت‌های مخاطی بیشتر است؟
 ۱) IL1
 ۲) TGFβ
 ۳) IFNγ
 ۴) TNFα
- ۵۳- دلیل بروز گلومرولونفرویت متعاقب عفونت استریتوکوکوس پنومونیه چیست؟
 ۱) تقلید مولکولی باکتری
 ۲) رخداد ازدیاد حساسیت نوع ۲
 ۳) ازدیاد حساسیت نوع ۳
 ۴) بروز اپی‌توب‌های پنهان در میزبان
- ۵۴- سندروم افزایش IgM به دلیل نقص در کدام واکنش زیر رخ می‌دهد؟
 ۱) CD40-CD40L
 ۲) CD80-CD28
 ۳) B7-CTLA4
 ۴) B7-CD28
- ۵۵- یک نقص ژنتیکی منجر به عدم بیان گیرنده سلکتین E و P شده است؛ کدام حالت رخ می‌دهد؟
 ۱) عرضه نامناسب آنتی‌زن
 ۲) ناتوانی در بیگانه خواری سلول‌های دندربیتیک
 ۳) عدم ورود لنفوسیت‌ها به عقده لنفاوی
 ۴) ناتوانی لنفوسیت‌ها در مهاجرت به بافت
- ۵۶- در حین انتقال خون، ریزش مخاط و افزایش تعداد تنفس و ضربان قلب رخ داده است، کدام نوع ازدیاد حساسیت و به چه دلیل رخ داده است؟
 ۱) نوع چهار - پاسخ T خاطره
 ۲) نوع دو - واکنش همولیتیک حاد
 ۳) نوع سه - اتصال پادتن موجود و ایجاد کمپلکس ایمن
- ۵۷- در موارد رخداد شوک آنافیلاکسی در سگ، کدام اندام زیر بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرد؟
 ۱) کبد
 ۲) روده
 ۳) قلب
 ۴) شش
- ۵۸- ویرایش گیرنده لنفوست B پرندگان در کدام اندام زیر انجام می‌شود؟
 ۱) طحال
 ۲) مغز استخوان
 ۳) بورس فابریسیوس
 ۴) پلاک پایر ایلنوم
- ۵۹- مکان تولید و بلوغ لنفوسیت‌های B در نشخوارکنندگان به ترتیب کدام است؟
 ۱) مغز استخوان - مغز استخوان
 ۲) پلاک پایر ایلنوم - مغز استخوان
 ۳) مغز استخوان - پلاک پایر ایلنوم
 ۴) طحال - مغز استخوان
- ۶۰- کدام گزینه در مورد پاسخ لنفوسیت B به آنتی‌زن‌های پروتئینی صحیح است؟
 ۱) پاسخ مستقل از تیموس است.
 ۲) تنها IgG و IgM تولید می‌شود.
 ۳) پردازش آنتی‌زن رخ نمی‌دهد.
 ۴) اولین پادتن ایجادی، IgM است.
- ۶۱- در آزمایش ۲-مرکاپتواتانول (2ME) برای تشخیص بروسلوز کدام ایمنوگلوبولین از بین برده می‌شود؟
 ۱) IgE
 ۲) IgA
 ۳) IgG
 ۴) IgM

- ۶۲- کدام گزینه در خصوص نتایج منفی کاذب تست توبرکولین غلط است؟
- برخورد با مایکوباکتریومهای غیررسمی حساسیت دام به تست توبرکولین را کم می‌کند.
 - در سل پیشرفتی ممکن است نتیجه تست توبرکولین منفی باشد.
 - تا حدود ۲ماه پس از تست توبرکولین نتیجه تست توبرکولین منفی است.
 - پس از زایمان تا مدتی تست توبرکولین حساسیت لازم را ندارد.
- ۶۳- کدام عوامل در حدت لیستریامونوسیتوز در پارگی غشاء فاگوزوم و خروج باکتری از فاگوزوم نقش دارند؟
- لیسته یولیزین O و اینترنالین C
 - لیسته یولیزین D و فسفولیپاز C
 - کدام بیماری در اسب ممکن است منجر به بروز چشم درد دوره‌ای گردد؟
 - لپتوپسیروز
 - مشمشه
 - گورم
 - شبه‌مشمشه
- RB51 (۴)
- ReV.1 (۳)
- K452 (۲)
- S19 (۱)
- ۶۴-
- ۶۵-
- ۶۶-
- ۶۷-
- ۶۸-
- ۶۹-
- ۷۰-
- ۷۱-
- ۷۲-
- ۷۳-
- ۷۴-
- (۱) فسفولیپاز C و اینترنالین A
- (۲) کدام یک از واکسن‌های بروسلاز به صورت باکترین است؟
- (۳) RB51 (۱)
- (۴) ReV.1 (۲)
- (۱) در روند پیشرفت یک بیماری عفونی کدام یک از موارد زیر صحیح است؟
- (۱) مرحله کمون - مرحله مقدماتی - مرحله رکود - مرحله تهاجم - مرحله نقاہت
- (۲) مرحله کمون - مرحله مقدماتی - مرحله تهاجم - مرحله نقاہت - مرحله رکود
- (۳) مرحله کمون - مرحله مقدماتی - مرحله تهاجم - مرحله رکود - مرحله نقاہت
- (۴) مرحله کمون - مرحله تهاجم - مرحله مقدماتی - مرحله رکود - مرحله نقاہت
- کدام مورد عامل حدت باکتری بروسلا آبورتوس به شمار می‌رود؟
- (۱) اگزوتوكسین
- (۲) پروتئین‌های غشاء خارجی
- (۳) لیپوپلی ساکارید زنجیر جانی O
- (۴) توانایی باکتری در استفاده از قند اریتریتول
- کدام یک از گونه‌های بروسلا برای رشد به گاز CO_2 نیاز دارد؟
- (۱) بروسلا آبورتوس
- (۲) بروسلا ملی تنیس
- (۳) بروسلا سوئیس
- (۴) بروسلا کائیس
- باکتری سالمونولا معمولاً ابتدا به چه قسمتی از روده نفوذ می‌نماید؟
- (۱) Brush border سلول‌های ایلئوم و قولون
- (۲) ماکروفازهای موجود در مخاطات ایلئوم
- (۳) Brush border سلول‌های رژنوم و ایلئوم
- (۴) ماکروفازهای موجود در مخاطات رژنوم
- کدام یک از ویروس‌های زیر واجد ژنوم منقطع است؟
- (۱) تب برفکی
- (۲) نیپا
- (۳) تب دره ریفت
- (۴) تب بیدوام
- کدام یک از خانواده‌های زیر واجد کمترین اطلاعات ژنتیکی است؟
- (۱) کورونا ویریده
- (۲) سیرکو ویریده
- (۳) پاپیلووا وریده
- (۴) رابدو ویریده
- در کدام مورد عفونت‌های ویروسی اینمنی سلولی نقش مهم‌تری دارد؟
- (۱) پارامیکسو ویروس
- (۲) پاروا ویروس
- (۳) توگا ویروس
- (۴) پیکورناویروس
- کدام یک از عوامل ویروسی سرکوب کننده شدید میزان محسوب می‌شود؟
- (۱) پاروویروس سگ
- (۲) هاری
- (۳) برنشیت عفونی پرنده‌گان
- (۴) پاپیلوماتوز گاو

- ۷۵- کدام یک از عوامل ویروس در سیتوپلاسم هسته گنجیدگی ایجاد می‌کنند؟
 ۱) دیستمپر ۲) آله ۳) برنا ۴) لارنگوتراکیت عفونی
- ۷۶- کدام یک از ویروس‌های زیر SSRNA^+ , غشادار و هلیکال است؟
 ۱) نیل غربی ۲) پرتیونئیت عفونی گربه ۳) تورم سرخ‌گی اسب ۴) نوروالک
- ۷۷- ویروس‌های خانواده پاپیلوما به چه طریقی موجب ایجاد سرطان می‌شوند؟
 ۱) ژنوم ویروسی را در درون DNA سلولی وارد می‌نمایند.
 ۲) دارای انکوژن می‌باشند که قابلیت ایجاد سرطان را دارد.
 ۳) به عنوان گوفاکتوری برای انکوژن سلولی عمل می‌نماید.
 ۴) در سلول‌های در حال تقسیم تکثیر یافته و سه پروتئین انکوژن E5, E6, E7 را کد می‌نمایند.
- ۷۸- مخزن ویروس‌های کاذب در طبیعت، کدام حیوان است؟
 ۱) اسب ۲) خوک ۳) گربه ۴) سگ
- ۷۹- مهم‌ترین نوع آنتی بادی در دفاع ضد ویروسی، کدام مورد است؟
 ۱) خنثی کننده ۲) ایسوتین ۳) تثبیت کننده کمپلمان ۴) هماگلوبتینان
- ۸۰- محل تزریق کدام یک از عوامل ویروسی علاوه بر کیسه زرد بر روی پرده کوریوآلانتونیک می‌باشد؟
 ۱) Vaccinia ۲) IBH ۳) Pox ۴) ILT
- ۸۱- کدام یک از سایتوکاین‌ها در بیهود درماتوفیتوزیس حاد حائز اهمیت است؟
 ۱) IFN - γ , IL - ۲ ۲) TGF - β , G - CSF ۳) GM - CSF, TNF - α ۴) IL - ۱۲, IL - ۱ β
- ۸۲- در بیماری کاندیدیازیس پوستی - مخاطی مزمن کدام یک از عوامل زمینه‌ای دخالت ندارد؟
 ۱) تیموها ۲) کمبود آهن ۳) نقص در فعالیت لنفوцит‌های T ۴) اختلال در فعالیت لنفوцит‌های B
- ۸۳- قوس‌های رسوی M و H ناشی از واکنش آنتی ζ ن و آنتی بادی‌های کدام یک از عوامل قارچی است؟
 ۱) بلاستومایسین درماتیتیدیس ۲) کوکسیدیوئیدس ایمیتیس ۳) هیستوپلاسمایسین ۴) کریتپوکوکوس نوفورمنس
- ۸۴- کدام یک از محیط‌های زیر جهت تفرقی واریته نئوفورمنس و واریته گاتی کریبتوکوکوس نئوفورمنس به کار می‌رود؟
 ۱) موسی کارمن مایر ۲) گلیسین برومومیمول بلو ۳) کرسیل فست ویوله ۴) پریودیک اسید شیفت
- ۸۵- نقص در عملکرد نوتروفیل‌ها زمینه‌ساز ابتلا به کدام شکل از آسپرژیلوزیس می‌باشد؟
 ۱) آسپرژیلوزیس جلدی ۲) آسپرژیلوزیس چشمی ۳) آسپرژیلوزیس سیستمیک ۴) آسپرژیلوزیس آرژیک
- ۸۶- افزایش کدام دسته از آنتی بادی‌ها در بیماری آسپرژیلوزیس برونشی - ریوی آرژیک مشاهده می‌شود؟
 ۱) IgD, IgG ۲) IgE, IgM ۳) IgG, IgE ۴) IgD, IgM

- ۸۷- کدام نقص اینمنی موجب انتشار مخمرهای کربیتوکوکوس نتوفورمنس از ریه‌ها به داخل خون می‌شود؟
- (۱) نقص سلول‌های NK
 - (۲) نقص لنفوسيت‌های T
 - (۳) نقص سلول‌های دندريتیک
 - (۴) نقص لنفوسيت‌های B
- ۸۸- کدامیک از واکنش‌های اینمنی در بیماری درماتوفیتوزیس حاد مشاهده می‌شود؟
- (۱) واکنش آرتوس
 - (۲) واکنش التهابی اوزینوفیلی
 - (۳) ازدیاد حساسیت تأخیری
 - (۴) کاهش حساسیت تأخیری
- ۸۹- کدامیک از آنتیزن‌های گردش خون برای شناسایی آسپرژیلوزیس تهاجمی به کار می‌رود؟
- (۱) گالاکتومانان
 - (۲) گلیکولیپید
 - (۳) گالاکتوگزیلومانان
 - (۴) رامنومانان
- ۹۰- تست ایمونوپراکسیداز غیرمستقیم اساساً در تشخیص کدام بیماری قارچی کاربرد دارد؟
- (۱) هیستوپلاسموزیس
 - (۲) رینوسپوریدیوزیس
 - (۳) اسپوروتريکوزیس
 - (۴) موکورمایکوزیس





