

کد کنترل



210E

210
E

دفترچه شماره (۱)
صبح جمعه
۹۸/۱۲/۹



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.»
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمکز) – سال ۱۳۹۹

رشته بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ – کد (۲۷۰۴)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۹۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ – اصول معاینه دام – بیماری‌های متابولیک – مسمومیت دام	۹۰	۱	۹۰

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تعلیمی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مخالفین برای مقرورات رفتار می‌شود.

۱۳۹۹

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوالات و پائین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

- شایع‌ترین محل انسداد کولون در اسب کدام است؟ -۱
- Sternal flexure (۲) Pelvic flexure (۱)
Ileocecal valve (۴) Diaphragmatic flexure (۳)
- بدون توجه به نوع کولیک، نقش کدام یک از عوامل خطر زیر در ابتلا به این اختلال کم‌رنگ‌تر می‌باشد؟ -۲
- (۱) سایقه ابتلا به کولیک (۲) جنسیت (۳) تغذیه (۴) مبارزه انگلی
- کدام بیماری با التهاب حلق در اسب همراه است؟ -۳
- (۱) کلی با سیلیوزیس (۲) کراز (۳) شارین (۴) بازیوزیس
- کدام گزینه از عوامل ثانویه التهاب مری می‌باشد؟ -۴
- (۱) خوردن اسید (۲) MCF (۳) لارو هیپودرم لینه آتا (۴) مایکوتوكسین‌ها
- شکل و عملکرد کدام یک از قسمت‌های دستگاه گوارش گونه‌های دامی مختلف شبیه یکدیگر می‌باشد؟ -۵
- (۱) سکوم (۲) معده (۳) روده بزرگ (۴) روده کوچک
- کدام گزینه از نشانه‌های ابتلای گاو به سوء هضم عصب واگ نیست؟ -۶
- (۱) مدفوع کم حجم (۲) L-shape Rumen (۳) کم‌اشتهاایی دراز مدت (۴) هیپرترمی
- تجویز داروهای پاراسمپاتومیمتیک در درمان بیماری‌های گوارشی در چه مواردی می‌تواند خطرناک باشد؟ -۷
- (۱) پریتونیت (۲) اسیدوز لاکتیک شکمیه (۳) LDA (۴) سوء هضم عصب واگ
- حساس‌ترین سن گاو برای اخذ آبودگی مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس (عامل بیماری یون) کدام است؟ -۸
- (۱) یک تا دو سالگی (۲) شش ماه تا یک سالگی (۳) زیر یک ماه (۴) بیش از ۴ سالگی
- در درمان اسهال گوساله‌های نوزاد کدام در اولویت قرار دارد؟ -۹
- (۱) تجویز کورتون (۲) تجویز مواد جاذب (۳) تجویز آنتی‌بیوتیک (۴) مایع درمانی
- در بیماری‌های کبدی در مراحل حاد، چه تغییراتی به ترتیب در گلوكوز و SDH خون رخ می‌دهد؟ -۱۰
- (۱) کاهش - کاهش (۲) افزایش - افزایش (۳) کاهش - افزایش (۴) افزایش - کاهش
- به هنگام لاکتیک اسیدوزیس شکمیه، توقف حرکات شکمیه (ruminal atony) از چه محدوده‌ای از pH شروع می‌شود؟ -۱۱
- (۱) ۴,۵ (۲) ۵/۵ (۳) ۴ (۴) ۵
- مهم‌ترین شاخص آنزیمی در ارزیابی مشکلات مجاری صفراوی در دام‌ها کدام است؟ -۱۲
- ALT (۴) AST (۳) GGT (۲) ALP (۱)

- ۱۳- کدام یک از جملات زیر در رابطه با جایه جایی شیردان به چپ صحیح‌تر است؟
- (۱) جایه جایی شیردان عمدتاً در گاوهای با جثه بزرگ و با تولید بالا و کمی قبل از زایمان اتفاق می‌افتد.
 - (۲) شیردان برای این که جایه جا شود اول دچار هیپرموتیلتی و اتساع شده سپس جایه جا می‌گردد.
 - (۳) جایه جایی شیردان در گاوهای با جثه بزرگ ولی تولید بالا در ۹۰ درصد موارد کمی پس از زایمان اتفاق می‌افتد.
 - (۴) جایه جایی شیردان در گاوهای با جثه کوچک ولی تولید بالا در ۹۰ درصد موارد حدود ۲ هفته بعد از زایمان اتفاق می‌افتد.
- ۱۴- محدود شدن تو هم رفتگی روده‌ها (**Intussusception**) در نوع گاو به نوع **Enteric** چیست؟
- (۱) ذخیره چربی مزانتریک
 - (۲) حرکات ضعیف ایلئوسکال در گاو
 - (۳) شایع‌ترین بیماری سکوم در اسب کدام است؟
 - (۴) دیواره نازک مزانتر در نوع گاو
 - (۵) حرکات شدید ایلئوسکال در گاو
 - (۶) پیچ خوردگی سکوم
 - (۷) اتساع سکوم
 - (۸) بوتولیسم
 - (۹) جراحت اعصاب تاخیه حلق
- ۱۵- فلنجی حلق در کدام بیماری مشاهده نمی‌شود؟
- (۱) هاری
 - (۲) پارگی سکوم
 - (۳) انباشتگی سکوم
 - (۴) انسداد روده باریک
- ۱۶- در اسهال حاد گوساله کدام تغییرات الکترولیتی رخ می‌دهد؟
- (۱) افزایش سدیم - افزایش کلر - کاهش بیکربنات
 - (۲) کاهش سدیم - کاهش کلر - کاهش بیکربنات
 - (۳) افزایش سدیم - کاهش کلر - کاهش بیکربنات
 - (۴) کاهش سدیم - کاهش کلر - کاهش بیکربنات
- ۱۷- حداقل میزان فیر خام جیره در هفتنه‌های آخر آبستنی برای پیشگیری از بروز بیماری **LAD** چند درصد است؟
- (۱) ۱۰-۱۲
 - (۲) ۱۶-۲۵
 - (۳) ۲۰-۲۵
 - (۴) ۳۵-۴۰
- ۱۸- اگر یافته‌های آزمایشگاهی یک گاو مریض **Ketonuria** و **Ketonemia** همراه با **Normal hemogram** باشد، به کدام اختلال بیشتر مشکوک می‌شوید؟
- (۱) انسداد روده باریک
 - (۲) انباشتگی هزارلا
 - (۳) زخم شیردان
 - (۴) جایه جایی شیردان به چپ
- ۱۹- کدام یک از نشانه‌ها در **EIPH** به ندرت دیده می‌شود؟
- (۱) دیستریس تنفسی
 - (۲) سرفه
 - (۳) بلع مکرر
 - (۴) رآل‌های نایی
- ۲۰- مهم‌ترین نقش سورفاکتانت در آلوئول‌های ریه چیست؟
- (۱) افزایش فعالیت ماکروفازهای ریوی
 - (۲) کاهش کشش سطحی آلوئول‌ها
 - (۳) جلوگیری از دهیدراتاسیون سلول‌های اپیتلیال ریوی
 - (۴) گرم نگهداشت هوای دمی
- ۲۱- کدام گزینه به عنوان عامل اپیستاکسیس کشنده شناخته می‌شود؟
- (۱) Guttural pouch empyema
 - (۲) Guttural pouch neoplasm
 - (۳) Guttural pouch mycosis
 - (۴) Guttural pouch tympany
- ۲۲- فلنجی مرکز تنفس به وسیله دارو یا سموم، چه نوع آنوکسی ایجاد می‌کند؟
- (۱) Anoxic anoxia
 - (۲) Histotoxic anoxia
 - (۳) Stagnant anoxia
 - (۴) Anemic anoxia
- ۲۳- جزء کدام یک از الگوهای پاتولوژیک ریه در اسب طبقه‌بندی شده است؟
- (۱) Aspiration pneumonia
 - (۲) Interstitial Pneumonia
 - (۳) Granulomatous Bronchopneumonia
 - (۴) Fibrinous Bronchopneumonia
 - (۵) Suppurative Bronchopneumonia

- ۲۵- کم خونی، صدای های غیر طبیعی در ناحیه توپوگرافی ریه ها و هموپتازی از نشانه های بالینی و شاخص کدام بیماری در گاو است؟
- (۱) پلوروبنومونی
 (۲) هموتوراکس
 (۳) پلورزی
 (۴) ترمبوز ورید میانخالی خلفی
- ۲۶- شایع ترین تومور قلبی در دام های بزرگ کدام مورد است؟
- (۱) لنفوسارکوم
 (۲) ملانوما
 (۳) همانژیوسارکوم
 (۴) لیپوما
- ۲۷- احتمال وقوع اندوکارдیت در اسب و گاو به ترتیب در کدام دریچه قلب بیشتر است؟
- (۱) ربوی - سهلتی
 (۲) سهلتی - آئورت
 (۳) آئورت - سهلتی
 (۴) آئورت - دولتی
- ۲۸- کدام گزینه بهترین ابزار کمک تشخیص در آریتی های قلبی در دام های بزرگ است؟
- (۱) سونوگرافی
 (۲) اکوکاردیوگرافی
 (۳) فونوکاردیوگرافی
 (۴) الکتروکاردیوگرافی
- ۲۹- در گاو و اسب بالغ در حال استراحت، افزایش تعداد ضربان قلب به بیش از چند ضربه در دقیقه تاکی کار دی پاتولوژیک با منشأ قلبی محسوب می شود؟
- (۱) ۱۲۰
 (۲) ۱۴۰
 (۳) ۱۶۰
 (۴) ۱۰۰
- ۳۰- مؤثر ترین دارو در درمان شوک انافیلاکتیک کدام است؟
- (۱) کاتکولامین ها (مانند دیپرین)
 (۲) کورتیکواستروئیدها (مانند دیازمیکازون)
 (۳) آنتی هیستامین ها (مانند تریپلین آمین)
 (۴) ضد التهاب های غیر استروئیدی (مانند فلوبنیکسین)
- ۳۱- در کدام یک از اختلالات **Washing machine sound** شنیده می شود؟
- (۱) VSD
 (۲) میوکاردیت
 (۳) آندوکاردیت
 (۴) پریکاردیت
- ۳۲- کدام آریتمی در اسب فیزیولوژیک به حساب می آید؟
- (۱) Sinus arrhythmia
 (۲) Sinus arrest
 (۳) Atrial tachycardia
 (۴) Ventricular premature complex
- ۳۳- کدام دسته از علایم، نشانه درگیری سیستم وستیبو لار هستند؟
- (۱) چرخش سر، عدم تعادل، کوری مرکزی
 (۲) راه رفتن بی هدف، تکیه به دیوار، عدم تعادل
 (۳) چرخش سر، افتادگی فک، حرکت دایره ای
 (۴) چرخش سر، حرکت دایره ای، تکیه به دیوار
- ۳۴- کدام در CSF در کدام یک از بیماری ها وجود دارد؟
- (۱) آبسه مغزی
 (۲) منزیت
 (۳) ادم معزی
 (۴) هیدروسفالی
- ۳۵- کدام مورد در ضایعات **Upper motor neuron** مشاهده می شود؟
- (۱) Wasting of muscles
 (۲) Increased spinal reflexes
 (۳) Decreased tone of the limb muscles
 (۴) Absence of spinal reflexes
- ۳۶- کاهش فیلتراسیون گلومرولی در اسب منجر به و در گاو منجر به می گردد.
- (۱) هایپر کلسی - هایپر کلسی
 (۲) هایپر کلسی - هایپر کلسی
 (۳) هایپر کلسی - هایپر کلسی
- ۳۷- کدام حالت باعث افزایش موکوپروتئین ادرار و افزایش احتمال تشکیل سنگ های ادراری می شود؟
- (۱) جیره غنی از کنسانتره
 (۲) مصرف غذاهای خشبي
 (۳) کمبود ویتامین A
 (۴) جیره حاوی کلسیم زیاد

- ۳۸- مهم ترین عامل مستعد کننده برای سیستیت کدام است؟
- (۱) حضور باکتری در مثانه
 - (۲) رکود ادرار در مثانه
 - (۳) نفریت آمبولیک
 - (۴) ترومای جدار مثانه
- ۳۹- افزایش ضخامت تمام لایه‌های پوست در کدام بیماری مشاهده می‌شود؟
- | | | | |
|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| Urticaria (۱) | Pachyderma (۲) | Parakeratosis (۳) | Pityriasis (۴) |
|---------------|----------------|-------------------|----------------|
- (۱) لیمبوس داخلی
 - (۲) کانتوس جانبی
 - (۳) کانتوس داخلی
 - (۴) لیمبوس جانبی
- ۴۰- جراحات ناشی از هابرونمیازیس چشمی بیشتر در کدام قسمت بروز می‌یابد؟
- | | | |
|--------------|------------------|--|
| Impetigo (۱) | Folliculitis (۲) | |
|--------------|------------------|--|
- (۱) کدام بیماری در سطح گله مسری و قابل انتقال نیست؟
 - (۲) Urticaria
 - (۳) Mycotic Dermatitis
 - (۴) کدام مورد باعث پیتیریازیس اولیه می‌شود؟
- (۱) مسمومیت مژمن با آرسنیک
 - (۲) مسمومیت با یند
 - (۳) مسمومیت با نفتالین کلرینه
 - (۴) مسمومیت با سلتیم
- ۴۲- شایع‌ترین نئوپلاسم پوست در اسب کدام است؟
- | | | | |
|----------------|---------------|------------------------------|-------------|
| ۱) فیبروسارکوم | ۲) لنفوسارکوم | ۳) کارسنسیوم سلول‌های خاردار | ۴) سارکوئید |
|----------------|---------------|------------------------------|-------------|
- ۴۳- مهم ترین عامل مستعد کننده ابتلاء به درماتوفیتوز کدام است؟
- | | | |
|----------------|--------|-------|
| ۱) حرارت محیطی | ۲) فصل | ۳) سن |
|----------------|--------|-------|
- (۱) بالا رفتن میزان یون کلر شکمبه در کدام مورد سوء‌همضم عصب واگ مطرح است؟
 - (۲) انسداد اسفنگت پبلور
 - (۳) آکالازی اسفنگت نگاری و هزارلا
 - (۴) انسداد اسفنگت نگاری و هزارلا
- ۴۵- بالا رفتن میزان یون کلر شکمبه یافته کمکی ارزشمندی نیست
- ۴۶- در شرایط دامپوری چگونه خون شاش حاصل از هماتوری را از هموگلوبینوری تفرق می‌کنید؟
- | | | | |
|---------------|----------------|------------------|------------------|
| ۱) تهیه گسترش | ۲) نوار ادراری | ۳) تست پراکسیداز | ۴) سیدماناتاسیون |
|---------------|----------------|------------------|------------------|
- ۴۷- برای تفرقی کوری محیطی از کوری مرکزی کدام تست استفاده می‌شود؟
- | | | |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| ۱) Palpebral reflex | ۲) Menace response | ۳) Corneal reflex |
|---------------------|--------------------|-------------------|
- (۱) در کاوش مقعدی کدام بیماری، کلیه بزرگ و دردناک ملامسه می‌گردد؟
 - (۲) گلومرونفریت
 - (۳) آمیلوئیدوز
 - (۴) هیدرونفروز
- ۴۸- در کدام حیوان به طور معمول ۳ تا ۴ صدای طبیعی قلبی شنیده می‌شود؟
- | | | |
|-----------|--------|--------|
| ۱) گوسفند | ۲) اسب | ۳) گاو |
|-----------|--------|--------|
- (۱) در هنگام وقوع بحران دهیدراتاسیون کدام نشانه زودتر مشاهده می‌شود؟
 - (۲) از دست دادن الاستیسیته پوست
 - (۳) خشک شدن غشاها مخاطی
 - (۴) افزایش زمان برگشت خون به بستر مویرگی (CRT)

- ۵۱- در هنگام وارد کردن لوله معدی، احتمال ورود آن به نای در کدام دام بیشتر است؟
 ۱) گوسفند ۲) گاو ۳) اسب ۴) بز
- ۵۲- چیست و چه کاربردی دارد؟ **Back grip test**
 ۱) آزمایش چنگ ناحیه جدوگاه و برای بازرسی دستگاه تنفس
 ۲) آزمایش میله ناحیه جناغ و برای بروز نشانه درد در حیوان
 ۳) آزمایش چنگ ناحیه جدوگاه و برای بروز نشانه درد در حیوان
 ۴) آزمایش میله ناحیه جناغ و برای بازرسی شکمبه
- ۵۳- آزمایش الاستیسیتیه پوست به چه منظوری صورت می‌گیرد؟
 ۱) پی بردن به کار کرد اعصاب ۲) برآورد میزان کم آبی بدن
 ۳) مشخص کردن خونرسانی پوست ۴) پی بردن به آماں پوست
- ۵۴- دمای بدن در دام‌های اهلی، بسته به ساعت شباهه روز به چه میزان تفاوت می‌کند؟
 ۱) دو درجه سانتی گراد ۲) نیم درجه سانتی گراد
 ۳) یک درجه سانتی گراد ۴) ۲۵ سدم درجه سانتی گراد
- ۵۵- کدام جراحت پوست معادل تاول است؟
 Blister (۴) Wheal (۳) Papule (۲) Nodule (۱)
- ۵۶- اگر وضعیت ایستادن دام غیرطبیعی باشد، کدام یک از موارد زیر تغییر کرده است؟
 Posture (۲) Gait (۱)
- ۵۷- به دنبال کدام بیماری سیستمیک نفح حاد با گاز آزاد در نشخوار کنندگان رخ می‌دهد؟
 BVD-MD (۱) سوء هضم عصب واگ (۳) پلورونیومونی واگیر گوسفند و بز (۴) پلورونیومونی واگیر گوسفند و بز
- ۵۸- پایین افتادن فک و ریزش بزاق مربوط به فلنج کدام عصب است؟
 سه شاخه (۴) صورتی (۳) واگ (۲) هیپوگلوبسال (۱)
- ۵۹- بهترین محل تهیه بیوپسی روده اسب کدام است؟
 ۱) سقف رکتوم ۳۰ سانتی متر قdam اسفنگتر مقعد ۲) کف رکتوم ۲۰ سانتی متر قdam اسفنگتر مقعد
 ۳) سقف رکتوم ۱۰ سانتی متر قdam اسفنگتر مقعد ۴) کف رکتوم ۱۵ سانتی متر قdam اسفنگتر مقعد
- ۶۰- در کدام بیماری در هنگام دقه کردن ناحیه توپوگرافی ریه، صدای تیمپانیک شنیده می‌شود؟
 ۱) تومور ریوی ۲) هیدروتوراکس ۳) پنوموتوراکس ۴) ادم ریوی
- ۶۱- مقدار کافی از کدام یک برای متابولیسم کربوهیدرات‌ها ضروری می‌باشد؟
 ۱) ویتامین E ۲) ویتامین A ۳) تیامین (ویتامین B) ۴) مس
- ۶۲- کدام مورد در تفریق کتوز گاو و توکسمی آبستنی در گوسفند کمترین نقش را دارد؟
 ۱) تعداد جنین ۲) زمان بروز بیماری ۳) پاسخ به درمان ۴) تعداد زایمان
- ۶۳- کدام فاکتور در بیماری کتوز تیپ I و II به ترتیب در خون افزایش پیدا می‌کند؟
 ۱) انسولین و کتون بادی ۲) کتون بادی و اسید چرب آزاد
 ۳) اسید چرب آزاد و گلوگز ۴) گلوگز و انسولین

- ۶۴- بالا بودن فسفر و ALP و پایین بودن Ca سرم در کدام گزینه به چشم می خورد؟
 ۱) استئودیستروفی فیبروزان ۲) استئومالاسی ۳) راشیتیسم ۴) استئودیستروفی فیبروزان
- ۶۵- کدام بیماری متابولیک می تواند هم زمان با هموگلوبینوری پس از زایش رخ دهد؟
 ۱) سندروم کبد چرب ۲) تب شیر ۳) کتوزیس ۴) تنانی شیرواری
- ۶۶- قانقاریای نواحی انتهایی بدن، در کدام بیماری متابولیک موره انتظار است؟
 ۱) سندروم کبد چرب ۲) تنانی شیرواری ۳) تب شیر
- ۶۷- خوراندن کاه خرد شده و شیر پس چرخ باعث بروز کدامیک از موارد در گوساله می شود؟
 ۱) تشنج همراه با کاهش منیزیم خون ۲) تشنج همراه با کاهش کلسیم خون ۳) تشنج همراه با کاهش قندخون ۴) تشنج همراه با افزایش منیزیم خون
- ۶۸- کدام مورد فراوان ترین عامل کمبود ثانویه مس شناخته شده است?
 ۱) مولیبیدن، سولفات ۲) سولفات، بی کربنات کلسیم ۳) بی کربنات کلسیم، آهن ۴) آهن، مولیبیدن
- ۶۹- به دنبال شکل گیری کمبود مس در گاو علت رخداد Falling Disease کدام است?
 ۱) فیبروز میوکارد ۲) دمیلیناسیون نخاع ۳) نکروز عضلات اسکلتی ۴) کاهش کلسیم خون
- ۷۰- پیش آگهی کدام شکل از کمبود درمانگاهی ویتامین A در نوع گاو به دنبال درمان، خوب می باشد؟
 ۱) انسفالوپاتی و تشنج ۲) کوری مادرزادی ۳) کوری دام های جوان ۴) فلنجی
- ۷۱- مکانیسم اثر یونوفورها در درمان گتوز کدام است?
 ۱) افزایش تولید استات ۲) افزایش تولید پروپیونات ۳) تخلیه چربی از کبد ۴) تامین ویتامین B
 برای آگاهی از وضعیت منیزیم در یک گله کدام نمونه برای ارسال به آزمایشگاه مناسب تر است?
 ۱) مدفعه ۲) ادرار ۳) خون ۴) مایع معزی نخاعی
- ۷۲- مشاهده میوپاتی در عضلاتی که در معرض ایسکمی حاصل از زمین گیری و فشار نبوده اند حکایت از کدام مورد می کند؟
 ۱) هیپوفسفاتمی مزمن ۲) هیپوکلسیمی حاد ۳) هیپوکالمی حاد ۴) هیپومنیزیمی مزمن
- ۷۳- راه رفتن بی هدف، تشنجات تونیک کلونیک، فشار سر به اشیای ثابت، کوری و پاسخ مثبت مردمک به نور در نشخوار کنندگان با یافته های کدام مورد همخوانی بیشتری دارد؟
 ۱) شکل آنسفالوپاتی حاصل از کمبود ویتامین A ۲) آتاکسی آنژئوتیک حاصل از کمبود مس ۳) نکروز قشر مغز حاصل از کمبود تیامین ۴) تنانی حاصل از کاهش غلظت منیزیم خون
- ۷۴- تجویز کدام را در درمان رابdomیولیز اسبسانان مناسب نمی دانید؟
 ۱) بی کربنات سدیم ۲) داروهای ضد درد ۳) داروهای ضد التهاب ۴) محلول های الکترولیتی
- ۷۵- لاغری سریع گاو تازه زا، ستاره نگری، لرزش عضلانی سر و گردن و اسهال زرد نگ از نشانه های ابتلا به کدام مورد است؟
 ۱) هیپومنیزیمی ۲) هیپوفسفاتمی ۳) کتوز ثانویه ۴) سندروم کبد چرب
- ۷۶- بیماری کبد سفید با کمبود کدام مورد در گوسفند در ارتباط می باشد؟
 ۱) سلتیم ۲) روی ۳) کبالت ۴) مس
- ۷۷- جهمت کاهش میزان غلظت اسیدهای چرب آزاد در بیماری های پرلیپمیا اسب از چه دارویی استفاده می شود؟
 ۱) تیروکسین ۲) هپارین ۳) دگراماتازون ۴) گلوکاگون

- ۷۹- تب شیر در کدام نژاد گاو بیشتر دیده می‌شود؟
- (۱) هرفورد (۲) هلشتاین (۳) جرزی (۴) زیو(هنگ)
- ۸۰- برای پیش‌گیری از بروز تب شیر در گله، افزایش سطح کدام مورد را در جیره پیشنهاد می‌دهید؟
- (۱) کاتیون (۲) فسفر (۳) آئیون (۴) کلسیم
- ۸۱- آربتمی قلبی از مشخصات کدام مسمومیت می‌باشد؟
- (۱) تاج خروس (۲) سورگوم (۳) خرزهره (۴) شاهپسند درختی
- ۸۲- در مسمومیتها، مهم‌ترین راه دفع سموم از بدن، کدام است؟
- (۱) دستگاه ادراری (۲) دستگاه تنفس (۳) دستگاه گوارش (۴) دستگاه کبدی - صفوایی
- ۸۳- در کدام دام مسمومیت با آگزالت‌ها بیشتر دیده می‌شود؟
- (۱) اسب (۲) گاو (۳) گوسفند (۴) سگ
- ۸۴- ابتلای نرون‌های بلند باعث بروز کدام دسته از نشانه‌های مسمومیت با سموم ارگانوفسفور می‌شود؟
- (۱) اعصاب مرکزی (۲) نیکوتینی (۳) موسکارینی (۴) تأخیری
- ۸۵- در کدام مسمومیت ریزن موهای قاعده دم پدیده می‌آید؟
- (۱) سلتیوم (۲) آرسنیک (۳) مس (۴) سرب
- ۸۶- گنجیدگی‌های اوزینوفیلیک داخل هسته‌ای در توبول‌های کلیوی از مشخصات هیستویاتولوژی کدام مسمومیت است؟
- (۱) سرب (۲) مس (۳) آگزالت‌ها (۴) آفلاتوكسین‌ها
- ۸۷- کدام گیاه می‌تواند باعث کمبود تیامین در اسب شود؟
- (۱) سیبازمینی (۲) بلوط (۳) خرزهره (۴) سرخس عقابی
- ۸۸- در کدام مسمومیت فعالیت میکروفلور شکمبه موجب تشدید اثر سم می‌شود؟
- (۱) نیترات (۲) آگزالت (۳) سرخس (۴) گلیکوزیدهای قلبی
- ۸۹- رنگ قرمز روشن خون سیاهرگی از مشخصات کدام مسمومیت می‌باشد؟
- (۱) اوره (۲) نیتریت (۳) سیانید (۴) آگزالت
- ۹۰- ضایعات استخوانی و شکستگی‌های پاتولوژیک در مسمومیت با فلور ناشی از چیست؟
- (۱) ممانعت با جذب کلسیم و فسفر در روده (۲) ترک زیاد کلسیم و فسفر به جهت جبران دفع همزمان فلور (۳) فعالیت بیش از حد استئوکلاست‌ها (۴) کاهش فعالیت استئوبلاست‌ها