



605A

کد کنترل

605

A

صبح جمعه

۹۷/۱۲/۳

دفترچه شماره (۱)



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود، مملکت اصلاح می‌شود.»
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌متمرکز) - سال ۱۳۹۸

رشته جراحی دامپزشکی - کد (۲۷۰۱)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۹۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: اصول جراحی و هوشبری - جراحی عمومی دام‌های بزرگ - جراحی عمومی دام‌های کوچک - بیماری‌های اندام‌های حرکتی - رادیولوژی و سونوگرافی	۹۰	۱	۹۰

استفاده از ماشین‌حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

۱۳۹۸

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، به منزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی در جلسه این آزمون شرکت می‌نمایم.

امضا:

۱- کدام مورد از عوامل کاهش احتمال وقوع عفونت پس از جراحی (Surgical Site Infection-SSI) محسوب نمی‌شود؟

- (۱) استفاده از آنتی‌بیوتیک پیش‌گیرانه
 (۲) حمام کردن بیمار پیش از عمل جراحی
 (۳) زدن موهای ناحیه جراحی یک روز پیش از عمل
 (۴) استفاده از محلول آنتی‌سپتیک مناسب برای اسکراب ناحیه عمل جراحی
- ۲- کدام شماره از تیغه‌های اسکالپل برای برش‌های فشاری (Stab Incision) مناسب‌تر است؟
- (۱) ۱۵ (۲) ۱۲ (۳) ۱۰ (۴) ۱۱

۳- کدام فیچی به منظور استفاده در جراحی‌های چشم مناسب‌تر است؟

- (۱) Mayo (۲) Tenotomy
 (۳) Metzenbaum (۴) Spencer

۴- کدام مورد، یک رترکتور خودکار (self-retaining retractor) است؟

- (۱) Gelpi (۲) Army-Navy
 (۳) Senn (۴) Hohmann

۵- بیشترین زمان جذب را، کدام نخ، به خود اختصاص می‌دهد؟

- (۱) Poliglecaprone 25 (۲) Polydioxanone
 (۳) Polyglycolic acid (۴) Polyglactine 910

۶- در یک سگ دچار شوک، حداکثر میزان سرم کریستالوئید ایزوتونی که می‌توان در یک ساعت اول تجویز کرد،

چند میلی لیتر / کیلوگرم وزن بدن است؟

- (۱) ۵۰ (۲) ۹۰ (۳) ۱۱۰ (۴) ۷۰

۷- میزان هماتوکریت (PCV) در یک سگ ۲۰ کیلوگرمی به دلیل خونریزی به ۱۸ رسیده است. در صورتی که برای

انتقال خون از سگی با هماتوکریت ۳۵ استفاده شود، میزان خون مورد نیاز برای رساندن هماتوکریت به ۲۵ چند

میلی لیتر است؟

- (۱) ۶۰۰ (۲) ۴۸۰ (۳) ۳۶۰ (۴) ۲۴۰

۸- کدام یک از محلول‌های آنتی‌سپتیک برای شستشوی زخم مناسب‌تر است؟

- (۱) گلو تار آلدهید ۱۰ (۲) پراکسید هیدروژن ۱۲٪
 (۳) بتادین ۵٪ (۴) کلر هگزیدین دی‌استات ۰۵٪

۹- برای شستشوی زخم، محلول شستشو باید حداکثر با چه فشاری به کار برده شود؟

- (۱) ۸ Psi (۲) ۳۸ Psi (۳) ۱۸ Psi (۴) ۲۸ Psi

- ۱۰- کدام الگوی بخیه از نوع لبه به خارج برگردان (Everting) است؟
 (۱) Utrecht
 (۲) Vertical mattress
 (۳) Gambee
 (۴) Cushing
- ۱۱- تجویز کدام دارو در سگ منجر به اتساع طحال خواهد شد؟
 (۱) آسپرومازین (۲) کتامین (۳) زایلازین (۴) آتروپین
- ۱۲- در یک گربه ۵ کیلوگی که حدود ۸ درصد دهیدره است، چند سی سی مایع برای جبران کمبود، مورد نیاز است؟
 (۱) ۲۰۰۰ (۲) ۴۰۰۰ (۳) ۲۰۰ (۴) ۴۰۰
- ۱۳- کدام یک از داروهای بیهوشی استنشاقی دارای اثر بی دردی است؟
 (۱) هالوتان (۲) سووفلوران
 (۳) نیتروزاکسید (۴) ایزوفلوران
- ۱۴- همه موارد، سرعت برگشت از بیهوشی استنشاقی را تحت تأثیر قرار می دهند به جز:
 (۱) قدرت داروی بیهوشی (۲) تهویه آلوئولی
 (۳) میزان حلالیت دارو در بافت های بدن (۴) طول مدت زمان بیهوشی
- ۱۵- افزایش عمق بیهوشی استنشاقی با کدام مورد، همراه است؟
 (۱) افزایش pH خون شریانی و کاهش تعداد تنفس (۲) افزایش حجم تنفسی
 (۳) افزایش فشار دی اکسید کربن شریانی (۴) افزایش برون ده قلبی
- ۱۶- در صورتی که زمان پرشدگی مویرگی (Capillary refill time) ۲ ثانیه باشد بیانگر چیست؟
 (۱) حیوان دهیدره است. (۲) حیوان کم خون است.
 (۳) حیوان سالم است. (۴) حیوان مبتلا به شوک است.
- ۱۷- در بیماری که به دنبال تزریق وریدی تیوپنتال دچار آپنه شده است، کدام یک از حالات زیر روی خواهد داد؟
 (۱) آلکالوز تنفسی (۲) اسیدوز تنفسی
 (۳) اسیدوز متابولیک (۴) آلکالوز متابولیک
- ۱۸- کدام گزینه، در مورد اصطلاح «Pulse Pressure» درست است؟
 (۱) نباید کم تر از ۶۰ mmHg باشد.
 (۲) عبارت است از تفاوت فشار دیاستولیک و سیستولیک
 (۳) توسط دستگاه پالس اکسی متری قابل ارزیابی است.
 (۴) شاخص قابل اعتمادی برای ارزیابی فشار خون محسوب می شود.
- ۱۹- کدام عارضه در حین بیهوشی استنشاقی در سگ معمول است؟
 (۱) کاهش تهویه ریوی و هیپوکسی (۲) کاهش دمای بدن (هیپوترمی) و هیپوکسی
 (۳) کاهش تهویه ریوی و افزایش دی اکسید کربن خون (۴) کاهش تهویه ریوی و اسیدوز متابولیک
- ۲۰- در دستگاه بیهوشی استنشاقی، مصرف سودالایم به کدام عامل بستگی ندارد؟
 (۱) MAC داروی بیهوشی (۲) وزن حیوان
 (۳) میزان جریان اکسیژن (۴) طول مدت بیهوشی
- ۲۱- در Spermatic cord اسب، کدام یک از اجزا وجود ندارد؟
 (۱) Epididymis (۲) Vas deferens
 (۳) Testicular artery (۴) Pampiniform plexus

- ۲۲- کدام مورد، تکنیک انتخابی برای درمان Persistent Urachus است؟
 (۱) Cystotomy
 (۲) Cystoplasty
 (۳) Urethrotomy
 (۴) Neoureterostomy
- ۲۳- همه گزینه‌ها در خصوص فتق مغابنی در گوساله‌ها درست است، به جز:
 (۱) بیشتر موارد فتق مغابنی غیرمستقیم می‌باشند.
 (۲) رخداد فتق مغابنی در گوساله‌ها نادر می‌باشد.
 (۳) اکثر موارد فتق مغابنی در سمت راست اتفاق می‌افتد.
 (۴) فتق مغابنی عمدتاً در گوساله‌های نر بالغ اتفاق می‌افتد.
- ۲۴- کدام مورد، علامت بارز نئوپلازی مثانه در اسب می‌باشد؟
 (۱) Anuresis
 (۲) Hematuria
 (۳) Straining
 (۴) Urinary obstruction
- ۲۵- در رومینوتومی به روش تثبیت شکمبه به پوست (Rumen skin fixation) معمولاً به ترتیب از چه نخ‌ها، چه الگویی و چه نوع سوزنی استفاده می‌شود؟
 (۱) قابل جذب - کوتل - راند
 (۲) قابل جذب - تشکی - راند
 (۳) غیرقابل جذب - هالستد - کاتینگ
 (۴) غیرقابل جذب - کوشینگ - کاتینگ
- ۲۶- کدام مورد، علائم بالینی عارضه Choke به‌طور تیپیک در گاو است؟
 (۱) pain and fever
 (۲) anorexia and shock
 (۳) bloat and salivation
 (۴) dehydration and dyspnea
- ۲۷- کدام تست آزمایشگاهی، می‌تواند نشان‌دهنده انسداد مجرای پیلور شیردان در گاو باشد؟
 (۱) میزان کلر شکمبه بیشتر از ۳۰ میلی‌اکی والان در لیتر
 (۲) میزان سدیم شکمبه بیشتر از ۸۰ میلی‌اکی والان در لیتر
 (۳) میزان کلسیم شکمبه بیشتر از ۱۰ میلی‌اکی والان در لیتر
 (۴) میزان پتاسیم شکمبه به میزان بیشتر از ۵۰ میلی‌اکی والان در لیتر
- ۲۸- کدام علت، به احتمال پایین‌تری از علل مسببه فتق دیافراگمی در گاو محسوب می‌شود؟
 (۱) Trauma
 (۲) Dystocia
 (۳) Neoplasia
 (۴) Traumatic reticuloperitonitis
- ۲۹- رهیافت پارامدین از سمت راست برای کدام جراحی در گاو ارجح می‌باشد؟
 (۱) شکمبه
 (۲) هزارلا
 (۳) روده کوچک
 (۴) تصحیح جابه‌جایی شیردان
- ۳۰- لاپاراتومی در گوسفند معمولاً از کدام رهیافت انجام می‌شود؟
 (۱) پارامدین
 (۲) خط وسط
 (۳) فلانک راست
 (۴) فلانک چپ
- ۳۱- در سزارین اسب بعد از خارج نمودن جنین چه اقدامی ضروری می‌باشد؟
 (۱) تزریق اکسی‌توسین و خارج نمودن جفت و دوختن رحم
 (۲) خارج نمودن سریع جفت و دوختن برش رحم با الگوی کونل
 (۳) خارج نمودن سریع جفت و دوختن برش رحم با الگوی لمبرت
 (۴) دوختن کامل لبه‌های برش داده رحم با الگوی بخیه قفلی سرتاسری

- ۳۲- در کدام مورد، از تکنیک جراحی استفاده می‌شود؟
 (۱) Perineal laceration
 (۲) Uterine prolapse
 (۳) Pneumovagina
 (۴) Urovagina
- ۳۳- برداشتن سر پستانک اضافی گوساله در چند ماهگی به سادگی توسط قیچی امکان پذیر است؟
 (۱) ۳-۶
 (۲) ۶-۹
 (۳) ۹-۱۲
 (۴) ۱۲-۱۸
- ۳۴- کدام مورد، بهترین نوع بخیه در ترمیم حلقه فتق ناف می‌باشد؟
 (۱) Conell
 (۲) Cushing
 (۳) Vest over pants
 (۴) Simple Mattress
- ۳۵- مهم ترین علت تورم ضربه‌ای نگاری پرده قلب (TRP) در گاو چیست؟
 (۱) نفوذ جسم خارجی از مری به سوی قلب
 (۲) عفونت سیستمی و آلودگی پرده اطراف قلب
 (۳) نفوذ جسم خارجی از شیردان به سوی دیافراگم و قلب
 (۴) نفوذ جسم خارجی از نگاری به سوی دیافراگم و قلب
- ۳۶- شایع ترین محل ایجاد انباشتگی در کولون در اسب، در کدام ناحیه است؟
 (۱) Pelvic flexure
 (۲) Right dorsal colon
 (۳) Transverse colon
 (۴) Left ventral colon
- ۳۷- در گاو مبتلا به جابه‌جایی شیردان به سمت چپ، وضعیت دئودنوم به چه صورتی می‌باشد؟
 (۱) در ناحیه تهیگاه چپ به حالت عمود یا مورب قرار گرفته است.
 (۲) در ناحیه تهیگاه راست به حالت عمود یا مورب قرار گرفته است.
 (۳) در ناحیه تهیگاه راست به حالت افقی قرار گرفته است.
 (۴) در ناحیه تهیگاه چپ به حالت افقی قرار گرفته است.
- ۳۸- شایع ترین نوع سنگ ادراری در اسب، کدام است؟
 (۱) اورات
 (۲) استروویت
 (۳) کربنات کلسیم
 (۴) اگزالات کلسیم
- ۳۹- Typhlotomy به کدام مورد اطلاق می‌شود؟
 (۱) جراحی در ناحیه سکوم
 (۲) جراحی در ناحیه رژنم
 (۳) جراحی در ناحیه ایلیموم
 (۴) جراحی در ناحیه دوازدهه
- ۴۰- رهیافت Mandibular Symphysiotomy در درمان جراحی کدام عارضه، کاربرد دارد؟
 (۱) Nasal bone Fracture
 (۲) Maxillary Sinusitis
 (۳) Dentigerous cyst
 (۴) Palatoschisis
- ۴۱- روش Toggle pin در کدام قسمت دستگاه گوارش گاو، کاربرد دارد؟
 (۱) هزارلا
 (۲) شیردان
 (۳) شکمبه
 (۴) مری
- ۴۲- شایع ترین محل انسداد روده کوچک در گاو بالغ در کدام قسمت است؟
 (۱) اواسط ایلیموم
 (۲) انتهای ایلیموم
 (۳) انتهای رژنم
 (۴) انتهای دوازدهه

- ۴۳- جراحی روی اپیکال لیگامنت در قزیب گاو نر برای درمان کدام عارضه است؟
 (۱) Erection failure
 (۲) Corkscrew penis
 (۳) Penile hematoma
 (۴) Persistent frenulum
- ۴۴- کارگذاری بخیه Buhner در درمان کدام عارضه در گاو ماده کاربرد دارد؟
 (۱) پرولاپس واژن
 (۲) پیچ خوردگی رحم
 (۳) تومور ناحیه تخمدان
 (۴) تجمع ادرار در واژن
- ۴۵- مهم ترین علت بروز سینوزیت در اسبها چیست؟
 (۱) عفونت های تنفسی
 (۲) عفونت های دندانی
 (۳) شکستگی استخوان پیشانی
 (۴) شکستگی استخوان فک بالا
- ۴۶- در جراحی ovariohysterectomy در سگ کدام ساختار به طور کامل برداشته نمی شود؟
 (۱) oviducts
 (۲) ovaries
 (۳) uterin horns
 (۴) broad ligament
- ۴۷- کدام مورد، در جراحی برداشتن رحم و تخمدان در سگ صحیح است؟
 (۱) پس از عقیم سازی خطر بروز تومورهای پستانی افزایش خواهد یافت.
 (۲) در صورت جراحی در زمان فحلی حیوان، عوارض جراحی افزایش خواهد یافت.
 (۳) رهیافت جراحی از پهلو (Flank) نسبت به خط میانی شکم ترجیح داده می شود.
 (۴) از داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی نباید برای تسکین درد استفاده شود، زیرا خطر خونریزی افزایش می یابد.
- ۴۸- در یک سگ ماده مبتلا به تومور پستانی قرار است علاوه بر برداشتن تومورها عمل عقیم سازی نیز انجام شود، کدام گزینه توصیه می شود؟
 (۱) ابتدا عمل عقیم سازی انجام شود و برداشتن تومورها دو هفته بعد انجام شود.
 (۲) ابتدا عمل برداشت تومورها انجام شود و عمل عقیم سازی دو هفته بعد انجام شود.
 (۳) پس از بیهوشی ابتدا عقیم سازی انجام شود و سپس نسبت به برداشتن تومورها اقدام شود.
 (۴) پس از بیهوشی ابتدا عمل برداشتن تومورها انجام شود و سپس نسبت به عقیم سازی اقدام شود.
- ۴۹- در کدام مورد، استفاده از chest tube، توصیه می شود؟
 (۱) pneumothorax
 (۲) Ascites
 (۳) Pulmonary edema
 (۴) Subcutaneous emphysema
- ۵۰- در جراحی اخته گربه نر، محل برش در کدام محل می باشد؟
 (۱) Midline
 (۲) Prescrotal
 (۳) Scrotum
 (۴) Flank
- ۵۱- در مواردی از تنگی پیلور (pyloric stenosis) که شک به وجود نئوپلاسم وجود دارد، کدام یک از تکنیک های جراحی توصیه نمی شود؟
 (۱) Heineke-Mikulicz
 (۲) Fredet-Ramstedt
 (۳) Billroth I
 (۴) Y-U Pyloroplasty
- ۵۲- واژه Intestinal plication معادل کدام تکنیک است؟
 (۱) Enterotomy
 (۲) Enterostomy
 (۳) Enteroenteropexy
 (۴) Intestinal resection and anastomosis

- ۵۳- کدام علت در التیام سریع جراحات محوطه دهانی و عفونت حداقلی آن، دخالت بیشتری دارد؟
 (۱) حرکات دائمی زبان
 (۲) خاصیت ضد میکروبی بزاق
 (۳) مرطوب بودن محوطه دهانی
 (۴) بالا بودن میزان خون رسانی ناحیه
- ۵۴- از کدام روش جراحی برای تصحیح عارضه آنتروپیون استفاده می شود؟
 (۱) Wedge Resection
 (۲) V to Y coorrection
 (۳) Hotz-Celsus
 (۴) Modified Kuhnt-Szymanowski
- ۵۵- در مواردی که تعداد زیادی سنگ های ریز ادراری در ناحیه لگنچه وجود داشته باشد، کدام شیوه درمانی توصیه می شود؟
 (۱) Nephrectomy
 (۲) Urethral diversion
 (۳) Pyelolithotomy
 (۴) Bisectien nephrotomy
- ۵۶- کدام عبارت در مورد محل ایجاد برش آنتروتومی صحیح می باشد؟
 (۱) در قسمت پروگزیمال محل انسداد
 (۲) در قسمت دیستال محل انسداد
 (۳) در لبه مزانتریک روده
 (۴) بر روی محل قرار گرفتن جسم خارجی
- ۵۷- بهترین شیوه درمانی پرولاپس راجعه راست روده چیست؟
 (۱) Colopexy
 (۲) Total Colectomy
 (۳) Subtotal Colectomy
 (۴) Conservative Therapy
- ۵۸- کدام بیماری عامل مداخله گر در التیام زخم های پوست نمی باشد؟
 (۱) Uremia
 (۲) Diabetes mellitus
 (۳) Hypoproteinemia
 (۴) Hypoadrenocorticism
- ۵۹- کدام الگوی بخیه، برای دوختن تاندون پاره شده توصیه می شود؟
 (۱) Halsted
 (۲) Connell
 (۳) Bunnell
 (۴) Ford interlocking
- ۶۰- در مورد چیست و بیشترین میزان وقوع آن در کدام ناحیه چشم می باشد؟
 (۱) تومور بدخیم می باشد و بیشتر در ناحیه لیمبوس چشم ایجاد می شود.
 (۲) تومور بدخیم می باشد و بیشتر در ناحیه پلک سوم چشم ایجاد می شود.
 (۳) تومور خوش خیم می باشد و بیشتر در ناحیه لیمبوس چشم ایجاد می شود.
 (۴) تومور خوش خیم می باشد و بیشتر در ناحیه پلک سوم چشم ایجاد می شود.
- ۶۱- کدام مورد، محل شایع گیر کردن جسم خارجی در مری در دام های کوچک نیست؟
 (۱) محل عبور مری از دیافراگم
 (۲) پایه قلب
 (۳) ورودی قفسه سینه
 (۴) ورودی مری (محل اتصال حلق به مری)
- ۶۲- کدام مورد از ویژگی های ایجاد برش روی خط سفید (linea alba) برای ورود به محوطه بطنی نیست؟
 (۱) درد کمتر پس از جراحی
 (۲) استحکام بالای بافت در گرفتن بخیه ها
 (۳) خونریزی زیاد در محل برش
 (۴) امکان ارزیابی بیشتر ارگان های محوطه بطنی
- ۶۳- اصطلاح چشم گیلاسی (Cherry eye) به کدام عارضه اطلاق می شود؟
 (۱) بیرون زدگی حاد کره چشم
 (۲) سفید شدن یا کدر شدن قرنیه
 (۳) بیرون زدن غده اشکی پلک سوم
 (۴) برگشتگی پلک سوم

- ۶۴- اصطلاح **Onychectomy** به کدام معنا است؟
 (۱) کوتاه کردن ناخن
 (۲) برداشت بند سوم انگشت به روش جراحی
 (۳) برداشت یک انگشت به طور کامل به روش جراحی
 (۴) بریدن دم از دومین یا سومین مهره دمی به روش جراحی
- ۶۵- در کدام یک از انواع تومورهای پستانی سگ، درمان جراحی توصیه نمی شود؟
 (۱) Adenoma
 (۲) Inflammatory Carcinoma
 (۳) Adenocarcinoma
 (۴) Mixed Mammary Tumor
- ۶۶- کدام روش، برای درمان هیپرپلازی خوش خیم پروستات (BPH) توصیه می شود؟
 (۱) کیسه دار کردن پروستات
 (۲) برداشت کامل پروستات
 (۳) تجویز استروژن
 (۴) اخته کردن
- ۶۷- در دیواره مری کدام یک از لایه ها بیشترین قدرت نگهداری بخیه را دارد؟
 (۱) Muscular
 (۲) Mucosal
 (۳) Submucosal
 (۴) Adventatia
- ۶۸- کدام مورد، لایه داخلی کیسه فتقی در فتق میان دوراهی می باشد؟
 (۱) صفاق
 (۲) عضله internal obturator
 (۳) فاشیای پرینه ای
 (۴) عضله levator ani
- ۶۹- استفاده از کدام یک از نخ های بخیه در پیوند عروق مناسب تر است؟
 (۱) پلی پروپیلن
 (۲) ایریشم
 (۳) پلی استر
 (۴) پلی آمید
- ۷۰- کدام عبارت، در مورد عارضه وجود ادرار در حفره بطنی (uroabdomen) صحیح نمی باشد؟
 (۱) پارگی مثانه معمول ترین علت آن می باشد.
 (۲) در بیمار دچار این عارضه اصلاح وضعیت متابولیکی نسبت به جراحی اولویت دارد.
 (۳) بهترین راه تشخیص آن اندازه گیری کراتینین مایع صفاقی و مقایسه با کراتینین خون است.
 (۴) بهترین راه تشخیص آن اندازه گیری اوره مایع صفاقی و مقایسه با اوره خون است.
- ۷۱- کدام اصطلاح برای بیماری **Laminitis** صحیح تر است؟
 (۱) Chronic hoof degeneration
 (۲) Founder
 (۳) Acute laminar degeneration
 (۴) Pododermatitis
- ۷۲- کدام یک از عارضه های سم، احتمال وقوع جراحات تاندون های خم کننده در اسب ها را افزایش می دهد؟
 (۱) Hoof cracks
 (۲) Underrun heel
 (۳) Short toe
 (۴) Contracted heel
- ۷۳- قطع عصب در کدام یک از بیماری های اندام حرکتی اسب یکی از راهکارهای درمان است؟
 (۱) Navicular syndrome
 (۲) Ring bone
 (۳) Splints
 (۴) Laminitis
- ۷۴- بیماری اوفه استخوانی (**Bone Spavin**) مربوط به کدام مفصل می باشد و چه نوع عارضه ای است؟
 (۱) بخلق - استحالته ای مفصل عفونی
 (۲) لگن - استحالته ای مفصل غیر عفونی
 (۳) کارپ - استحالته ای مفصل عفونی
 (۴) تارس - استحالته ای مفصل غیر عفونی

- ۷۵- تورم و التهاب مفصل استایفل در اسب چه نامیده می شود؟
 (۱) Gonitis
 (۲) Sesamoiditis
 (۳) Splints
 (۴) Carpititis
- ۷۶- اتساع غلاف تارسی (Tarsal sheath) در اسب چه نامیده می شود؟
 (۱) دسمایتیس
 (۲) تروفین
 (۳) تاندونیت
 (۴) هیگروما
- ۷۷- علامت بالینی ظاهر شبه گل کلمی «Cauliflower-Like appearance» مشخصه کدام بیماری است؟
 (۱) Quittor
 (۲) Thrush
 (۳) Canker
 (۴) Side bone
- ۷۸- بیماری Sweeny به کدام مورد اطلاق می شود؟
 (۱) خمیدگی بیش از اندازه مفصل تارس
 (۲) آتروفی عضلات شانه
 (۳) آتروفی عضلات سرینی
 (۴) فلجی عصب بازویی
- ۷۹- کدام مورد، شایع ترین محل رخداد قره قوش (Splints) در اسب می باشد؟
 (۱) قلم فرعی دوم
 (۲) قلم اصلی
 (۳) قلم فرعی چهارم
 (۴) بین قلم اصلی و بند اول انگشت
- ۸۰- کشیدگی بیش از حد تاندون بازکننده مشترک بندهای انگشت (common digital extensor) منجر به شکل گیری کدام عارضه می شود؟
 (۱) Wind Puff
 (۲) Buttress Foot
 (۳) Osselet
 (۴) Bucked shin
- ۸۱- رویت نشانه «thumbprint» در فضای مدولای استخوان های بلند می تواند نشانگر کدام عارضه باشد؟
 (۱) osteopetrosis
 (۲) panosteitis
 (۳) osteosarcoma
 (۴) metabolic bone disease
- ۸۲- کدام عارضه قابلیت تشخیص با سونوگرافی را دارد؟
 (۱) Cauda equina syndrom
 (۲) Thoracic discopathy
 (۳) Brain tumor
 (۴) Congenital hydrocephalus
- ۸۳- کدام گزینه در مورد نکروز غیر عفونی سر استخوان ران در سگ صحیح می باشد؟
 (۱) در نژادهای بزرگ شایع تر است.
 (۲) فضای مفصلی افزایش می یابد.
 (۳) معمولا دو طرفه دیده می شود.
 (۴) در نابالغین شایع تر است.
- ۸۴- در صورت وجود گلوله فلزی کوچک در بافت نرم احتمال دیدن کدام آرتیفکت در تصاویر اولترا سونوگرافی بیشتر است؟
 (۱) Slice-thickness
 (۲) Edge-shadowing
 (۳) Comet-tail
 (۴) Beam-width
- ۸۵- در تلسکوپی شدن روده های کوچک، ناحیه هایپراکو در تصاویر اولتراسونوگرافی در نمای عرضی مربوط به چیست؟
 (۱) لومن روده
 (۲) دیواره روده
 (۳) چربی مزانتر
 (۴) عروق مزانتر
- ۸۶- برای بررسی بهتر کبد اسب کدام پروب و فرکانس توصیه می شود؟
 (۱) پروب محدب و فرکانس پایین
 (۲) پروب خطی و فرکانس پایین
 (۳) پروب محدب و فرکانس بالا
 (۴) پروب خطی و فرکانس بالا

۸۷- در صورتی که به مو برداشتی استخوان مشکوک باشیم ولی در رادیوگرافی نشانه‌ای مشاهده نشود، تکرار رادیوگرافی پس از چند روز پیشنهاد می‌شود؟

- (۱) ۲۰-۳۰ (۲) ۱-۲ (۳) ۵-۱۰ (۴) ۳۰

۸۸- نشانه رادیوگرافی Plication می‌تواند به دلیل کدام مورد باشد؟

- (۱) Ileus (۲) Constipation
(۳) Intussusception (۴) Linear Foreign Body

۸۹- کدام مورد از نشانه‌های رادیوگرافی بیماری نایکولار در اسب نمی‌باشد؟

- (۱) تشکیل انتروفایت در جوانب استخوان نایکولار (۲) اسکروز شدن مدولای استخوان نایکولار
(۳) کیست در مدولای استخوان نایکولار (۴) آروزبون در سطح مفصلی استخوان نایکولار

۹۰- الگوی پریوستی «smooth and solid» بیانگر کدام یک از عوارض استخوانی می‌تواند باشد؟

- (۱) osteomyelitis (۲) subperiosteal hematoma
(۳) metaphyseal osteopathy (۴) hypertrophic osteopathy

نیوز

دوره دکتری

سازمان سنجش و اطلاع رسانی دانشگاهی



