

کد کنترل

247

F

247F

آزمون (نیمه‌تم مرکز) ورود به دوره‌های دکتری – سال ۱۴۰۱

دفترچه شماره (۱)

صبح جمعه ۱۴۰۰/۱۲/۶



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»
امام خمینی (ره)

رشته زمین‌شناسی زیست‌محیطی (کد ۲۲۰۶)

جدول مواد امتحانی، تعداد، شماره سوال‌ها و زمان پاسخ‌گویی

مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره	زمان پاسخ‌گویی
مجموعه دروس تخصصی: - زمین‌شناسی ایران - زمین‌شناسی زیست‌محیطی - زمین‌شیمی زیست‌محیطی - زمین‌شناسی پزشکی	۱۰۰	۱	۱۵۰	۱۵۰ دقیقه

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

* متقاضی گرامی، وارد نکردن مشخصات و امضا در کادر زیر، به منزله غیبت و حضور نداشتن در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سوال ها، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوال ها و پایین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

- | |
|--|
| <p>۱- تشکیل توالی‌های الیگومیوسن منطقه زاگرس و باختر ایران مرکزی به عدم عملکرد کدام رخداد نسبت داده شده است؟</p> <p>(۱) ساوین (۲) استیرین (۳) آتیکن (۴) پیرئن</p> |
| <p>کدام سازنده‌ها پس از رخداد هرسی‌نین تشکیل شدند؟</p> |
| <p>(۱) باقرآباد، قزل قلعه (۲) سردر، جمال</p> <p>(۳) دورود، روتله (۴) قزل قلعه، دورود</p> |
| <p>روند کدام گسل با بقیه متفاوت است؟</p> <p>(۱) نایبند (۲) سمنان (۳) درونه (۴) ترود</p> |
| <p>کدام عبارت درست است؟</p> |
| <p>(۱) نهشته‌های نشوون منطقه کپه‌داغ رخساره کربناته - آواری دارند.</p> <p>(۲) سنگ‌های رسوبی حوضه قم معرف یک سیکل رسوبی هستند.</p> <p>(۳) ناپیوستگی قاعده پالتوژن زاگرس معرف عملکرد کوه‌زایی لaramید است.</p> <p>(۴) نهشته‌های میوسن البرز شمالی نشان‌دهنده یک چرخه رسوبی هستند.</p> <p>رخساره‌های آواری - تبخیری دونین پیشین در کدام منطقه دیده می‌شوند؟</p> |
| <p>(۱) پنجره فرسایشی آق دربند (۲) شرق ایران مرکزی (۳) زاگرس مرتفع</p> <p>(۴) دامنه شمالی البرز مرکزی</p> |
| <p>کدام محیط‌های رسوبی کرتاسه پیشین، شباهت بیشتری به هم داشته‌اند؟</p> |
| <p>(۱) ایران مرکزی، کپه‌داغ (۲) البرز مرکزی، زاگرس مرتفع</p> <p>(۳) البرز، ایران مرکزی (۴) کپه‌داغ، البرز</p> |
| <p>کدام گسل را می‌توان به عملکرد رویداد کالدونین نسبت داد؟</p> |
| <p>(۱) تبریز (۲) هریروند (۳) کازرون (۴) عطاری</p> |
| <p>کدام عبارت درباره نهشته‌های پوشش پلاتفرم پر کامبرین پسین - اوایل مزوژوئیک ایران درست است؟</p> |
| <p>(۱) شواهد مربوط به ریفتینگ در دوره کربونیfer از آن گزارش شده‌اند.</p> <p>(۲) رخساره‌های مربوط به محیط‌های دریایی عمیق در آن وجود ندارند.</p> <p>(۳) ناپیوستگی‌های ناشی از عملکرد کوه‌زایی‌های کالدونین و هرسی‌نین در آن وجود دارند.</p> <p>(۴) شواهد تشکیل محیط‌های کولاپی، تبخیری، و دلتایی - مردابی پالکوزوئیک پسین از آن گزارش شده‌اند.</p> |
| <p>در کدام منطقه، رویداد فرسایشی مربوط به عملکرد فاز البرزین زودتر خاتمه یافت؟</p> |
| <p>(۱) ایران مرکزی (۲) البرز جنوبی (۳) البرز شمالی (۴) زاگرس</p> |

- ۱۰ کدام عبارت درباره توالی ترباس بالایی - ژوراسیک ایران مرکزی درست است؟

- ۱) ناپیوستگی مرز بالایی سازند بغمشاه در دو طرف برآمدگی شتری به رخداد خشکی‌زای طبسین نسبت داده است.
- ۲) مرزهای زیرین و بالایی گروه شمشک، به ترتیب، منطبق بر رویدادهای سیمیرین میانی و پیشین هستند.
- ۳) سنگ‌های ژوراسیک بالایی ایران مرکزی رخساره یکنواخت داشته و در محیط رسوبی مشابه تشکیل شده‌اند.
- ۴) مرز بالایی سازند بغمشاه در شمال شرق برآمدگی شتری پیوسته و در جنوب غرب آن ناپیوسته است.

- ۱۱ کدام عبارت درست است؟

- ۱) در منطقه ساغند، ماقماتیسم قلیایی باعث متاسوماتیسم سازند ساغند و کانی‌سازی طلا و اورانیوم شده است.
- ۲) در آپاتیت‌های فسفات اسفوری (اردویسین بافق) مقدار قابل توجهی عناصر خاکی کمیاب وجود دارد.
- ۳) کانه اصلی معدن کوشک، بزرگ‌ترین کانسار آهن، سرب و روی پرکامبرین - پالنزوئیک پیشین ایران مرکزی، گالن است.
- ۴) کانه اصلی اغلب ذخایر آهن ایران، در سنگ‌های پرکامبرین ایران مرکزی (مثلاً معدن گل‌گهر)، مگنتیت است.

- ۱۲ کدام یک درباره زون سندنج - سیرجان درست است؟

- ۱) شواهد مبتنی بر تأثیر رویداد هرسی‌نین در آن دیده می‌شود.
- ۲) مرزهای جنوب باختری و شمال خاوری آن، به ترتیب، با گسل‌های اصلی زاگرس و درونه مشخص می‌شوند.
- ۳) پدیده‌های دگرگونی نیمه جنوب خاوری آن غالباً حاصل عملکرد کوهزایی لارامید هستند.
- ۴) سنگ‌های کربناته - آواری کربونیفر بالایی آن در رویداد سیمیرین میانی به طور ضعیف دگرگون شده‌اند.

- ۱۳ کدام مورد از ویژگی‌های سنگ‌های نفوذی قلیایی پرکامبرین است؟

- ۱) عموماً از انواع سردشده در اعمق زیاد هستند.
- ۲) به دلیل فراوانی کانی‌های فرومیزین، عموماً تیره رنگ هستند.
- ۳) گرانیت زربگان در دگرگونی‌های پرکامبرین تزریق شده و در زیر نهشته‌های حاشیه قاره‌ای پرکامبرین پسین قرار دارد.
- ۴) در دگرگونی‌های پرکامبرین یا نهشته‌های تشکیل شده در دریاهای حاشیه قاره‌ای پرکامبرین پسین تزریق شده‌اند.

- ۱۴ کدام عبارت درباره ماقماتیسم - دگرگونی ترباس ایران درست است؟

- ۱) سنگ‌های آتشفسانی ترباس در البرز شمالی وجود ندارند.
- ۲) بزرگ‌ترین توده نفوذی ترباس شمالی از غرب کوه‌های شمال ایران گزارش شده است.
- ۳) دگرگونی‌های ده سلم توسط توده نفوذی شیرکوه قطع شده و در زیر آهک‌های اربیتولینادر کرتاسه زیرین قرار دارند.
- ۴) در رخداد دگرگونی ترباس پسین، برخی سنگ‌های دگرگون شده پرکامبرین دگرگونی قهقهایی تحمل کردند.

- ۱۵ همه موارد در خصوص سازند کهریزک درست‌اند، به جز:

- ۱) نوعی کنگلومرای پلی‌میکتیک است.
- ۲) مرز زیرین آن با سازند هزاردره ناپیوستگی زاویه‌دار است.
- ۳) از سازند خرمدره جوان‌تر است.
- ۴) مرز بالایی آن با سازند آبرفتی تهران به صورت ناپیوسته است.

- ۱۶ در کدام سازند شواهد مربوط به پیشروی مقطعي و کوتاه مدت دریا روی پهنه‌های دلتایی - مردابی یا رودخانه‌ای وجود دارد؟

- ۱) کشف‌رود
- ۲) ناینند
- ۳) قرمز زیرین
- ۴) آب حاجی

- ۱۷ کدام عبارت درست است؟

- ۱) مرزهای زیرین و بالایی طبقات اردوبیسین ایران غالباً ناپیوسته هستند.
- ۲) سنگ‌های سیلورین در شرق البرز شمالی و باختر ایران مرکزی وجود دارند.
- ۳) سنگ‌های کامبرین منطقه زاگرس رخساره کاملاً مشابه توالی‌های همزمان سایر مناطق ایران دارند.
- ۴) در شمال کرمان و جنوب خاوری زاگرس، کافت‌های درون قاره‌ای پرکامبرین پسین - اوایل کامبرین میانی وجود داشتند.

-۱۸- کدام مورد درباره سنگ‌های پرمین ایران درست است؟

(۱) در البرز جنوبی توالی کاملی از سنگ‌های پرمین وجود دارد.

(۲) مرزهای سیکل‌های رسوبی پرمین با پیوستگی رسوبی همراه هستند.

(۳) سازند سورمق قدیمی ترین واحد سنگ چینهای توالی پرمین آباده و شهرضا است.

(۴) نهشته‌های تشکیل شده در گافت‌های درون قاره‌ای پرمین منحصر به زون سنندج - سیرجان نیستند.

-۱۹- از کدام مجموعه سازندها رخساره آهک کالپیونلادر گزارش شده است؟

(۱) دلیچای، چمن بید

(۲) لار، نیریز

(۳) مزدوران، فهلیان

(۴) شال، سورمه

به ترتیب کدام سازندها، رخساره مولاس دارند و رخساره غالب کدام سازندها نهشته‌های پلازیک است؟

(۱) کرمان و هزاردره، آب‌دراز و گوری

(۲) کشمکش و دوروود، گرو و داریان

(۳) فجن و امیران، ایلام و آب‌تلخ

(۴) کدامیک از ترکیبات آلی زیر از گرم‌کافت (پیرولیز) سایر هیدروکربن‌ها ایجاد می‌شوند؟

(۱) PAH‌ها

(۲) PCB‌ها

(۳) دی‌اکسین‌ها

(۴) CFC‌ها

-۲۰- ثابت پایداری کمپلکس‌های آبگین آلی - فلزی با pH چگونه تغییر می‌کند؟

(۱) با افزایش pH ابتدا کاهش و سپس افزایش می‌یابد.

(۲) با افزایش pH کاهش می‌یابد.

(۳) با افزایش pH ابتدا افزایش و سپس کاهش می‌یابد.

(۴) با افزایش pH افزایش می‌یابد.

-۲۱- کدام عبارت زیر در مورد آفت‌کش‌های سخت صحیح است؟

(۱) LD_{۵۰} پایین، BCF بالا، انحلال‌پذیری زیاد

(۲) LD_{۵۰} بالا، انحلال‌پذیری کم

(۳) LD_{۵۰} بالا، BCF پایین، انحلال‌پذیری کم

(۴) LD_{۵۰} بالا، انحلال‌پذیری زیاد

-۲۲- مهم‌ترین لیگاندهای آلی و غیرآلی برای فلرات در آب دریا به ترتیب کدامند؟

(۱) کربن آلی کلوئیدی - Cl⁻

(۲) کربن آلی کلوریدی - HS⁻

(۳) کربن آلی حل شده - HCO₃⁻

(۴) کربن آلی حل شده - HS⁻

-۲۳- کدام گزینه دلیل عدم استفاده از ایزوتوپ تریتیوم به تنها یی برای تعیین سن آب‌های زبرزمینی است؟

(۱) ایزوله شدن آب از جو در زون اشباع از آب

(۲) انجام آزمایش‌های هسته‌ای در سال ۱۹۵۲

(۳) تغییرات فصلی و جغرافیایی غلظت تریتیوم در آب باران

(۴) برهمکنش هوا با آب باران فرورو در زون هواده (وادوز) خاک

-۲۴- در کدام عرض‌های جغرافیایی دمای آب اقیانوس با تغییر عمق تقریباً ثابت می‌ماند؟

(۱) در استوا (عرض جغرافیایی صفر)

(۲) بین ۲۰° تا ۴۰° درجه شمالی و جنوبی

(۳) بالاتر از ۶° درجه شمالی و جنوبی

(۴) بین استوا تا ۲۰° درجه شمالی و جنوبی

-۲۵- برای تعیین درجه اختلاط (مخلوط شدگی) آب‌ها بیشتر از کدام نسبت یونی زیر استفاده می‌شود؟

(۱) Cl / Br

(۲) Cl / HCO₃⁻

(۳) Cl / SO₄²⁻

(۴) Cl / F

-۲۶- اگر آب یک رودخانه دارای نسبت $\text{Na}/\text{Cl} = 1$ و $(\text{Na} + \text{Ca})/\text{Cl} = 1$ باشد ترکیب شیمیایی آب رودخانه توسط

کدام فرایند کنترل می‌شود؟

(۱) بارش‌های جوی

(۲) تبخیر

(۳) هوازدگی سنگ‌ها

(۴) بارش و نیخیر

-۲۹- از بین منابع (مخازن) کربن دار زیر کدامیک دارای ${}^{\circ}\text{C}$ منفی تری است؟

(۱) متان (۲) کربنات‌های دریابی (۳) گیاهان
 CO_2 جوی

-۳۰- کدام گزینه صحیح است؟

- (۱) از دیدگاه فیزیک کلاسیک، اتم پیشنهادی رادرفورد ناپایدار است.
- (۲) رادرفورد پیشنهاد داد بیشتر فضای اتم را هسته دارای بار مثبت تشکیل داده است.
- (۳) بر اساس مدل تامسون پروتون‌های دارای بار مثبت در زمینه‌ای از بار منفی قرار گرفته‌اند.
- (۴) بور پیشنهاد کرد در هر اتم پایدار، رباش الکترواستاتیک بین الکترون و پروتون از نیروی گریز از مرکز بیشتر است.

-۳۱- ${}^{\circ}\text{C}/\text{میلیون ppm}$ معادل چند نانوگرم برگرم می‌باشد؟

(۱) ۱ (۲) ۱۰ (۳) ۱۰۰ (۴) ۱۰۰۰

-۳۲- در کدام دما نسبت به شرایط استاندارد، محاسبات مربوط به انرژی آزاد پیچیده‌تر می‌شود؟

(۱) ${}^{\circ}\text{C}$ تا ${}^{\circ}\text{C}$ (۲) ${}^{\circ}\text{C}$ تا ${}^{\circ}\text{C}$
 ${}^{\circ}\text{C}$ تا ${}^{\circ}\text{C}$ (۳) ${}^{\circ}\text{C}$ تا ${}^{\circ}\text{C}$

-۳۳- کدام گزینه در رابطه با انحلال پذیری نمک (NaCl) در آب صحیح است؟

- (۱) با افزایش قدرت یونی همواره انحلال پذیری کاهش پیدا می‌کند.
- (۲) با افزایش قدرت یونی همواره انحلال پذیری افزایش پیدا می‌کند.
- (۳) با افزایش قدرت یونی ابتدا انحلال پذیری افزایش و سپس کاهش می‌یابد.
- (۴) با افزایش قدرت یونی ابتدا انحلال پذیری کاهش و سپس افزایش می‌یابد.

-۳۴- اگر K_{sp} برابر با ${}^{-4/6} \text{M}^{15}$ باشد در کدام شرایط، محلول نسبت به ژپس سیر نشده است؟

(۱) فعالیت یون‌های کلسیم و سولفات با هم برابر باشند.

(۲) حاصل ضرب فعالیت یون‌های کلسیم و سولفات برابر با ${}^{-3/6} \text{M}^{10}$ باشد.

(۳) مجموع فعالیت یون‌های کلسیم و سولفات از K_{sp} ژپس بیشتر باشد.

(۴) حاصل ضرب فعالیت یون‌های کلسیم و سولفات برابر با ${}^{-5/6} \text{M}^{15}$ باشد.

-۳۵- کدام گزینه صحیح است؟

- (۱) در رقیق شدگی بینهایت، فعالیت آب از یک کمتر است.
- (۲) تشکیل کمپلکس‌های آبگین، انحلال پذیری را افزایش می‌دهد.
- (۳) مدل تروسدول - جونز برای گستره قدرت یونی ${}^{\circ}\text{C}$ تا ${}^{\circ}\text{C}$ مناسب نیست.
- (۴) فعالیت آب در محلول‌هایی مانند آب دریا برابر با یک است.

-۳۶- آهنگ واکنش کدام فرآیند شیمیابی طولانی‌تر است؟

(۱) تعادل آب - کانی (۲) تهشیینی از جو (۳) آب - گاز
 H_2O - CaCO_3

-۳۷- ثابت تفکیک (pKa) برای هیدروکلریک اسید و سولفوریک اسید چگونه است؟

(۱) برای هر دو مثبت است.

(۲) برای هر دو منفی است.

(۳) برای هیدروکلریک اسید منفی و برای سولفوریک اسید مثبت است.

(۴) برای هیدروکلریک اسید مثبت و برای سولفوریک اسید منفی است.

-۳۸- در شرایط $pH = 10$ فراوانی گونه‌های $H_2CO_3^-$, HCO_3^- و CO_3^{2-} چگونه است؟

(۱) $HCO_3^- < H_2CO_3^- < CO_3^{2-}$

(۲) $CO_3^{2-} < H_2CO_3^- < HCO_3^-$

(۳) $H_2CO_3^- < HCO_3^- < CO_3^{2-}$

(۴) $H_2CO_3^- < CO_3^{2-} < HCO_3^-$

-۳۹- بیشترین ظرفیت بافری برای اسیدها و بازهای ضعیف چه موقع رخ می‌دهد؟

(۱) در شرایطی از pH که فعالیت H^+ و OH^- با هم برابر باشد.

(۲) در شرایطی از pH که ثابت تفکیک اسید (pKa) یا باز ضعیف (pKb) برابر باشد.

(۳) در شرایطی از pH که ثابت تفکیک اسید ضعیف بیشتر از ثابت تفکیک باز ضعیف باشد.

(۴) در شرایطی از pH که ثابت تفکیک اسید ضعیف کمتر از ثابت تفکیک باز ضعیف باشد.

-۴۰- در کدام شرایط، پتانسیل اکسایش - کاهش آب می‌تواند بیشتر باشد؟

(۱) زهاب اسیدی معادن

(۲) تالاب‌هایی که دچار فرایند پرغذایی شده‌اند.

(۳) دریاهای آزاد

(۴) رودخانه‌های حاصل از ذوب یخچال‌ها

-۴۱- در شرایط pH قلیایی زیاد و پتانسیل اکسایش بسیار کم کدام ترکیب آهن پایدارتر است؟

(۱) هماتیت

(۲) سیدریت

(۳) پیریت

(۴) مگنتیت

-۴۲- اگر اکسیژن یک سامانه افزایش یابد، کدام واکنش سریع تر رخ می‌دهد؟



-۴۳- دلیل اصلی اضافه شدن قانون رینگ‌وود به قوانین گلددشمیت کدام گزینه است؟

(۱) ماهیت پیوندها در کانی‌ها بیشتر کووالانسی است تا یونی.

(۲) قوانین گلددشمیت در ارتباط با جانشینی‌های عناصر واسطه کارایی ندارد.

(۳) قوانین گلددشمیت در مورد پیوندهای صد درصد یونی کارایی ندارد.

(۴) پیوندهای بین عناصر تشکیل‌دهنده کانی‌ها جز در موارد خاص صد درصد یونی نمی‌باشند.

-۴۴- دلیل ظرفیت تبادل کاتیونی کم در ایلیت‌ها کدام است؟

(۱) عدم جانشینی در لایه‌های هشت‌وجهی

(۲) عدم جانشینی در لایه‌های چهار‌وجهی

(۳) تعداد زیاد کاتیون‌های K^+ در موقعیت بین لایه‌ای با پیوند قوی

(۴) جانشینی K^+ در لایه‌های هشت‌وجهی و چهار‌وجهی

-۴۵- جذب سطحی کدامیک در pH‌های قلیایی کمتر است؟

(۱) مولیبدن

(۲) مس

(۳) روی

(۴) کادمیم

-۴۶- کدام گزینه دلیل اصلی تولید گونه‌های فعال کمتر هنگام ورود کربیوتویل به ریه است؟

(۱) انحلال پذیری کمتر کربیوتویل نسبت به آزیست‌های آمفیبولی

(۲) جانشینی‌های زیاد در لایه‌های چهار‌وجهی و هشت‌وجهی کربیوتویل

(۳) در گستره وسیعی از pH، پتانسیل زتای کربیوتویل مثبت است.

(۴) در کربیوتویل فاصله بین اکسیرن در لایه هشت‌وجهی اندکی بیش از فاصله اکسیرن‌های رأسی چهار‌وجهی‌های سیلیس است.

- ۴۷- جذب سطحی کدام کاتیون دو ظرفیتی با توجه به شاعع یون هیدراته (آپوشی) آن توسط زئولیت‌ها ابتدا انجام می‌شود؟
- (۱) استرانسیم (۲) باریم (۳) کلسیم (۴) منیزیم
- ۴۸- با توجه به غلظت و پتانسیل گرم شدن جهانی (GWP)، کدام گزینه گاز گلخانه‌ای مهم‌تری است؟
- (۱) C_6F_{14} (۲) N_2O (۳) CF_4 (۴) $CFC-11$
- ۴۹- تجزیه نورشیمیایی گازهای اکسیژن‌دار در کدام محدوده طول موج، سبب ایجاد اوزون بد می‌شود؟
- (۱) $1/\mu\text{m}$ تا $2/\mu\text{m}$ میکرون (۲) $2/\mu\text{m}$ تا $3/\mu\text{m}$ میکرون (۳) $3/\mu\text{m}$ تا $4/\mu\text{m}$ میکرون (۴) کمتر از $1/\mu\text{m}$ میکرون
- ۵۰- کدامیک از گازهای زیر به عنوان آلاینده اولیه هوا در نظر گرفته می‌شود؟
- (۱) O_3 (۲) NO (۳) SO_4 (۴) NO_2
- ۵۱- بالا بودن مقادیر پتانسیم، سولفات، آمونیم و نیترات در آب باران بیانگر کدام منشاء است؟
- (۱) زیست‌شناسی (۲) کود شیمیایی (۳) آبودگی صنعتی (۴) سوزاندن زیست‌توده
- ۵۲- برای محاسبه ضریب غنی‌شدگی معمولاً کدام عناصر به عنوان عنصر مرجع استفاده می‌شوند؟
- (۱) Sc, Mg, Al (۲) Sc, Al, Fe (۳) Sc, Mg, Fe (۴) Mg, Al, Fe
- ۵۳- کدامیک از شرایط زیر می‌تواند غلظت فلوئور محلول را کاهش دهد؟
- (۱) غلظت زیاد کلسیم به صورت محلول (۲) عدم وجود اکسی هیدروکسیدهای آهن (۳) افزایش جذب سطحی آن با افزایش pH آب (۴) برهم‌کنش آب با کانی‌هایی که در فرمول خود دارای (OH) می‌باشند آمفیبول و بیوتیت.
- ۵۴- کدامیک از گونه‌های عناصر آرسنیک و سلنیم و در چه شرایطی از pH به شدت جذب سطحی می‌شوند؟
- (۱) گونه‌های آرسنیت و سلنات در pH های قلیایی (۲) گونه‌های آرسنیت و سلنیت در pH های اسیدی (۳) گونه‌های آرسنات و سلنیت در pH های قلیایی (۴) گونه‌های آرسنات و سلنیت در pH های اسیدی
- ۵۵- بیشترین انحلال پذیری فسفر در چه شرایطی از pH رخ می‌دهد؟
- (۱) pH های اسیدی (۲) pH های طبیعی (۳) pH های قلیایی (۴) pH کاهش کانی‌های سولفیدی و مناطق آتش‌فشاری
- ۵۶- کدام گزینه صحیح است؟
- (۱) شخم زدن زمین در جهت شیب، سبب کاهش خطر سیلاب می‌شود. (۲) خطر سیلاب برای حوضه‌های کوهستانی در اواخر اسفند بیشتر است. (۳) گسترش سازندهای رسی و مارنی در حوضه آبریز، سیل خیزی را کاهش می‌دهد. (۴) هرچه شبکه زهکشی متراکم‌تر و تعداد انشعابات حوضه آبریز بیشتر باشد امکان وقوع سیلاب بیشتر است.
- ۵۷- کدام گزینه بزرگ‌ترین خسارات سیل است؟
- (۱) از بین رفتن خاک حاصلخیز (۲) از بین رفتن خاک تأسیسات (۳) ورود مواد جامد به داخل دریاچه سدها
- ۵۸- افزایش کدام نسبت از گازها می‌تواند به معنی احتمال خودسوزی در معادن زغال‌سنگ باشد؟
- (۱) O_2 به N_2 (۲) O_2 به SO_2 (۳) CO_2 به SO_2 (۴) O_2 به CO

- ۵۹- در مرزهای تکتونیکی دور شونده:
- (۱) پوسته اقیانوس سرد است.
 - (۲) حرکت نسبی گسل فشارشی است.
 - (۳) شکست سنگ سریع نر اتفاق می‌افتد.
 - (۴) حجم سنگ قادر به ذخیره تنفس زیاد است.
- ۶۰- کدام گزینه در ارتباط با شدت ۳ (شدت اصلاح شده مرکالی) صحیح است؟
- (۱) رانندگان خودروها احساس می‌کنند.
 - (۲) اشخاص پیاده تعادل خود را از دست می‌دهند.
 - (۳) ساختمان‌های نسبتاً سست فرو می‌ریزند.
 - (۴) ارتعاش مشابه عبور کامیون‌های سبک را دارد.
- ۶۱- کدام گزینه از معیارهای ارزیابی خطر آتش‌فشن در یک محل نمی‌باشد؟
- (۱) امکان وقوع آتش‌سوزی
 - (۲) جهت باد
 - (۳) توپوگرافی
 - (۴) ویژگی‌های فورانی آتش‌فشن
- ۶۲- کدام گزینه در ارتباط با حرکات توده‌ای درست است؟
- (۱) ریزش در شبیه‌های کند اتفاق می‌افتد.
 - (۲) واژگونی در شرایطی اتفاق می‌افتد که شیب دامنه و شیب لایه‌بندی هم‌جهت باشند.
 - (۳) لغزش‌های چرخشی در مصالح خاکی همگن یا مصالح سنگی شدیداً خردشده هرگز رخ نمی‌دهد.
 - (۴) مشخصه اصلی خرز، سرعت کند آن می‌باشد و در شرایط مختلفی از درصد رطوبت اتفاق می‌افتد.
- ۶۳- میانگین غلظت کدام‌یک از عناصر زیر معمولاً در خاک‌های دنیا کمتر است؟
- (۱) جیوه
 - (۲) سرب
 - (۳) آرسنیک
 - (۴) نیکل
- ۶۴- رخداد لخشه (Slump) ترکیبی از کدام خطرات است؟
- (۱) لغزش و جریان
 - (۲) لغزش و خرز
 - (۳) خرز و ریزش
 - (۴) جریان و خرز
- ۶۵- خاکسره (Solifluction) در چه مناطقی رایج‌تر است؟
- (۱) اقلیم معتدل
 - (۲) اقلیم حاره
 - (۳) اقلیم خشک
 - (۴) اقلیم سرد
- ۶۶- فرایند خودپالایی نیترات در لندفیل‌ها عمدهاً توسط کدام عامل رخ می‌دهد؟
- (۱) رقیق‌سازی
 - (۲) جذب توسط میکرواورگانیزم‌ها
 - (۳) تجزیه میکروبی
 - (۴) کاهش سرعت شیرابه زباله
- ۶۷- در بین استانداردهای ثانویه آب، کدام‌یک اهمیت بیشتری دارد؟
- (۱) رنگ
 - (۲) سختی
 - (۳) بو
 - (۴) طعم
- ۶۸- نوخ فرسایش خاک در اثر حضور کدام کانی رسی افزایش می‌یابد؟
- (۱) کاثولینیت
 - (۲) ایلیت
 - (۳) مونت موریلونیت
 - (۴) کلریت
- ۶۹- کدام‌یک جزء منابع انرژی nonrenewable است؟
- (۱) باد
 - (۲) انرژی هسته‌ای
 - (۳) زئوترمال
 - (۴) ریست‌توده
- ۷۰- کدام‌یک جزء معیارهای مهم برای مصرف صنعتی آب است؟
- (۱) سولفات
 - (۲) کلر
 - (۳) سختی
 - (۴) سدیم
- ۷۱- مقدار کدام‌یک از عناصر زیر در بدن یک انسان استاندارد (۷۰ کیلوگرمی) کمتر است؟
- (۱) منیزیم
 - (۲) سدیم
 - (۳) روی
 - (۴) مس
- ۷۲- کدام عنصر در تنظیم حجم سلول نقش دارد؟
- (۱) سلنیم
 - (۲) آهن
 - (۳) کلسیم
 - (۴) سدیم

- ۷۳- بیشترین غلظت روی در کدام بافت بدن یافت می‌شود؟
 ۱) استخوان ۲) بافت ماهیچه ۳) بافت پوست ۴) کبد
- ۷۴- کدام یک از عناصر زیر در تقویت عملکرد انسولین نقش دارد؟
 ۱) کروم ۲) منگنز ۳) مس ۴) آهن
- ۷۵- ریزش مو و نارسایی تنفسی از علائم مسمومیت کدام عنصر است؟
 ۱) آرسنیک ۲) جیوه ۳) تالیم ۴) کادمیم
- ۷۶- حضور الیاف‌های تخمیرنپذیر در رژیم غذایی چه تأثیری بر جذب عناصر روی و منیزیم دارد؟
 ۱) باعث کاهش جذب می‌شود.
 ۲) باعث افزایش جذب می‌شود.
 ۳) باعث افزایش جذب روی و کاهش جذب منیزیم می‌شود.
 ۴) تأثیری بر جذب ندارد.
- ۷۷- کدام یک از ترکیبات آتش‌فشنایی زیر می‌تواند به بروز عارضه کم کلسیمی در انسان منجر شود؟
 ۱) ترکیبات گوگرد ۲) ترکیبات فلورید ۳) ترکیبات کربن‌دار ۴) ترکیبات گازی نیتروژن
- ۷۸- انحلال‌پذیری کدام یک از گازهای آتش‌فشنایی زیر در دستگاه تنفسی انسان کمتر است؟
 ۱) کربن مونوکسید (CO) ۲) هیدروژن کلرید (HCl)
 ۳) هیدروژن فلورید (HF) ۴) هیدروژن سولفید (H₂S)
- ۷۹- شکل ریزگردهای مواد آلی کوچک‌تر از ۱۰ میکرون قابل استنشاق در جو بیشتر چگونه است؟
 ۱) کروی ۲) تکدانه‌ای ۳) الیافی ۴) آمورف (بی‌ریخت)
- ۸۰- کدام اندازه دانه برای تشکیل ریزگرد در جو مناسب‌تر است؟ (به شرط خشک بودن محیط و سرعت باد مناسب)
 ۱) اندازه غبار ۲) اندازه ماسه ۳) اندازه رس ۴) اندازه سبلت
- ۸۱- کدام گزاره در مورد توفان‌های غبار درست است؟
 ۱) مکان و اندازه مناطق منشأ توفان‌های غبار در طول تاریخ زمین همواره در تغییر بوده است.
 ۲) مکان و اندازه مناطق منشأ توفان‌های غبار در طول تاریخ زمین همواره ثابت بوده است.
 ۳) شدت وزش باد در هر منطقه از زمین مکان و اندازه توفان غبار را تعیین می‌کند.
 ۴) مکان توفان‌ها ثابت اما گستردگی و شدت آنها متغیر بوده است.
- ۸۲- ابتلا به بیماری‌های ناشی از تنفس‌ذرات غبار بیشتر در اثر تنفس کدام کسر اندازه غبار رخ می‌دهد؟
 ۱) ذرات کوچک‌تر از ۵ میکرون
 ۲) ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرون
 ۳) فقط ذرات کوچک‌تر از ۲/۵ میکرون باعث بیماری‌های تنفسی می‌شوند.
 ۴) ابتلا به بیماری‌های تنفسی ربطی به اندازه ذرات غبار ندارد.
- ۸۳- کدام یک از مواد زیر زنوبیوتیک به شمار نمی‌آید؟
 ۱) انواع مواد غذایی ۲) انواع ویتامین‌ها ۳) انواع داروها ۴) آب
- ۸۴- جذب پوستی کدام یک از مواد زیر از راه پوست کمتر است؟
 ۱) حلال‌ها
 ۲) آفت‌کش‌ها
 ۳) هیدروکربن‌های هالوژنه ۴) آب

- ۸۵- مسیر اصلی دفع فلزات سنگی سرب و جیوه کدام است؟
 ۱) دفع کلیوی و تولید ادرار
 ۲) دفع کبدی و ترشح صفراء
 ۳) دفع از طریق ریه و بازدم
 ۴) دفع از راه تعرق
- ۸۶- ابتلا به سرطان در انسان به کدام یک از عوامل زیر بستگی دارد؟
 ۱) اثرات تاکسیکو-کینتیکی
 ۲) نقص در سیستم ایمنی بدن
 ۳) قدرت سمناکی مواد
 ۴) برهمنکش زنوبیوتیک‌ها با گیرنده‌های هورمونی در بدن چگونه است؟
- ۸۷- باعث تحریک اثرات هورمونی می‌شود.
 ۱) مانع از تأثیر فعالیت هورمون‌ها می‌شود.
 ۲) زنوبیوتیک‌ها بر گیرنده‌های هورمونی تأثیری ندارند.
 ۳) گاهی اوقات باعث تحریک اثرات هورمونی و گاهی اوقات مانع از اثرگذاری هورمونی می‌شود.
- ۸۸- کدام عناصر زیر در ساختمان استخوان و غشای سلولی نقش دارند؟
 ۱) کلسیم و مس
 ۲) فلورور و روی
 ۳) فلورور و منیزیم
 ۴) کلسیم و روی
- ۸۹- بیماری کوزپشتی در دام‌ها، با کدام گزینه در ارتباط است؟
 ۱) مسمومیت مس
 ۲) کمبود مس
 ۳) کمبود روی
 ۴) مسمومیت روی
- ۹۰- غلظت زیاد کدام عنصر در بدن موجب آسیب به قلب در اثر کم اکسیژنی می‌شود؟
 ۱) کربالت
 ۲) نیکل
 ۳) مس
 ۴) کادمیم
- ۹۱- سمیت کدام عناصر مستقیماً سیستم عصبی مرکزی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟
 ۱) سرب و روی
 ۲) جیوه و سرب
 ۳) جیوه و کروم
 ۴) کادمیم و کروم
- ۹۲- مهم‌ترین مسیر دریافت عناصر سلنیم، رادون و ید به ترتیب کدام است؟
 ۱) بلع، استنشاق، بلع
 ۲) شرب، شرب، بلع
 ۳) شرب، شرب، بلع
- ۹۳- زیست‌فراهم‌ترین و زیست‌دسترس‌پذیر‌ترین گونه سلنیم به ترتیب کدام است؟
 ۱) سلنوسیستئین، سلنیم چهار ظرفیتی
 ۲) سلنومتیونین، سلنیم چهار ظرفیتی
 ۳) سلنیم شش ظرفیتی، سلنوسیستئین
 ۴) سلنیم شش ظرفیتی، سلنومتیونین
- ۹۴- خطروناک‌ترین نوع تابش کدام است و کدام بافت بیشتر در معرض خطر است؟
 ۱) ذره آلفا، ریه
 ۲) ذره بتا، ریه
 ۳) ذره بتا، پوست
 ۴) ذره گاما، پوست
- ۹۵- مهاجرت رادون در کدام موقعیت بیشتر رخ می‌دهد؟
 ۱) گرانیت‌ها
 ۲) زغال‌سنگ
 ۳) مناطق کارستی
 ۴) سنگ‌های فسفاتی
- ۹۶- بهترین عناصر ردیاب برای ارزیابی میزان خاک‌خواری حیوان و انسان به ترتیب کدام‌ند؟
 ۱) تیتانیم، تیتانیم
 ۲) اسکاندیم، اسکاندیم
 ۳) تیتانیم، اسکاندیم
- ۹۷- عامل اصلی خاک‌خواری در انسان و حیوان به ترتیب کدام است؟
 ۱) کمبود کلسیم و سدیم، کمبود آهن
 ۲) کمبود آهن و کلسیم، کمبود سدیم
 ۳) کمبود آهن و سدیم، کمبود کلسیم

- ۹۸- بیماری توبروکولوسیس با کدام‌یک از بیماری‌های زیر در ارتباط است؟
۱) مزوتلیوما ۲) شش بیابانی ۳) سیلیکوسیس
۴) پنومونی
- ۹۹- استنشاق کدام‌یک از کانی‌ها در بروز مزوتلیومای بدخیم مؤثر است؟
۱) ترمولیت و مونت موربلونیت
۲) اریویت و کوارتز
۳) ترمولیت و کوارتز
۴) ترمولیت و اریوینیت
- ۱۰۰- کمبود کدام‌یک از عناصر در خاک در اثر هر دو عامل آبشویی و جذب ناکارآمد توسط گیاه رخ می‌دهد؟
۱) سلنیم ۲) روی
۳) مس ۴) آهن

