



خیر دنیا و آخرت با دانشی است و شر دنیا و آخرت با نادانی. پیامبر اکرم (ص)

بارم	محل مهر و امضاء مدیر	سوال	ردیف
۱		با فرض آنکه U مجموعه ی مرجع باشد و $n(U) = 100$ و $n(A) = 60$ و $n(B) = 40$ و $n(A \cap B) = 20$ باشد، مطلوبست: الف- $n(A \cup B)$ ب- $n(\bar{A} \cap \bar{B})$ ج- $n(A - B)$	۱
۱,۵		بین ۳ و ۴۸ سه واسطه ی هندسی درج کنید.	۲
۲		درستی تساوی های زیر را ثابت کنید. الف- $\frac{1+\tan \alpha}{1+\cot \alpha} = \tan \alpha$ ب- $\frac{\cos \theta}{1+\sin \theta} = \frac{1-\sin \theta}{\cos \theta}$	۳
۱		مساحت مثلث ABC را پیدا کنید. 	۴
۲		اگر $\sin \alpha = \frac{3}{4}$ در ناحیه ی دوم باشد، مطلوبست محاسبه ی $\cos \alpha$ و $\tan \alpha$ و $\cot \alpha$.	۵
۳		معادلات مقابل را به روش خواسته شده حل کنید. الف- $x^2 - 8x + 6 = 0$ (روش مربع کامل) ب- $x^2 - 3x - 10 = 0$ (روش تجزیه) ج- $x^2 + 3x + 2 = 0$ (روش Δ)	۶
۱		به ازای چه مقادیری از m ، نمودار سهمی $y = x^2 + 3x + m$ همواره بالای محور x هاست؟	۷
۱		نمودار سهمی $y = x^2 + 4x + 4$ را رسم کنید.	۸
۱		اگر $f = \{(1, 3x - 2), (-5, 4y + 8), (4, 4)\}$ تابع همانی باشد، مقادیر x, y را بدست آورید.	۹
۱		عبارت زیر را تعیین علامت کنید. $y = \frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}$	۱۰

۱،۵	در یک کشور نوعی اتومبیل در ۵ مدل، ۱۰ رنگ، ۳ حجم موتور مختلف و ۲ نوع دنده (اتوماتیک و غیر اتوماتیک) تولید می شود. الف- چند نوع مختلف از این اتومبیل تولید می شود؟ ب- اگر یکی از رنگ های تولید شده مشکی باشد، چند نوع از این اتومبیل با رنگ مشکی تولید می شود؟ ج- چند نوع از این اتومبیل مشکی و با دنده اتوماتیک می باشد؟	۱۱
۱	در معادله ی زیر مقدار n را محاسبه کنید. $\frac{n!}{(n-2)!} = 20$	۱۲
۱	هفت نقطه ی A, B, C, D, E, F, G روی محیط دایره هستند، چند مثلث مختلف می توان کشید که رئوس آن از این هفت نقطه انتخاب شده باشند؟	۱۳
۲	در جعبه ای ۴ مهره ی آبی و ۳ مهره ی قرمز وجود دارد. اگر از این جعبه ۳ مهره به تصادف خارج کنیم چقدر احتمال دارد: الف- هر سه مهره آبی باشند؟ ب- هر سه مهره هم رنگ باشند؟	۱۴
۲۰ نمره	موفق و مؤید باشید - قنبری	

ردیف	کلید سوالات	محل مهر و امضاء مدیر	بارم
۱	الف- $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 60 + 40 - 20 = 80$ ب- $n(A \cap B) = n(U) - n(A' \cup B') = 100 - 80 = 20$ ج- $n(A - B) = n(A) - n(A \cap B) = 60 - 20 = 40$		
۲		$3, \pm 6, 12, \pm 24, 48$ $a_1 q^4 = 48 \xrightarrow{a_1=3} q^4 = 16 \rightarrow q = \pm 2$	
۳	الف- $\frac{1+\tan \alpha}{1+\cot \alpha} = \frac{\frac{\cos \alpha + \sin \alpha}{\cos \alpha} + \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}}{\frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{\sin \alpha} + \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}} = \frac{\frac{\cos \alpha + \sin \alpha}{\cos \alpha}}{\frac{\cos \alpha + \sin \alpha}{\sin \alpha}} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \tan \alpha$ ب- $\frac{\cos \theta}{1+\sin \theta} \times \frac{1-\sin \theta}{1-\sin \theta} = \frac{\cos \theta(1-\sin \theta)}{1-\sin^2 \theta} = \frac{\cos \theta(1-\sin \theta)}{\cos^2 \theta} = \frac{1-\sin \theta}{\cos \theta}$		
۴		$S = \frac{1}{2} \times 4 \times 10 \times \sin 30^\circ = \frac{1}{2} \times 40 \times \frac{1}{2} = 10$	
۵	$\sin \alpha = \frac{3}{4}, \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \rightarrow \cos^2 \alpha = 1 - \frac{9}{16} = \frac{7}{16} \rightarrow \cos \alpha = -\sqrt{\frac{7}{16}}$ $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\frac{3}{4}}{-\sqrt{\frac{7}{16}}} = \frac{3}{-\sqrt{7}}, \cot \alpha = -\frac{\sqrt{7}}{3}$		
۶	الف- $x^2 - 8x + 6 = 0 \rightarrow x^2 - 8x + 16 - 16 + 6 = 0 \rightarrow (x-4)^2 = 10 \rightarrow (x-4) = \pm\sqrt{10} \rightarrow$ $x = 4 \pm \sqrt{10}$ ب- $x^2 - 3x - 10 = 0 \rightarrow (x-5)(x+2) = 0 \rightarrow \begin{cases} x=5 \\ x=-2 \end{cases}$ ج- $\Delta = b^2 - 4ac = 9 - 4(2) = 1 \rightarrow x_{1,2} = \frac{-3 \pm 1}{2}$		
۷	با توجه به اینکه ضریب x^2 مثبت است کافی است $\Delta < 0$ باشد: $\Delta < 0 \therefore 9 - 4m < 0 \rightarrow 9 < 4m \rightarrow m > \frac{9}{4}$		

	<p style="text-align: right;">$y = x^2 + 4x + 4, x = \frac{-b}{2a} = \frac{-4}{2} = -2$</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>x</td> <td>-۴</td> <td>-۳</td> <td>-۲</td> <td>-۱</td> <td>۰</td> </tr> <tr> <td>y</td> <td>۴</td> <td>۱</td> <td>۰</td> <td>۱</td> <td>۴</td> </tr> </table> 	x	-۴	-۳	-۲	-۱	۰	y	۴	۱	۰	۱	۴	۸
x	-۴	-۳	-۲	-۱	۰									
y	۴	۱	۰	۱	۴									
	$3x - 2 = 1 \rightarrow x = 1, 4y + 8 = -5 \rightarrow 4y = -13 \rightarrow y = -\frac{13}{4}$	۹												
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>x</td> <td>۱</td> <td>۲</td> <td>۳</td> <td>۴</td> </tr> <tr> <td>y</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> </table>	x	۱	۲	۳	۴	y	+	-	+	-	۱۰		
x	۱	۲	۳	۴										
y	+	-	+	-										
	الف- $5 \times 10 \times 3 \times 2 = 300$ ب- $5 \times 1 \times 3 \times 2 = 30$ ج- $5 \times 1 \times 3 \times 1 = 15$	۱۱												
	$\frac{n!}{(n-2)!} = 20 \rightarrow \frac{n(n-1)(n-2)!}{(n-2)!} = 20 \rightarrow n(n-1) = 20 \rightarrow n = 5$	۱۲												
	چون ترتیب انتخاب نقاط برای ما مهم نیست و به ازای هر ۳ نقطه روی محیط دایره یک مثلث تشکیل می شود داریم: $\binom{7}{3} = \frac{7!}{3!4!} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4!}{3 \times 2 \times 4!} = 35$	۱۳												
	الف- $\frac{\binom{4}{3}}{\binom{7}{3}}$ ب- $\frac{\binom{4}{3} + \binom{3}{3}}{\binom{7}{3}}$	۱۴												